




# **PATOLOGIE ŽENSKÉHO GENITÁLU**

---

- čípek
  - děloha
  - ovarium
  - těhotenství
-

# ČÍPEK







|             |   |
|-------------|---|
| <b>os</b>   | = zevní orificium cervikálního kanálu   |
| <b>ect</b>  | = ektopium/ectropium  |
| <b>nscj</b> | = nová hranice mezi skvamózním a kolumnárním epitelem   |
| <b>im</b>   | = nezralá metaplasie  |
| <b>oscj</b> | = původní skvamocelulární junkce  |
| <b>ctz</b>  | = cervikální transformační zóna (oblast dlaždicové metaplasie) - cytologické změny v této lokalizaci představují prekurzory karcinomu |

*Ectopium: vlivy vývojové a hormonální*


*Ectropium: po porodu jižvením trhlin s následnou everzí epitelu (vzhledu pseudoeroze)*

*Eroze: pravá zánětlivá eroze, bojící se granulací ze spodiny a reepitelializací z periferie*

Dlaždicová metaplasie →  
vznik ovulózy




## Dlaždicobuněčná metaplázie, ovulóza čípku.




- 1 Exocervikální vrstevnatý dlaždicový epitel.
- 2 Endocervikální pravidelný cylindrický epitel.
- 3 Mezi šipkami oblast počínající dlaždicové metaplázie, na povrchu ještě cylindrický epitel.
- 4 Endocervikální žlázky dilatované.

# Cervikální intraepiteliální neoplázie (CIN)

- dysplázie čípku = **prekanceróza**
- patří mezi STD – **asociovány s HPV infekcí**
  - HR-HPV (high-risk) = **16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68**
    - > s vyšší pravděpodobností a rychleji progredují do HG dysplázie (CIN, VIN, VaIN, PeIN, AIN)
    - > **SCC** (dlaždicobun. CA) / ACA (adenoCA)
  - LR HPV (low-risk) = **6, 11** = původce **anogenitálních bradavic**
    - > způsobují max. LG dysplázii



| KLASIFIKACE  |   |      |
|--|---|------|
| CIN1   | CIN2  | CIN3 |
| <b>LSIL</b><br>(low-grade skvamózní intraepiteliální léze) | <b>HSIL</b><br>(high-grade skvamózní intraepiteliální léze) |      |



## VAKCINACE



bivalentní vakcína (HPV 16, 18)

tetravalentní vakcína (HPV 6, 11, 16, 18)


!! není náhradou prevence

!! neznámý efekt na jiné typy HR HPV

!! rizika spojená s očkováním




# Kolposkopie




## Biopsie

- knips
- punch
- konizace




## Cytologie

- stěrová
- LBC (liquid based)



koilocyty

# Screening karcinomu děložního hrudla









- HR HPV může způsobit dysplázií
- clearance viru = regrese dysplázie
  - LSIL často
  - HSIL (CIN2) vzácně
- HSIL má vysoké riziko progrese do CA

- kolposkopie + odběr cytologie ....+ *HPV testace*
- zvyšuje % záchytu dosud latentní HR HPV infekce, dysplázie, příp. časného karcinomu => optimalizuje follow-up a léčbu (**sekundární a terciární prevence**)

## CYTOLOGIE – Bethesda klasifikace

| nelze vyloučit<br>LGD /<br>LG dysplázie | nelze vyloučit<br>HGD / HG<br>dysplázie | karcinom |
|---|---|----------|
| ASC-US                                  | ASC-H                                   | SCC      |
| LSIL                                    | HSIL                                    |          |
| AGC NOS                                 | AGC NEO                                 | ACA      |

## Transient infection



## HPV viral persistence

Infection



Normal cervix

Progression



Clearance

Precancerous lesion

Invasion






Regression

Cancer

# Invazivní karcinom čípku

- 3. nejčastější GYN malignita
- v ČR vysoká incidence (11. místo celosvětově)
- vzniká progresí HSIL – nejčastěji v transformační zóně
- histologicky:
  - **dlaždicobuněčný karcinom** (90 %, diagnostikován nejčastěji v 5. dekádě)
  - **adenokarcinom**
- propagace:
  - lokoregionální progrese (píštěle, prorůstání do okolních orgánů → komplikace)
  - mts do spádových LU
  - hematogenní metastázy (kosti, plíce, játra)





# Rizikové faktory rozvoje HPV infekce

---



- časné zahájení pohlavního života
- promiskuita ženy či jejího partnera
- imunodeficientní stav
- kouření cigaret
- perzistující infekce high risk HPV
- ostatní STD (kofaktor při progresi HPV) – nebo koinfekce více typy HR HPV u jednoho jedince
- nízký socioekonomický status
- mnohočetná těhotenství

# DĚLOHA



# Endometritidy


- poměrně vzácné
- akutní zánět v souvislosti s:
  - instrumentálními zákroky
  - těhotenstvím
  - IUD
- chronický zánět při:
  - perzistenci akutního zánětu (IUD)
  - chronické kapavce
  - TBC (miliární rozsev či přestup z vejcovodů)




# Endometrióza

= okrsky funkčního endometria (žlázek + stromatu) v ektopické lokalizaci

- ovaria, Douglasův prostor, vejcovody, peritoneum, jizvy po laparotomii, pupek, ... plíce, kosti ...
- cyklické změny během MC
  - hemoragické (čokoládové) cysty, hemosiderinová pigmentace
- **adenomyóza:**
  - vtlačení části zona basalis do myometria (nepodléhá funkčním hormonálním změnám)



# Dysfunctional krvácení



- **amenorhea** = absence menstruačního krvácení
- **oligomenorhea** = MC > 35 dnů
- **polymenorhea** = MC < 24 dnů
- **menorrhagie** = vysoké krevní ztráty, délka MC je ale v normě
- **metrorrhagie** = nepravidelné krvácení i během MC


- **vlivy:**
  - **hormonální**
    - hypotalamo-hypofyzální-ovariální osa
    - exogenně podávané hormony
  - **v souvislosti s těhotenstvím**
  - **systémové nemoci** (hemoragické diatézy)
  - **neoplázie**
  - **trauma**

# Dysfunkční endometrium


---

- **Nesekreční** ← abnormní hladiny estrogenů
  - snížené E → hypoproliferační až atrofické endometrium
  - zvýšené E → hyperproliferační endometrium → hyperplázie endometria
  - zvýšené E při ztrátě opozice gestagenů → **hyperplázie endometria** (viz. dále)
- **Sekreční** ← abnormní hladiny gestagenů
  - snížené G → hyposekreční endometrium
  - zvýšené G → hypersekreční endometrium (připomíná těhotenské)
- **Iregulární** ← při dysbalanci Estr i Prg

# Hyperplázie endometria



- **prostá** - zmnožené žlázky, některé cysticky dilatované, zmnožené stroma („ementál“)
  - bez atypií
  - při anovulačním cyklu
- **komplexní** - různě větvené žlázky s minimálním množstvím vmezeřeného stromatu (back-to-back), některé žlázky jsou nádorové s *PTEN* mutací
  - **bez atypií**
  - **atypická** → nádorové žlázky s cytonukleárními atypiemi (*PTEN* mutací), prekanceróza
- **korporální polyp** (stopkatý/přisedlý, solitární/vícečetný)
  - tvořený hyperplastickým korporálním endometriem
  - většinou žlázky atrofické nebo vzhledu prosté hyperplázie, stroma fibrotizované, cévy silnostěnné
  - v terénu polypu může vzniknout kterákoli hyperplázie, včetně atypické (... až karcinom)



# Adenokarcinom endometria

---





- nejčastější gynekologická malignita (2. ZN ovária, 3. ZN čípku)
- **perimenopauzálně**
- RF:
  - zvýšená nepřerušená estrogenní stimulace endometria
  - DM, obezita, časná menarché - pozdní menopauza
  - vlivy genetické
- prekurzorové léze:
  - **atypická hyperplázie endometria**
  - **in situ neoplázie**

# Adenokarcinom endometria

---

- histologické typy:



- v souvislosti se zvýšenou expozicí estrogenů (**typ I**)
  - endometriodní adenokarcinom
  - mucinózní
  - tubální (s řasinkami)
  - dlaždicobuněčný
  - adenoskvamózní
- bez souvislosti s estrogeny (**typ II**), při mutaci p53 (→ velmi agresivní průběh)
  - serózní papilární karcinom
  - světlobuněčný karcinom



# Mezenchymální nádory děl



- leiomyom:

- nejčastější benigní nádor u žen (nejčastěji ve fertilním věku)
- velikost od několika mm po cca 20 cm
- symptomy dle topografických vztahů
- uterus myomatosus (vícečetné myomy)
- postmenopauzálně časté regresivní změny v myomech (fibrotizace, hyalinizace, kalcifikace)




# Mezenchymální nádory dělohy

- stromální nádory
  - vznikají v endometriálním stromatu
  - stromální uzlík (benigní)
  - stromální sarkom
    - low-grade
    - high-grade





# Mezenchymální nádory dětí

- leiomyosarkom
  - vzácný
  - ? z leiomyomu? (v cca 1%)




- rabdomyosarkom
  - embryonální, alveolární, (pleomorfní)
  - v rámci GYN nejčastěji v čípku (děti)






# OVÁRIO




# Nádory ovária



| ORIGIN                                 | SURFACE EPITHELIAL CELLS<br>(Surface epithelial–stromal cell tumors)   | GERM CELL  | SEX CORD–STROMA  | METASTASIS TO OVARIES |
|--|--|--|--|-----------------------|
| Overall frequency                      | 65–70%   | 15–20%   | 5–10%  | 5%                    |
| Proportion of malignant ovarian tumors | 90%  | 3–5%   | 2–3%   | 5%                    |
| Age group affected                     | 20+ years  | 0–25+ years  | All ages   | Variable              |
| Types                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serous tumor</li><li>• Mucinous tumor</li><li>• Endometrioid tumor</li><li>• Clear cell tumor</li><li>• Brenner tumor</li><li>• Cystadenofibroma</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Teratoma</li><li>• Dysgerminoma</li><li>• Endodermal sinus tumor</li><li>• Choriocarcinoma</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fibroma</li><li>• Granulosa–theca cell tumor</li><li>• Sertoli–Leydig cell tumor</li></ul> |                       |

# Germinální nádory - histogeneze



# Embryonální karcinom


krajně nediferencovaný nádor

častěji jako součást smíšených germinálních nádorů

- zhoršuje jejich prognózu


mikro:

- solidní, trabekulární, abortivně tubulární formace
- bb. epitelového vzhledu, mitózy
- stroma bez lymfocytární příměsi





# Nádor ze žloutkového váčku

- ~ epitel žloutkového váčku, extraembryonální mezoderm
- v čisté formě nejčastěji u kojenců a batolat
- u dospělých jako součást germinálních nádorů
- **vysoko maligní**
- mikro:
  - mikrocystické, retikulární a papilární formace
  - glomeruloidní struktury (Schillerova-Duvalova tělíska)
    - kapiláry se zevně nasedajícími nádorovými bb. → štěrbinovité formace
  - nádorové bb.
    - polygonální či kubické
    - často s klenutým povrchem (kulatá jádra) → „kočičí hlavy“, cvočky



# Choriokarcinom

- ~ syncytiotroblast, cytотroblast, intermediární troblast
- častěji jako součást smíšených germinálních nádorů
- mikro:
  - výrazně prokrvácený a ložiskově nekrotický tumor
  - struktury syncytiotroblastu s variabilní příměsí větších polygonálních buněk vzhledu cytотroblastu a intermediálního troblastu



# Teratom



intraembryonální diferenciace

- terminální diferenciace do 3, 2 / nebo 1 zárodečného listu (monodermální teratom)

ve varleti vzácné (x ovárium)


histologická klasifikace

- t. differencovaný zralý
  - pouze zcela vyzrálé tkáně (organoidně usporádané)
  - často cystická struktura s obsahem mazu/hlenu/serózní tekutiny
- t. differencovaný nezralý
  - z nezralých tkání fetálního vzhledu (většinou neuroektoderm)
- t. s malignizovanou somatickou komponentou
  - sarkom, karcinom, PNET





# Gonadostromální nádory

- Nádory z buněk granulózy a z bb. tékálních
  - *nádor granulózový (adultní typ)* – Call-Exnerova tělíska
  - *nádor granulózový (juvenilní typ)*
  - *tékom (typický, luteinizovaný)*
  - *fibrotékom*
  - *fibrom*
  - *fibrosarkom*
- Nádory z Leydigových a Sertoliho buněk
- Nádory ze steroidogenních / lipidních buněk



# Další nádory ovária

- sekundární nádory ovaria
  - Krukenbergův nádor ovaria
  - pseudomyxoma peritonei,...



# Nádory z povrchového epitelu

---

- celomový epitel (mezotel s vlastnostmi epitelu) → hyperplazie a metaplasie povrchového epitelu → mülleriánská diferenciace → neoplastická transformace
- **benigní**
  - obvykle cystické (cystadenomy)
  - se stromální komponentou (cystadenofibromy)
- **maligní**
  - cystické (cystadenokarcinomy)
  - solidní (karcinomy)
- **hraničně maligní – borderline**
  - „intermediate“, atypicky proliferující, s nízkým maligním potenciálem

# Nádory z povrchového epitelu

---


- dělení **dle typu nádorových bb.:**


- serózní
- mucinózní
- endometroidní
- světlobuněčný
- přechodobuněčný (Brennerův tumor)

# Nádory z povrchového epitelu


| Znak                  | Typ karcinomu       |                             |                               |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                       | serózní             | mucinózní                   | endometroidní                 |
| Frekvence výskytu (%) | 60-80               | 5-15                        | 10-30                         |
| Bilateralita (%)      | 30-50               | 10-20                       | 10-30                         |
| Velikost              | spíše malý          | objemný                     | střední                       |
| Rychlosť růstu        | velká               | pomalá                      | pomalá                        |
| Obsah                 | čirý                | hlenovitý                   | hemoragický                   |
| Epitel                | kubický/cylindrický | cylindrický (jádra bazálně) | cylindrický (jádra centrálně) |
| Dlaždicová metaplázie | vyjímečně           | vyjímečně                   | 50%                           |
| Psamomata             | 30%                 | vyjímečně                   | vyjímečně                     |

# Serózní cystadenom (cystadenofibrom)





Serózní cystadenom




Borderline serózní tumor




Serózní cystadenokarcinom

# Mucinózní cystadenom


---



Cylindrický hlenotvorný epitel



Mucinózní cystadenom




Borderline mucinózní tumor





Mucinózní cystadenokarcinom

# Endometroidní adenokarcinom



# Patologie těhotenství

- ektopická gravidita
  - implantace oplozeného vejce mimo endometrium (cca 1%)
  - riziko fulminantního krvácení, náhlé příhody břišní...



# Odumření plodu, potrat

---

- missed abortion = plodové vejce bez plodu
- **potrat** = všechny plody < 22 t.g. nebo všechny plody váhy < 500 g
  - fetální příčiny: - chromozomální aberace, rozsáhlé malformace, mola
  - maternální příčiny: infekce, systémové choroby matky, endokrinopatie, abnormality dělohy
  - neznámé příčiny

# Předčasný porod


---

- **předčasný porod** = porod mrtvého nebo živého plodu **22. – 37. t.g.**
- nejčastější příčinou je **INFEKCE** (porodní cesty, močové cesty, systémové infekce matky, plodu...)
- extrémně nezralý plod: váha < 1000 g
- velmi nezralý plod: váha 1000 – 1500 g
- možné komplikace pro novorozence:
  - **MOZEK**: hypoxicco-ischemické encefalopatie, krvácení (do komor, mozku) – hydrocefalus
  - **PLÍCE**: bronchopulmonální dysplázie
  - **OČI**: retinopatie/slepota
  - **STŘEVO**: ischemická enterokolitida - sepse

# Gestační trofoblastická choroba



- **mola hydatidosa**  
*(kompletní, parciální)*
- výrazný edém choriových klků s proliferací trofoblastu
- obvykle postihuje velmi mladé nebo naopak starší těhotné
- frekvence 1:1000 – 1:2000 těhotenství
- riziko vzniku choriokarcinomu
- **krvácení ve 2. trimestru**
- výrazné zvětšování děložního těla
- léčba: kyretáž nebo hysterektomie

|                                | <b>kompletní mola</b>   | <b>parciální mola</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>karyotyp</b>                | 46, XX<br>46, XY        | triploidní<br>69, XXY |
| <b>edém klků</b>               | všechny klky            | některé klky          |
| <b>proliferace trofoblastu</b> | difuzní po celém obvodu | fokální mírná         |
| <b>cytologické atypie</b>      | časté                   | chybí                 |
| <b>hCG v séru</b>              | ++++                    | ++                    |
| <b>hCG v tkáni</b>             | ++++                    | +                     |
| <b>chorio - karcinom</b>       | 2%                      | vzácně                |



# Gestational Trophoblastic Disease

- **invazivní mola**
  - invazivní růst do stěny dělohy a do parametrií
  - lokálně destruktivní, angioinvaze
  - embolizace do vzdálených orgánů (*nejde o metastázy*)
  - krvácení z infiltrovaných tkání (*děloha*)
  - dobrá odpověď na chemoterapii
- **choriokarcinom**
  - infiltrativní růst, hematogenní diseminace, dobrá odpověď na chemoterapii
  - asociace: mola hydatidosa (50%), potrat (25%), normální těhotenství (22%), ektopické těhotenství, teratomy pohlavních orgánů nebo extragenitální



# Těhotenská toxikóza

---

- relativně častý výskyt (6 % těhotných – zejm. primipary, 3. trimestr)
- **preeklampsie** = HYPERTENZE + PROTEINURIE + EDÉMY
- **eklampsie** = idem + ZÁCHVATOVITÉ KŘEČE .... + DIC
- mikrotromby – ischemie – nekrózy
  - matka: ledviny, játra, srdce, CNS, adenohypofýza...
  - placenta: infarkty, retroplacentární hematom, ischemie klků, nekróza spirálních arterií
- Tp: antihypertenziva + indukce porodu

---

*Děkuji za pozornost!*