

Zajímaví savci

Vybrané řády:

ptakořitní, vačnatci, damani,
chudozubí, poloopice vers.
vyšší primáti, kaloni, šelmy
(lachtani vers. tuleni, mroži,
lvouni)

Vybrané nižší taxony

pišťuchy v. činčily,
hrabošící,

PTAKOŘITNÍ –

kloakální vejcorodí savci se žláznatým políčkem na vývodech mléčné žlázy

Ježura australská



Ptakopysk (podivný)

VAČNATÍ

Vak a vakové (epipubické) kosti obou pohlaví včetně zakrnělého vaku samců, více zubů. Kloaka, dvě dělohy a pochvy, rozeklaný penis. Žlutková placenta, nevyvinutá mláďata. Až 27 bradavek.

VAČNATCI (australští),

BANDIKUTI

MICROBIOTHERIA

Kolokolo – gondwanský relikv
horských lesů Chile a Argentiny

VAKOKRTI

KUNOVCI

d'ábel, mravencojed, vakovlk

KOALY a VOMBATI

MÁLOZUBÍ

kuskus, vakoveverka

KLOKANI



Koala

KLOKANI

býložraví vačnatci s tříprstou zadní končetinou (silný 4.prst s drápem, slabší 5., malý srůstající 2.a 3. s „hřebínkem“, palec chybí). Význam ocasu a sluchu.

Klokan obrovský





Klokan rudý

DAMANI

sociální prstochodci s nehtovitými kopýtky. Denní býložravci s prekociálními mláďaty.

Daman skalní



CHUDOZUBÍ

relativně samostatný taxon, chybí I, a C. Nepevné uchycení kolíčkovitých zubů. Xenarthrální hrudní a bederní obratle, krčních 6 – 9. Mozek bez gyrifikace, zdvojená zadní dutá žíla.

Lenochodi –
stromoví



Pásovci –
po- i podzemní



Mravenečníci –
pozemní



PRIMÁTI

končetiny chápavé s protistojným palcem, volně pohyblivé (úpravy kloubů a klíční kost), nehty. Mozkové změny: rozvoj gyrifikované kůry a mozečku, redukce čichových laloků. Stereoskopické vidění. Nízká rozmnožovací schopnost.

Poloopice

částečně zachované znaky hmyzožravců (čich s protaženými čelistmi, slabě gyrifikovaný mozek), drápy - nehet vždy na palci.

Makiové

Lemuři

Ksukolové

Indriové

Komby

Outloni

Nártouni



**Lemur
kata**



**Nártoun
celebeský**

Vyšší primáti

početně převyšující, nápadné zvýraznění obličejové lebky.
Srst bez podsady, jediný pár mléčných žláz.

Tamarín pinčí



PLOSKONOSÍ

Kosmani, tamaríni

Malpy, titiové, chvostani, vřešťani, chápani

ÚZKONOSÍ

Kočkodani, hulmani, languři, guerézy, makakové, paviáni,
mandril a dril, mangabej,



Vřešťan
mono

LIDOOPI

Giboni

Orangutani, šimpanzi, gorily



Kočkodan
bělonosý



Pavián
babuin



Šimpanz
učenlivý



Gorila nížinná

LETOUNI – kaloni

Zraková náhrada echolokace, čichová
potravní orientace na plody.

Kaloň tmavý



ŠELMY

válcovitý kloub spodní čelisti, pásovité (zonární) placenta, redukce klíčních kostí a slepého střeva.

Pozemní šelmy

Úplný chrup, velké C. Trháky: poslední horní P a první dolní M. Vůdčí smysly: čich a zrak. Dvourohá děloha.

PSOVITÍ

MEDVĚDOVITÍ

MEDVÍDKOVITÍ

LASICOVITÍ (kunovití)

CIBETKOVITÍ

PROMYKOVITÍ

HYENOVITÍ

KOČKOVITÍ

Ploutvonožci

Vřetenovitý trup s ploutvovitými končetinami, zakrnělý ocas a ušní boltce, redukovaná srst, podkožní tuk, bez klíčních kostí, složené ledviny.

Lachtani – zadní končetiny podsunou, boltce. Plavou pomocí předních ploutví

Mroži – podsunou, bez boltců, horní C.

Tuleni – nepodsunou, bez boltců.
Plavou pohyby zadní části těla



Mrož



Pes hyenovitý

PSOVITÍ

MEDVĚDOVITÍ



Panda červená



Nosál bělohubý

MEDVÍDKOVITÍ

LASICOVITÍ (kunovití)



Vydra říční



Cibetka africká

CIBETKOVITÍ

PROMYKOVITÍ



Surikata



Hyenka hřivnatá

HYENOVITÍ

KOČKOVITÍ



Lev

Činčily vers. pišťuchy

Činčily: vysokohorští **hlodavci** (Andy) s jemnou a hustou srstí. Prodloužená silná noha s velkou tlapkou, velké boltce, dlouhý huňatý ocas. Společnosti rodin až stovkových kolonií. Noční aktivita. Chovy.



Činčila vlnatá

Pišťuchy: horské (výjim. stepní) druhy čeledi v rámci řádu zajíců. Vnější podoba s hlodavci (zavalité tělo, krátké nohy, ocas a široké boltce, tupá hlava). Na zimu suší seno. Malé kolonie. Stepní druhy nocturnální, horské spíše s denní aktivitou.



Pišťucha horská



Pišťucha severní

Hrabošovití hlodavci

Hrabošík podzemní *Pitymys subterraneus*

– býložravý, podobný hraboši. Kratší uši,
menší oči. Vlhčí louky střední Evropy.

