

Lenka Přibylová

ÚMS MU Brno

# Dvojné integrály

## Obsah

<b>1 Integrace na obdélníku</b>	2
<b>2 Integrace na elementární množině</b>	11
<b>3 Transformace do polárních souřadnic</b>	18

# 1. Integrace na obdélníku

Dvojný integrál na obdélníkové oblasti  $\Omega = [a, b] \times [c, d]$

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx \, dy$$

představuje objem tělesa pod plochou  $f(x, y)$  na oblasti  $\Omega$ .

Podle Fubiniovy věty je roven integrálu

$$\int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx$$

respektive integrálu

$$\int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Je-li funkce  $f(x, y)$  součinem funkce proměnné  $x$  a funkce proměnné  $y$ , pak platí

$$\iint_{\Omega} g(x)h(y) \, dx \, dy = \int_a^b g(x) \, dx \int_c^d h(y) \, dy.$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} x^2y \, dx \, dy$ , kde  $\Omega = [0, 1] \times [1, 3]$ .

**1.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int x^2y \, dy \right) dx$$

**2.** Najdeme primitivní funkci k  $x^2y$  vzhledem k proměnné

$$= \int_0^1 \left[ \quad \right]_1^3 dx$$

**3.** Dosadíme meze

$$= \int_0^1 \quad dx$$

**4.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_0^1$$

**5.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= \quad .$$

**Quiz** Stejný integrál  $\iint_{\Omega} x^2y \, dx \, dy$ , kde  $\Omega = [0, 1] \times [1, 3]$  řešme pomocí opačné dvojnásobné integrace.

**1.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int x^2y \, dx \right) dy$$

**2.** Najdeme primitivní funkci k  $x^2y$  vzhledem k proměnné

$$= \int_1^3 \left[ \quad \right]_0^1 dy$$

**3.** Dosadíme meze

$$= \int_1^3 \quad dy$$

**4.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_1^3$$

**5.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= \quad .$$

**Quiz** Tentýž integrál  $\iint_{\Omega} x^2 y \, dx \, dy$ , kde  $\Omega = [0, 1] \times [1, 3]$  řešme pomocí rozkladu na součin dvou jednoduchých integrálů.

**1.** Přepíšeme na součin dvou integrálů

$$= \int x^2 \, dx \int y \, dy$$

**2.** Najdeme primitivní funkce

$$= \left[ \quad \right]_0^1 \left[ \quad \right]_1^3$$

**3.** Výsledek dostaneme dosazením mezi

$$= \quad .$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} \frac{y}{x} dx dy$ , kde  $\Omega = [1, e] \times [2, 4]$ .

**1.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int \frac{y}{x} dy \right) dx$$

**2.** Najdeme primitivní funkci k  $\frac{y}{x}$  vzhledem k proměnné

$$= \int_1^e \left[ \quad \right]_2^4 dx$$

**3.** Dosadíme meze

$$= \int_1^e \quad dx$$

**4.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_1^e$$

**5.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= \quad .$$

**Quiz** Stejný integrál  $\iint_{\Omega} \frac{y}{x} dx dy$ , kde  $\Omega = [1, e] \times [2, 4]$  řešme pomocí opačné dvojnásobné integrace.

**1.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int \frac{y}{x} dx \right) dy$$

**2.** Najdeme primitivní funkci k  $\frac{y}{x}$  vzhledem k proměnné

$$= \int_2^4 \left[ \quad \right]_1^e dy$$

**3.** Dosadíme meze

$$= \int_2^4 \quad dy$$

**4.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_2^4$$

**5.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= \quad .$$

**Quiz** Tentýž integrál  $\iint_{\Omega} \frac{y}{x} dx dy$ , kde  $\Omega = [1, e] \times [2, 4]$  řešme pomocí rozkladu na součin dvou jednoduchých integrálů.

**1.** Přepíšeme na součin dvou integrálů

$$= \int \frac{1}{x} dx \int y dy$$

**2.** Najdeme primitivní funkce

$$= \left[ \quad \right]_1^e \left[ \quad \right]_2^4$$

**3.** Výsledek dostaneme dosazením mezi

$$= \quad .$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} \ln(xy) \, dx \, dy$ , kde  $\Omega = [1, e] \times [1, e]$ .

**1.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int \ln(xy) \, dy \right) dx$$

**2.** Najdeme primitivní funkci k  $\ln(xy)$  vzhledem k proměnné integrací per partes, kde  $u =$  ,  $v' =$

Dostáváme tedy

$$\begin{aligned} \int \ln(xy) \, d &= \underbrace{\quad}_{u} \underbrace{\quad}_{v} - \int \underbrace{\quad}_{u'} \underbrace{\quad}_{v} \, d \\ &= \quad + c \end{aligned}$$

**3.** Dosadíme meze

$$\iint_{\Omega} \ln(xy) \, dx \, dy = \int_1^e \left[ \quad \right]_1^e \, dx = \int_1^e \quad dx$$

**4.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_1^e$$

**5.** Výsledek dostaneme dosazením mezi

$$= \quad .$$

**Quiz** Tentýž integrál  $\iint_{\Omega} \ln(xy) \, dx \, dy$ , kde  $\Omega = [1, e] \times [1, e]$  řešme pomocí rozkladu na součin dvou jednoduchých integrálů.

**1.** Nejprve upravíme integrovanou funkci pomocí vzorce na součet

$$\iint_{\Omega} \ln(xy) \, dx \, dy = \iint_{\Omega} \frac{dxdy}{x} + \iint_{\Omega} \frac{dy}{x} \, dxdy$$

**2.** Oba integrály přepíšeme na součin jednoduchých integrálů

$$= \int \frac{dx}{x} \int dy + \int \frac{dx}{x} \int dy$$

**3.** Najdeme primitivní funkci k  $\ln(x)$  integrací per partes, kde

$$u = \quad , \quad v' =$$

Dostáváme tedy

$$\begin{aligned} \int \ln(x) dx &= \underbrace{\ln(x)}_u \underbrace{x}_v - \int \underbrace{1}_{u'} \underbrace{x}_v dx \\ &= \quad + c \end{aligned}$$

**4.** Dosadíme meze

$$\iint_{\Omega} \ln(xy) \, dx \, dy = \left[ \quad \right]_1^e \left[ \quad \right]_1^e + \left[ \quad \right]_1^e \left[ \quad \right]_1^e$$

**5.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= \quad .$$

## 2. Integrace na elementární množině

Elementární množinou se rozumí uzavřená a omezená množina typu

$$\Omega_x = \left\{ [x, y] \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \quad f(x) \leq y \leq g(x) \right\} \text{ resp.}$$

$$\Omega_y = \left\{ [x, y] \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, \quad f(y) \leq x \leq g(y) \right\},$$

kde  $a, b \in \mathbb{R}$  a funkce  $f(x) < g(x)$  na celém intervalu  $[a, b]$ . Na množině typu  $\Omega_x$  je pořadí integrace nejprve podle  $y$  a pak podle  $x$ , na množině  $\Omega_y$  je pořadí opačné.

**Quiz** Jsou množiny určené následujícími nerovnostmi, resp. omezené následujícími křivkami elementární? V případě, že ano, jaké bude pořadí integrace?

1.  $1 \leq x \leq 2, \quad x \leq y \leq x^2$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$   
(c) Ano, nezáleží na pořadí
- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$   
(d) Ne

2.  $0 \leq x \leq 2, \quad x \leq y \leq x^2$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$   
(c) Ano, nezáleží na pořadí
- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$   
(d) Ne

3.  $0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$   
(c) Ano, nezáleží na pořadí
- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$   
(d) Ne

4.  $\sin(y) \leq x \leq \cos(y), \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$   
(c) Ano, nezáleží na pořadí
- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$   
(d) Ne

5.  $\sin(y) \leq x \leq \cos(y), \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$
- (c) Ano, nezáleží na pořadí

6.  $0 \leq x \leq 1, \quad x \leq y \leq \frac{1}{x}$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$
- (c) Ano, nezáleží na pořadí

7.  $x = 5, \quad y = 2x, \quad y = x$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$
- (c) Ano, nezáleží na pořadí

8.  $x - 2y = 1, \quad x - 2y = 3, \quad y = 1, \quad y = 2$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$
- (c) Ano, nezáleží na pořadí

9.  $x + y^2 = 1, \quad x = y^2$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$
- (c) Ano, nezáleží na pořadí

10.  $y = 1 - x^2, \quad x = y^2$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$
- (c) Ano, nezáleží na pořadí

11.  $y = e^x, \quad y = x + 1, \quad x = e$

- (a) Ano, nejprve podle  $x$ , pak podle  $y$
- (c) Ano, nezáleží na pořadí

- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$
- (d) Ne

- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$
- (d) Ne

- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$
- (d) Ne

- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$
- (d) Ne

- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$
- (d) Ne

- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$
- (d) Ne

- (b) Ano, nejprve podle  $y$ , pak podle  $x$
- (d) Ne

Podle Fubiniovy věty platí:

Dvojný integrál na elementární množině

$$\Omega_x = \left\{ [x, y] \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \quad f(x) \leq y \leq g(x) \right\}$$

$$\iint_{\Omega_x} \Phi(x, y) \, dx \, dy$$

je roven integrálu

$$\int_a^b \left( \int_{f(x)}^{g(x)} \Phi(x, y) \, dy \right) dx.$$

Dvojný integrál na elementární množině

$$\Omega_y = \left\{ [x, y] \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, \quad f(y) \leq x \leq g(y) \right\}$$

$$\iint_{\Omega_y} \Phi(x, y) \, dx \, dy$$

je roven integrálu

$$\int_a^b \left( \int_{f(y)}^{g(y)} \Phi(x, y) \, dx \right) dy.$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} x^2y \, dx \, dy$ ,

kde  $\Omega$  je určena nerovnostmi  $1 \leq x \leq 2$ ,  $x \leq y \leq x^2$ .

**1.** Množina  $\Omega$  je typu  $\Omega$ .

**2.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál se správným pořadím integrace

$$= \int \left( \int x^2y \, d \right) d$$

**3.** Najdeme primitivní funkci k  $x^2y$  vzhledem k proměnné

$$= \int_1^2 \left[ \quad \right] \, dx$$

**4.** Dosadíme meze

$$= \int_1^2 \, dx$$

**5.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]^2_1$$

**6.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= .$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} \cos(x+y) \, dx \, dy$ ,

kde  $\Omega$  je určena nerovnostmi  $0 \leq x \leq y$ ,  $0 \leq y \leq \pi$ .

**1.** Množina  $\Omega$  je typu  $\Omega$ .

**2.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál se správným pořadím integrace

$$= \int \left( \int \cos(x+y) \, dy \right) dx$$

**3.** Najdeme primitivní funkci ke  $\cos(x+y)$  vzhledem k proměnné

$$= \int_0^{\pi} \left[ \quad \right] \, dy$$

**4.** Dosadíme meze

$$= \int_0^{\pi} \, dy$$

**5.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_0^{\pi}$$

**6.** Výsledek dostaneme dosazením mezi

$$= \quad .$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} \frac{x+y}{y} dx dy$ ,

kde  $\Omega$  je omezená přímkami  $y = 3x$ ,  $y = 1$ ,  $x + y = 2$ .

**1.** Množina  $\Omega$  je typu  $\Omega$ .

**2.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál se správným pořadím integrace

$$= \int \left( \int \frac{x+y}{y} d \right) d$$

**3.** Najdeme primitivní funkci ke  $\frac{x+y}{y}$  vzhledem k proměnné

$$= \int_1^{\frac{3}{2}} \left[ \quad \right] dy$$

**4.** Dosadíme meze

$$= \int_1^{\frac{3}{2}} dy$$

**5.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_1^{\frac{3}{2}}$$

**6.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= .$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} xy \, dx \, dy$ ,

kde  $\Omega$  je omezená křivkami  $y = x$ ,  $x = 2 - y^2$ .

**1.** Množina  $\Omega$  je typu  $\Omega$ .

**2.** Přepíšeme na dvojnásobný integrál se správným pořadím integrace

$$= \int \left( \int xy \, dy \right) dx$$

**3.** Najdeme primitivní funkci ke  $xy$  vzhledem k proměnné

$$= \int_{-2}^1 \left[ \quad \right] dy$$

**4.** Dosadíme meze

$$= \int_{-2}^1 \quad dy$$

**5.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k proměnné

$$= \left[ \quad \right]_{-2}^1$$

**6.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= .$$

### 3. Transformace do polárních souřadnic

V některých případech je pro výpočet dvojného integrálu vhodné provést transformaci proměnných. Jde v podstatě o substituční metodu integrace. Zavedeme-li nové proměnné regulární transformací

$$\Phi : x = g(u, v), \quad y = h(u, v),$$

pak platí

$$\iint_{\Omega} f(x, y) \, dx dy = \iint_{\Phi(\Omega)} f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| \, du dv,$$

kde  $J(u, v) = \begin{vmatrix} g'_u(u, v) & g'_v(u, v) \\ h'_u(u, v) & h'_v(u, v) \end{vmatrix}$

je Jakobián zobrazení  $\Phi$  a množina  $\Omega$  je zobrazena na množinu  $\Phi(\Omega)$ .

Nejčastěji užívanou transformací je transformace do polárních souřadnic. Jde o případy, kdy je množina  $\Omega$  kruh, mezikruží nebo kruhová výseč apod.

Polární souřadnice zavedeme pomocí zobrazení

$$\Phi : x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi,$$

které je regulární a jeho Jakobián je

$$J(r, \phi) = \begin{vmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi \\ \sin \phi & r \cos \phi \end{vmatrix} = r.$$

V následujících příkladech je poloměr v polárních souřadnicích značen  $r$  a úhel  $\phi$  se zapisuje jako *fi.*

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} \frac{x}{y} dx dy$ ,

kde  $\Omega$  je určena nerovnostmi  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ ,  $y \geq x$ ,  $x \geq 0$ .

**1.** Zavedeme polární souřadnice a přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int dr \right) d\phi$$

**2.** Rozepíšeme na dva jednoduché integrály

$$= \int d\phi \int dr$$

**3.** Najdeme primitivní funkce

$$= \left[ \quad \right]_{\pi/4}^{\pi/2} \left[ \quad \right]_1^2$$

**4.** Výsledek dostaneme dosazením mezi

$$= .$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} x^2y + y^3 \, dx dy,$

kde  $\Omega$  je určena nerovnostmi  $x^2 + y^2 \leq 1, \quad y \geq 0, \quad x \geq 0.$

**1.** Zavedeme polární souřadnice a přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int dr \right) d\phi$$

**2.** Rozepíšeme na dva jednoduché integrály

$$= \int d\phi \int dr$$

**3.** Najdeme primitivní funkce

$$= \left[ \dots \right]_0^{\pi/2} \left[ \dots \right]_0^1$$

**4.** Výsledek dostaneme dosazením mezi

$$= \dots$$

**Quiz** Vypočtěte integrál  $\iint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$ ,

kde  $\Omega$  je určena nerovnostmi  $x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $x^2 + (y - 1)^2 \leq 1$ .

**1.** Zavedeme polární souřadnice a přepíšeme na dvojnásobný integrál

$$= \int \left( \int \quad \quad \quad d \quad \quad \right) d$$

**2.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k

$$= \int \left[ \quad \quad \quad \right] \quad \quad d$$

**3.** Dosadíme meze

$$= \int \quad \quad \quad d$$

**4.** Najdeme primitivní funkci vzhledem k

s použitím substituce  $t = \quad \quad :$

$$= \left[ \quad \quad \quad \right]$$

**5.** Výsledek dostaneme dosazením mezí

$$= \quad \quad .$$

Připomínky a komentáře zašlete prosím na emailovou adresu [pribylova@math.muni.cz](mailto:pribylova@math.muni.cz).