

## P3 - Klasifikace stavů Markovova řetězce

### 1. 8 Trvalé (nulové, nenulové a absorpční stavy), přechodné stavy

#### Definice 6

**Stav  $i$  Markovova řetězce se nazývá trvalý [recurrent state]<sup>1</sup>, jestliže platí  $\sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = 1$**

Tato podmínka znamená, že pokud se někdy proces nachází ve stavu  $i$ , pak se aspoň někdy v budoucnu proces opět (s určitostí) do stavu  $i$  opět dostane. Trvalé stavy mohou být jednak takové, že návrat do výchozího stavu může nastat kdykoliv nebo až po konečném nebo nekonečném počtu kroků.

Speciální případem trvalého stavu je tzv. **absorpční stav**, ze kterého se nelze dostat (po jakémkoliv počtu kroků) do jiného stavu (tedy ani do jiného trvalého).

#### Definice 7

**Stav  $i$  Markovova řetězce se nazývá absorpční [absorbing state], jestliže platí  $p_{ii} = 1$**

Tato podmínka znamená, že pokud se někdy sledovaný proces dostane do stavu  $i$ , pak proces již tento stav nikdy neopustí. Odpovídá to situaci, kdy (jednokroková) pravděpodobnost „přechodu“ (tedy setrvání) ze stavu do  $i$  do stavu  $i$  je rovna 1.

#### Definice 8

**Stav  $i$  Markovova řetězce se nazývá přechodný [transient state], jestliže platí**

**$\sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} < 1$**  Tato podmínka znamená, že pokud se někdy proces dostane do stavu  $i$ ,

pak existuje kladná pravděpodobnost, že se proces do tohoto stavu  $i$  již nikdy v budoucnu nevrátí. Tato pravděpodobnost je dána právě hodnotou

$$(1.31) \quad 1 - \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)}$$

Obecně není možné vypočítat pravděpodobnosti prvního průchodního stavu pro všechna  $n$ , takže není vždy zřejmé, zda určitý stav má být klasifikován jako *trvalý* nebo *přechodný*.

**Poznámka 1** Ačkoliv všechny stavy v příkladě se zásobami kamer jsou trvalé, není

nijak jednoduché dokázat, že  $\sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = 1$

Podrobnější členění trvalých stavů je založeno na pojmu střední doba návratu  $\mu_{ii}$  ve smyslu **Definice 5**. Zavedeme tedy

#### Definice 9

**Stav  $i$  Markovova řetězce se nazývá nulový trvalý [null recurrent state], jestliže platí  $\mu_{ii} = +\infty$ .**

**a nazývá se nenulový trvalý [positive recurrent state], platí-li  $\mu_{ii} < +\infty$ .**

<sup>1</sup> Anglické pojmenování není obsahem ekvivalentní českému, ale v češtině vyjadřuje pojem rekurentní jev obecnější charakteristiku než je jev či stav trvalý.

## 1. 9 Dosažitelnost, souslednost stavů. Rozložitelné a nerozložitelné řetězce

### Definice 10

**Stav  $j$  Markovova řetězce se nazývá dosažitelný [accessible] ze stavu  $i$ , jestliže platí  $p_{ij}^{(n)} > 0$  pro nějaké  $n \geq 0$ .**

**Poznámka 2.** Dosažitelnost není symetrická vlastnost. Z okolnosti, že stav  $i$  je dosažitelný ze stavu  $j$ , neplyne, že by ze stavu  $j$  byl naopak dosažitelný stav  $i$ .

Připomeňme, že  $p_{ij}^{(n)}$  je právě podmíněná pravděpodobnost toho, že proces vycházející ze stavu  $i$  přejde po  $n$  krocích do stavu  $j$ . Lze snadno ukázat, že stav  $j$  je dosažitelný ze stavu  $i$  právě a jen tehdy, jestliže lze dospět do stavu  $j$  vycházející ze stavu  $i$  po nějakém kladném celočíselném počtu kroků.

**Poznámka 3** V příkladě se zásobami máme  $p_{ij}^{(2)} > 0$  pro všechna  $i, j$ , takže každý stav je dosažitelný z každého jiného stavu.

### Definice 11

**Stavy  $i, j$  Markovova řetězce se nazývají sousledné [„to communicate“], jestliže stav  $i$  je dosažitelný ze stavu  $j$  a současně, jestliže stav  $j$  je dosažitelný ze stavu  $i$ .**

Zřejmě tedy postačující podmínkou pro to, aby byly vzájemně dosažitelné všechny stavy Markovova řetězce<sup>2</sup>, je, aby existovala kladná hodnota  $n$  (nezávislá na  $i$  a  $j$ ), pro kterou by  $p_{ij}^{(n)} > 0$  pro všechna  $i, j$  a současně, aby existovala kladná hodnota  $m$ , pro kterou platilo  $p_{ji}^{(m)} > 0$ .

Jsou-li stavy sousledné, umožňuje to mj. v případě rozložitelného Markovova řetězce dekomponovat množinu trvalých stavů do více podmnožin/skupin, přičemž každá skupina trvalých stavů bude obsahovat vždy jen vzájemně sousledné stavy

V důsledku platnosti **Chapman-Kolmogorovových rovnic (1.21)**, tedy toho, že platí

$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^{\infty} p_{ik}^{(r)} p_{kj}^{(s)}$  pro  $s + r = n$  a nezápornosti každé  $p_{rs}^{(t)}$ , můžeme vyvodit, že

$$p_{ik}^{(n+m)} = \sum_{r=0}^{\infty} p_{ir}^{(n)} p_{rk}^{(m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{jk}^{(m)} > 0$$

Obdobný argument lze uplatnit pro opačný vztah souslednosti obou stavů.

---

<sup>2</sup> To je ovšem dosti neobvyklá, i když možná situace.

**Definice 12** Řekneme, že **Markovův řetězec je nerozložitelný (ireducibilní) [irreducible]**, **jestliže relace ekvivalence indukuje pouze jedinou třídu ekvivalentních stavů.**

Jinými slovy, řetězec je ireducibilní, jestliže jsou všechny stavy sousledné. Je-li v řetězci taková třída jen jedna, pak tento řetězec nazýváme **nerozložitelný (ireducibilní)**. Tvoří-li všechny stavy řetězce **uzavřenou třídu** a jsou-li tyto **stavy ergodické**, pak se tento řetězec nazývá **regulární**.

Jestliže pro jeden nebo i několik stavů platí  $p_{ii} = 1$  (tj. setrvání ve stavu  $i$  je jistý jev) a do těchto stavů existuje vstup tzn. existuje stav  $j$  nepatřící do tohoto podřetězce a takový, že  $p_{ji}^{(n)} > 0$ , pak o těchto stavech mluvíme jako o absorpčních. Ostatní stavy řetězce pak nutně musí být transientní.

Řetězce obsahující absorpční stavy nazýváme absorpční řetězce.

## 1. 10 Periodicita stavů Markovova řetězce

Jiná klasifikace stavů Markovova řetězce je založena na tom, po jakém počtu kroků (přechodů) může nastat opakování určitého stavu. Půjde o to, že realizace některých stavů může nastat pouze po nějakém násobku kroků. V tomto smyslu zavedeme definice

### Definice 13A

Stav  $i$  Markovova řetězce se nazývá **periodický** [periodic state] s **periodou  $r$** , **jestliže platí  $p_{ii}^{(h,r)} > 0$  pro všechna  $h = 1, 2, 3, \dots$**

Periodou stavu  $i$ , někdy značenou  $r = d(i)$  rozumíme největší společný dělitel ze všech přirozených čísel (větší než 1), pro který  $p_{ii}^{(n)} > 0$ .<sup>3</sup>

### Definice 13B

Stav  $i$  Markovova řetězce se nazývá **neperiodický** [non-periodic state], **jestliže neexistuje žádná perioda  $r, r > 1$ , vůči níž by tento stav byl periodický**

Definovali jsme tedy periodu stavu  $i$  jako největší společný dělitel všech přirozených čísel  $n \geq 1$  pro které  $p_{ii}^{(n)} > 0$ . [Pokud  $p_{ii}^{(n)} = 0$  pro všechna  $n \geq 1$ , definujeme  $d(i) = 0$ ]. Máme-li náhodnou procházku, kde nepřipouštíme setrvání ve stavu (při jednom „přechodu“), pak každý stav má periodu 2. Pokud bychom připustili možnost setrvání v daném stavu, pak by měl každý stav periodu 1, tj. byl by neperiodický. protože bez ohledu na počáteční stav  $j$  systému, může systém dosáhnout stavu  $i_0$  a zůstat v něm jakoukoliv dobu před návratem do stavu  $j$ .

**Tvrzení 2.** Jsou-li stavy  $i, j$  sousledné a jeden z nich  $i$  je periodický s periodou  $d(i)$ , pak i druhý stav  $j$  je periodický a má shodnou periodu. Tedy

Jestliže  $i \leftrightarrow j$ , potom platí  $d(i) = d(j)$

**Tvrzení 3.** Jestliže stav  $i$  má periodu  $r = d(i)$ , pak existuje přirozené číslo  $N$ , závislé na  $i$ , že pro všechna přirozená  $n \geq N$  platí  $p_{ii}^{n,r} > 0$

Tvrzení zajišťuje, že návrat do stavu  $i$  může nastat ve všech dostatečně velkých násobcích periody  $r = d(i)$ .

**Důsledek:** Jestliže  $p_{ji}^{(m)} > 0$ , potom  $p_{ji}^{(m+k.r)} > 0$  pro všechna přirozená dostatečně velká  $k$ .

<sup>3</sup> Znamená to tedy, že periodický stav má nenulovou pravděpodobnost výskytu po libovolném počtu kroků, které jsou násobkem „jeho“ periody, V ostatních časových okamžicích může být pravděpodobnost jeho výskytu kladná i nulová.

#### Definice 14

Stav  $i$  Markovova řetězce se nazývá **ergodický** [ergodic state], jestliže je **trvalý, nenulový a neperiodický**.<sup>4</sup>

**Příklad** V konečném Markovově řetězci s  $M$  stavy a maticí pravděpodobností přechodu

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \text{ má každý stav periodu } M.$$

Většina procesů typu Markovových řetězců, se kterými se lze setkat, jsou neperiodické. Náhodné procházky jsou naopak typické periodickým chováním.

---

<sup>4</sup> V některých textech se do pojmu *ergodicity* nezahrnuje neperiodičnost stavu.

### 1.11 Další prostředky klasifikace trvalých a přechodných stavů

Klasifikace stavů trvalé/přechodné zavedená **Definicí 6** resp. **Definicí 8** a založená na chování nekonečné řady  $\sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$ , může být přenesena na chování tomuto procesu odpovídající nekonečné řady  $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)}$ . Přesněji to vyslovuje následující věta:

**Věta 3A:** Stav  $i$  je trvalý právě tehdy, jestliže platí  $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = +\infty$ .

**Důkaz** (Karlín str.66): je založen na využití **Abelova lemmatu pro vytvořující funkce**

**A) nutnost:** Předpokládejme, že stav  $i$  je trvalý, to znamená, že  $\sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} = 1$  (podle definice). Potom lze na základě **prvního tvrzení Abelova lemmatu** tvrdit, že platí

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} f_{ij}^{(n)} s^n = \lim_{s \rightarrow 1^-} F_{ij}(s) = 1. \text{ Takže ze vztahu (8.25B) plyne}$$

$\lim_{s \rightarrow 1^-} P_{ij}(s) = \lim_{s \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} s^n = \infty$ . Odvoláme-li se na **druhé tvrzení Abelova lemmatu**, dostaneme  $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ij}^{(n)} = \infty$ , což dává dokazované tvrzení.

**B) postačitelost:** Předpokládejme, že stav  $i$  je přechodný, tzn. Platí  $\sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} < 1$ .

S využitím **prvního tvrzení Abelova lemmatu** a s ohledem na platnost (8.25B), vyvodíme, že  $\lim_{s \rightarrow 1^-} P_{ij}(s) < \infty$ . Dále, s odvoláním na **druhé tvrzení Abelova lemmatu** dostáváme výsledek, že  $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} < +\infty$ , což je ve zřejmém rozporu s naším předpokladem trvalosti stavu  $i$ , čímž je ověřena postačitelost.

Opačnou situaci popisuje tvrzení

**Věta 3B:** Stav  $i$  je přechodný právě tehdy, když  $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ij}^{(n)} < \infty$ .

**Poznámka 7** Střední počet návratů do stavu  $i$ , při daném  $X_0 = i$  je roven  $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$ . takže věta 3A říká, že stav  $i$  je trvalý právě tehdy, jestliže střední počet návratů je nekonečný.

Jak bylo výše (Definicí 9) uvedeno, veličina  $\mu_{ii} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p_{ii}^{(n)}$  je nazývána **střední doba návratu** (do stavu  $i$ ). V závislosti na ní rozlišujeme stavy

a) **trvalé nulové**, jestliže  $\mu_{ii} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p_{ii}^{(n)} = \infty$

b) **trvalé nenulové**, jestliže  $\mu_{ii} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p_{ii}^{(n)} < \infty$

**Důsledek:** Necht'  $i^*$  je trvalý stav. Máme<sup>5</sup>

$$\frac{1-F(s)}{1-s} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{i^*i^*}^{(n)} \frac{1-s^n}{1-s} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{i^*i^*}^{(n)} (1+s+s^2+s^3+\dots+s^{n-1}) \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{i^*i^*}^{(n)} \quad \text{při } s \rightarrow 1-$$

**Důkaz:** Z rovnosti

$$(1-s) \cdot P(s) = \frac{1-s}{1-F(s)} \quad \text{vyplývá}$$

$$\lim_{s \rightarrow 1-} (1-s) \cdot P(s) = \frac{1}{\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{i^*i^*}^{(n)}} = \frac{1}{\mu_{i^*i^*}} .$$

Víme, že trvalý stav  $i$  je nulový právě tehdy, když platí

$$(*) \quad \lim_{s \rightarrow 1-} (1-s) \cdot P(s) = 0 .$$

To je splněno, kdykoliv platí

$$(**) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i^*i^*}^{(n)} = 0 . \quad \square .$$

Složitější je důkaz ekvivalentnosti (\*) a (\*\*)

<sup>5</sup> Protože u trvalého stavu platí  $\sum_{n=0}^{\infty} f_{i^*i^*}^{(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{i^*i^*}^{(n)} = 1$ , jinak obecně  $\sum_{n=0}^{\infty} f_{i^*i^*}^{(n)} s^n = F(s)$ .

<sup>6</sup>  $\lim_{s \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} f_{i^*i^*}^{(n)} (1+s+s^2+s^3+\dots+s^{n-1}) = \lim_{s \rightarrow 1-} \sum_{n=1}^{\infty} f_{i^*i^*}^{(n)} s^{n-1} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{i^*i^*}^{(n)}$

V obojím případě využíváme platnosti  $f_{i^*i^*}^{(0)} = 1$

**Věta 4: Všechny stavy dosažitelné z trvalého stavu jsou rovněž trvalé, a to stejného typu: trvalé nulové/nenulové, periodické/neperiodické**

**Důkaz:** Necht' je  $k$  nějaký stav dosažitelný z trvalého stavu  $i^*$ . Musí tedy existovat nejmenší  $r$  takové, že platí  $p_{i^*i_1} p_{i_1i_2}, \dots, p_{i_{r-1}k} > 0$  pro vhodnou posloupnost stavů  $i_1, i_2, \dots, i_{r-1}$ . V této posloupnosti se nemůže vyskytnout stav  $i^*$ , protože jinak by cesta k němu byla kratší. Máme  $p_{i^*k}^{(r)} = a > 0$ . Stav  $i^*$  musí být dosažitelný z  $k$ , neboť kdyby nebyl, pak by opak měl za následek platnost nerovnosti

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_{ji^*}^{(n)} \leq 1 - a \quad a > 0$$

Lze proto nalézt takové  $r$ , pro které  $p_{ki^*}^{(r)} = b > 0$ . Pro  $n = 1, 2, \dots$ , pak platí

$$p_{i^*i^*}^{(r+t+n)} \geq p_{i^*k}^{(r)} \cdot p_{kk}^{(n)} \cdot p_{ki^*}^{(t)} = a \cdot b \cdot p_{kk}^{(n)}$$

$$p_{kk}^{(r+t+n)} \geq p_{ki^*}^{(t)} \cdot p_{ii^*}^{(n)} \cdot p_{i^*k}^{(r)} = a \cdot b \cdot p_{ii^*}^{(n)}.$$

Odtud dostáváme implikace

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{i^*i^*}^{(n)} = \infty \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{kk}^{(n)} = \infty$$

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} (1-s) \sum_{n=0}^{\infty} p_{i^*i^*}^{(n)} s^n = 0 \leftrightarrow \lim_{s \rightarrow 1^-} (1-s) \sum_{n=0}^{\infty} p_{kk}^{(n)} s^n = 0.$$

Vidíme, že  $k$  je trvalý stav, který je nulový právě tehdy, když též  $i^*$  je nulový stav.  $\square$ .

Pokud se chceme v důkazu vyhnout operování s mocninnými řadami, lze uplatnit velmi podobné tvrzení (převzaté v textu S.Karlin-H.M.Taylor str.66)

**Věta 4\* Necht' jsou stavy  $i$  a  $j$  sousledné. Pak jestliže je stav  $i$  trvalý, potom je také stav  $j$  trvalý.**

**Důkaz** Protože jsou stavy  $i$  a  $j$  sousledné, existují  $m, n \geq 1$  taková, že  $p_{ij}^{(n)} > 0$  jakož i  $p_{ji}^{(m)} > 0$ . Necht'  $v > 0$ . Zřejmě platí  $p_{jj}^{(m+n+v)} \geq p_{ji}^{(m)} \cdot p_{ii}^{(n)} \cdot p_{ij}^{(v)}$ .

Pokud tuto nerovnost „nasoučtujeme“, dostaneme

$$\sum_{v=0}^{\infty} p_{jj}^{(m+n+v)} \geq \sum_{v=0}^{\infty} p_{ji}^{(m)} \cdot p_{ii}^{(n)} \cdot p_{ij}^{(v)} = p_{ji}^{(m)} \cdot p_{ij}^{(n)} \sum_{v=0}^{\infty} p_{ii}^{(v)}.$$

Odtud je zřejmé, že pokud  $\sum_{v=0}^{\infty} p_{ii}^{(v)}$  diverguje, potom také  $\sum_{v=0}^{\infty} p_{jj}^{(v)}$  diverguje.  $\square$ .

Dále uvedeme několik tvrzení, které vypovídají o tom, že ne v každém Markovově řetězci musí, resp. mohou být obsaženy stavy všech dosud uvedených typů. O tom, že v konečném Markovově řetězci (v řetězci s konečným počtem stavů  $M$ ) je okruh přípustných stavů dosti omezen, vypovídají následující dvě tvrzení:



**Věta 5** V konečném Markovově řetězci nemohou být přítomny nulové trvalé stavy.

**Důkaz:** Mějme takový řetězec a předpokládejme, že  $i^*$  je jeho trvalý nulový stav.

Pro každý stav  $k$  dosažitelný z  $i^*$  platí dle důkazu Věty 1 pro všechna  $n$ :

$$p_{i^*k}^{(m+n)} \geq p_{i^*k}^{(m)} \cdot p_{ki^*}^{(n)} = b \cdot p_{ki^*}^{(n)} .$$

Jestliže je  $k$  nedosažitelné z  $i^*$ , pak  $p_{i^*k}^{(n)} = 0$  pro  $n = 0, 1, 2, \dots$ . Z (5) proto plyne

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} (1-s) \sum_{n=0}^{\infty} p_{i^*k}^{(n)} s^n = 0, \quad k \in I$$

Sečtením pro všechny stavy  $k \in I$  dostáváme:

$$0 = \lim_{s \rightarrow 1^-} (1-s) \sum_{k=1}^{M^*} \sum_{n=0}^{\infty} p_{i^*k}^{(n)} s^n = \lim_{s \rightarrow 1^-} (1-s) \sum_{n=0}^{\infty} s^n = 1^7, \quad k \in I .$$

Předpoklad o přítomnosti nulových stavů tedy vede ke sporu. □ .

**Konečný Markovův řetězec může tedy obsahovat pouze stavy trvalé nenulové a stavy přechodné.**

**Věta 6** V konečném Markovově řetězci nemohou být všechny stavy přechodné.

**Důkaz:** Bude doplněn později □ .

Důsledkem obou předchozích vět (5,6) je závěr, že v Markovově řetězci s konečným počtem stavů musí být vždy přítomen aspoň 1 stav trvalý nenulový.

**Tvrzení 11** Jestliže jsou stavy  $i, j$  trvalé, avšak náležející do odlišných tříd, potom platí

$$(1.32) \quad p_{ij}^{(n)} = 0 \quad \text{pro všechna } n^8$$

**Tvrzení 12** Jestliže stav  $j$  je přechodný, potom

$$(1.33) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0 \quad \text{pro všechna } i^9$$

Následující věta ukáže, že pokud je „trvalost“ vlastnost určitého stavu, potom se tento stav bude vyskytovat nekonečněkrát často s pravděpodobností 1:

<sup>7</sup> První z rovností platí v důsledku toho, že stav  $i^*$  je trvalý nulový.

<sup>8</sup> Plyne to přímo z definice třídy (jsou-li aspoň 2).

<sup>9</sup> Plyne to z toho, že pravděpodobnost výskytu procesu v přechodném stavu po velkém počtu přechodů směřuje k nule.

**Věta 7: Stav  $i$  je trvalý [reccurent] nebo přechodný [transient] podle toho, zda platí  $Q_{ii} = 1$  nebo  $Q_{ii} = 0$  (pozn.: jiná možnost se nemůže vyskytnout, kde  $Q_{ii}$  definujeme jako pravděpodobnost  $Q_{ii} = \Pr\{\text{částice vycházející ze stavu } i \text{ se vrátí nekonečně krát do stavu } i\}$**

**Důkaz:** Definujme veličinu  $Q_{ii}^{(n)}$  předpisem

$$Q_{ii}^{(N)} = \Pr\{\text{částice vycházející ze stavu } i \text{ se vrátí do stavu } i \text{ aspoň } N - \text{krát}\}$$

Můžeme psát :

$$Q_{ii}^{(N)} = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ii}^{(k)} \cdot Q_{ii}^{(N-1)} = Q_{ii}^{(N-1)} \cdot f_{ii}^* , \text{ kde } f_{ii}^* = \sum_{k=1}^{\infty} f_{ii}^{(k)} .$$

Platnost tohoto vzorce je založena na rozkladu události  $Q_{ii}^{(N)}$  podle doby prvního návratu. Jestliže postupujeme rekurzivně, dostáváme postupně

$$Q_{ii}^{(N)} = f_{ii}^* Q_{ii}^{(N-1)} = (f_{ii}^*)^2 Q_{ii}^{(N-2)} = (f_{ii}^*)^3 Q_{ii}^{(N-3)} = \dots = (f_{ii}^*)^{N-1} Q_{ii}^{(1)} .$$

Víme ale, že podle definice platí

$$Q_{ii}^{(1)} = f_{ii}^* , \text{ z čehož máme } Q_{ii}^{(N)} = (f_{ii}^*)^N$$

Protože ale  $\lim_{N \rightarrow \infty} Q_{ii}^{(N)} = Q_{ii}$ , máme  $Q_{ii} = 1$  nebo  $Q_{ii} = 0$  podle toho, zda  $f_{ii}^* = 1$  nebo  $f_{ii}^* < 1$ , resp. ekvivalentně, dle toho, zda stav  $i$  je **trvalý** nebo **přechodný**.  $\square$ .

**Věta 8:** Jestliže platí souslednost stavů  $i, j$  ( $i \leftrightarrow j$ ) a pohybujeme se ve třídě trvalých stavů, pak platí

$$f_{ij}^* = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} = 1 .$$

Dále definujme veličinu

$$Q_{ij} = \Pr\{\text{částice vycházející ze stavu } i \text{ prejde do stavu } j \text{ nekonečně často}\}$$

Jako přímý **důsledek věty 6** dostaneme

**Důsledek** Jestliže platí  $i \leftrightarrow j$  a jsme ve třídě trvalých stavů, pak platí

$$Q_{ij} = 1$$

**Důkaz:** Je snadné ukázat, že platí  $Q_{ij} = f_{ij}^* \cdot Q_{jj}$  a protože  $j$  je rovněž trvalý stav, platí podle **věty 8**  $f_{ij}^* = 1$ , z čehož plyne  $Q_{ij} = 1$ .  $\square$ .

To říká, že stav  $i$  je přechodný právě tehdy, jestliže (vycházející ze stavu  $i$ ) existuje „reziduální“ pravděpodobnost  $1 - \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} > 0$ , že se systém do stavu  $i$  po jakkoliv velkém konečném počtu kroků již nevrátí.

## Příklad 4

Mějme Markovův proces s maticí pravděpodobností přechodu

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{stavy} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Je zřejmé, že **stav č. 2 je absorpční** (a tedy **trvalý**), neboť pokud jednou proces vstoupí do stavu č.2 (třetí řádek matice), pak ho již nikdy neopustí. **Stavy č. 3 a 4 jsou přechodné stavy**, protože, pokud proces vstoupí do stavu 3,<sup>10</sup> pak existuje kladná pravděpodobnost, že se do něj již nikdy nevrátí.<sup>11</sup> Tato pravděpodobnost je 1/3 (že proces přejde ze stavu 3 do stavu 2 po jednom kroku). **Pokud proces opustí stav 4, nemůže se již do něho nikdy později vrátit** (stav 4 je zřejmě přechodný). Když proces vstoupí do stavu 2<sup>12</sup>, nadále již v něm zůstane

**Stavy 0 a 1 jsou trvalé stavy.** Jak bylo konstatováno dříve, k tomu, abychom to prokázali, postačí ukázat, že platí

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_{00}^{(n)} = 1, \text{ resp. že } \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)} = 1$$

To je však obecně obtížné, a proto je žádoucí vyvinout alternativní test:

**Nutná a postačující podmínka, aby byl stav  $i$  trvalý je, aby pravděpodobnost daná součtem nekonečné řady**

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < +\infty \text{ konvergovala.}$$

Bohužel, i toto kritérium je obtížné použít, takže bude nutno uplatnit ještě jiné kritérium, které uvedeme později. Všimněme si ale, že matice pravděpodobností přechodu po  $n$  krocích  $P^{(n)}$  bude mít pro tento případ vždy podobu:

$$P = \begin{pmatrix} *** & *** & 0 & 0 & 0 \\ *** & *** & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & *** & *** & 0 \\ *** & *** & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

kde symbol **\*\*\*** označuje kladná čísla. Zde je intuitivně zřejmé, že pokud je proces ve stavu 0, vrátí se jednou do stavu 0 (možná projdouce stavem 1) po nějakém počtu kroků. Podobný argument platí pro stav 1.

<sup>10</sup> Zůstává v něm s pravděpodobností 1, přechod nikam jinam není možný

<sup>11</sup> Do stavu 4 se nedá odnikud vstoupit, do stavu 3 pouze z něho samého a stavu 2.

<sup>12</sup> Po jednom kroku je to možné pouze ze stavu 3, a to s pravděpodobností 1/3.