

## Matematika II — jaro 2005 — 3. termín — 9.6.2005

1. (10 bodů) Definujte pojem matice (typu  $m \times n$ ). Definujte sčítání a násobení matic. Dejte příklad dvou nenulových matic jejichž součin je nulová matice. Definujte pojem hodnota matice. Pro matici typu  $n \times n$  uveďte podmínku, která využívá pojem determinant matice, a která je ekvivalentní s faktem, že daná matice má hodnotu  $n$ .
2. (10krát  $\pm 1$  bod (správně 1 bod, chybně  $-1$ , bez odpovědi 0)) Odpovězte (škrtnutím nehodícího se **ano** nebo **ne** na patřičném řádku), zda jsou pravdivá následující tvrzení (čtěte **velmi** pozorně!):
  - (a) **ano** — **ne**  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \cap, \cup)$  je okruh. (Zde  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  je množina všech podmnožin množiny  $\mathbb{N}$ .)
  - (b) **ano** — **ne** Jestliže polynom nad tělesem  $T$  nemá kořen, pak je ireducibilní nad  $T$ .
  - (c) **ano** — **ne** Násobnost kořene polynomu nad tělesem je menší nebo rovna stupni tohoto polynomu.
  - (d) **ano** — **ne** Každá homogenní soustava lineárních rovnic má řešení.
  - (e) **ano** — **ne** Determinant jednotkové matice typu  $n \times n$  je  $n$ .
  - (f) **ano** — **ne** Prázdná množina je podprostor libovolného vektorového prostoru.
  - (g) **ano** — **ne** Podmnožina lineárně nezávislé množiny vektorů je lineárně nezávislá.
  - (h) **ano** — **ne** Dimenze vektorového prostoru polynomů stupně menšího než 4 je 3.
  - (i) **ano** — **ne** Množina všech řešení nehomogenní soustavy tvoří vektorový prostor.
  - (j) **ano** — **ne** Zobrazení  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dané předpisem  $f(x) = \sin x$  je lineární zobrazení vektorových prostorů nad  $\mathbb{R}$ .
3. (10 bodů) Nalezněte všechna  $a, b \in \mathbb{R}$  taková, že polynom  $f = x^4 - x^3 + 2x^2 + ax + b \in \mathbb{C}[x]$  má kořen  $1 + 2i$ . Pro tyto dvojice  $a, b$  rozložte polynom  $f$  na ireducibilní faktory postupně nad  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ .
4. (10 bodů) Rozložte racionální lomenou funkci

$$\frac{x^5}{x^3 - 1}$$

na součet parciálních zlomků nad  $\mathbb{R}$ .

5. (10 bodů) Určete všechna  $a \in \mathbb{R}$  taková, že k matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

existuje matice inverzní. Tuto inverzní matici určete.

6. (10 bodů) V  $\mathbb{R}$  řešte soustavu lineárních rovnic

$$\begin{array}{rccccrc} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & = & 5 \\ & & x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & = & 4 \\ & & & & x_3 & + & 2x_4 & = & 3 \\ ax_1 & & & & & + & x_4 & = & b \end{array}$$

v závislosti na parametrech  $a, b \in \mathbb{R}$ .

7. (10 bodů) Ve vektorovém prostoru  $\mathbb{R}^4$  nad tělesem  $\mathbb{R}$  je dána množina vektorů

$$\{(0, 3, 2, 1), (2, -1, 0, 3), (1, 1, 1, 2), (1, 0, 3, 3)\}.$$

Vyberte z této množiny maximální lineárně nezávislou podmnožinu vektorů. Doplňte tuto podmnožinu na bázi  $\mathbb{R}^4$  pomocí vektorů z množiny

$$\{(0, 1, -2, -1), (1, 0, -1, 1), (1, 2, 3, 1), (1, 0, 1, 2)\}.$$

8. (10 bodů) Buď dáno lineární zobrazení  $\varphi : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$  předpisem

$$\varphi(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = (2a_1 - a_3)x^3 + (-a_0 + 2a_1 + a_2 - a_3)x^2 + (a_0 + 2a_1 - a_2 + a_3)x + (a_0 - a_2).$$

Určete bázi a dimenzi jádra  $\text{Ker}(\varphi)$  zobrazení  $\varphi$ .

Určete bázi a dimenzi obrazu  $\text{Im}(\varphi)$  zobrazení  $\varphi$ .

Rozhodněte, zda je zobrazení  $\varphi$  injektivní.

Rozhodněte, zda je zobrazení  $\varphi$  surjektivní.

Rozhodněte, zda je zobrazení  $\varphi$  izomorfismus vektorových prostorů.