

## Matice přechodu

Nechť  $(\mathbf{V}, +, \cdot)$  je nenulový vektorový prostor konečné dimenze nad tělesem  $(T, +, \cdot)$  a nechť vektory  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  představují některou bázi tohoto prostoru. Pak pro každý vektor  $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$  existují jednoznačně určené prvky  $s_1, s_2, \dots, s_n \in T$  takové, že  $\mathbf{u} = s_1 \cdot \mathbf{f}_1 + s_2 \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + s_n \cdot \mathbf{f}_n$ . Prvky  $s_1, s_2, \dots, s_n$  se pak nazývají **souřadnice** vektoru  $\mathbf{u}$  v bázi  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ .

Nechť  $(\mathbf{V}, +, \cdot)$  je nenulový vektorový prostor konečné dimenze  $n$  nad tělesem  $(T, +, \cdot)$ . Nechť posloupnosti  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  a  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$  tvoří dvě báze prostoru  $(\mathbf{V}, +, \cdot)$ . Nechť pro každé  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  jsou  $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$  souřadnice vektoru  $\mathbf{g}_j$  v bázi  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ , takže  $\mathbf{g}_j = a_{1j} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{2j} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{nj} \cdot \mathbf{f}_n$ . Pak čtvercová matice  $A = (a_{ij})_{i=1, \dots, n, j=1, \dots, n}$  nad  $(T, +, \cdot)$  se nazývá **matice přechodu** od báze  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  k bázi  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ .

**Tvrzení.** Nechť  $(\mathbf{V}, +, \cdot)$  je nenulový vektorový prostor nad tělesem  $(T, +, \cdot)$ . Nechť  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  a  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$  jsou dvě báze prostoru  $(\mathbf{V}, +, \cdot)$  a nechť  $A = (a_{ij})$  je matice přechodu od báze  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  k bázi  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ . Nechť  $\mathbf{u}$  je libovolný vektor z  $\mathbf{V}$  a nechť  $s_1, s_2, \dots, s_n$ , resp.  $t_1, t_2, \dots, t_n$  jsou souřadnice vektoru  $\mathbf{u}$  v bázi  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ , resp. v bázi  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ . Pak platí

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{pmatrix}.$$

**Důkaz.** Máme  $\mathbf{u} = t_1 \cdot \mathbf{g}_1 + t_2 \cdot \mathbf{g}_2 + \dots + t_n \cdot \mathbf{g}_n = t_1 \cdot (a_{11} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{21} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{n1} \cdot \mathbf{f}_n) + t_2 \cdot (a_{12} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{22} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{n2} \cdot \mathbf{f}_n) + \dots + t_n \cdot (a_{1n} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{2n} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{nn} \cdot \mathbf{f}_n) = (a_{11} \cdot t_1 + a_{12} \cdot t_2 + \dots + a_{1n} \cdot t_n) \cdot \mathbf{f}_1 + (a_{21} \cdot t_1 + a_{22} \cdot t_2 + \dots + a_{2n} \cdot t_n) \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + (a_{n1} \cdot t_1 + a_{n2} \cdot t_2 + \dots + a_{nn} \cdot t_n) \cdot \mathbf{f}_n$  a současně  $\mathbf{u} = s_1 \cdot \mathbf{f}_1 + s_2 \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + s_n \cdot \mathbf{f}_n$ . Vzhledem k jednoznačnosti souřadnic vektoru  $\mathbf{u}$  v bázi  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  odtud a z definice násobení matic plyne dokazovaná rovnost.

Ukážeme nyní, jakým způsobem se uplatní inverzní matice v problematice vektorových prostorů.

**Tvrzení.** Nechť  $(\mathbf{V}, +, \cdot)$  je nenulový vektorový prostor nad tělesem  $(T, +, \cdot)$ . Nechť  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  a  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$  jsou dvě báze prostoru  $(\mathbf{V}, +, \cdot)$  a nechť  $A = (a_{ij})$  je matice přechodu od báze  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  k bázi  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$ . Pak  $A$  je regulární matice a matice  $A^{-1}$  k ní inverzní je maticí přechodu od báze  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$  k bázi  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ .

**Důkaz.** Označme zprvu  $B = (b_{ij})$  maticí přechodu od báze  $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n$  k bázi  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$ . Podle toho, co bylo řečeno v kapitole o regulárních maticích, zcela stačí, když ukážeme, že součin  $A \cdot B$  je jednotková matice  $E_n$  řádu  $n$ . Ovšem podle definice matic přechodu pro každé  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  je  $\mathbf{g}_j = a_{1j} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{2j} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{nj} \cdot \mathbf{f}_n$  a současně pro každé  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  je také  $\mathbf{f}_j = b_{1j} \cdot \mathbf{g}_1 + b_{2j} \cdot \mathbf{g}_2 + \dots + b_{nj} \cdot \mathbf{g}_n$ . Takže odtud dosazením pro každé  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$  vychází, že

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_j &= b_{1j} \cdot (a_{11} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{21} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{n1} \cdot \mathbf{f}_n) + \\ &\quad b_{2j} \cdot (a_{12} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{22} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{n2} \cdot \mathbf{f}_n) + \dots + \\ &\quad b_{nj} \cdot (a_{1n} \cdot \mathbf{f}_1 + a_{2n} \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + a_{nn} \cdot \mathbf{f}_n) = \\ &\quad (a_{11} \cdot b_{1j} + a_{12} \cdot b_{2j} + \dots + a_{1n} \cdot b_{nj}) \cdot \mathbf{f}_1 + \\ &\quad (a_{21} \cdot b_{1j} + a_{22} \cdot b_{2j} + \dots + a_{2n} \cdot b_{nj}) \cdot \mathbf{f}_2 + \dots + \\ &\quad (a_{n1} \cdot b_{1j} + a_{n2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{nn} \cdot b_{nj}) \cdot \mathbf{f}_n. \end{aligned}$$

V poslední lineární kombinaci jsou ovšem koeficienty u vektorů  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  právě prvky  $j$ -tého sloupce matice  $A \cdot B$ . Poněvadž souřadnice každého vektoru z  $\mathbf{V}$  v bázi  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  jsou určeny jednoznačně (a to platí i pro vektory  $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n$  samotné), a poněvadž máme  $\mathbf{f}_j = 0 \cdot \mathbf{f}_1 + \dots + 0 \cdot \mathbf{f}_{j-1} + 1 \cdot \mathbf{f}_j + 0 \cdot \mathbf{f}_{j+1} + \dots + 0 \cdot \mathbf{f}_n$  pro všechna  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ , plyne odtud, že  $A \cdot B = E_n$ , jak bylo třeba. Takže skutečně  $B = A^{-1}$ .