

# **Molekulární biologie pro informatiky - 8**

## **Molekulární mechanismy signalizace**

# Signální molekuly

---

## Signál

- zprostředkovává a předává informaci
- extracelulární - ligand reagující s buňkou pomocí receptoru
- intracelulární

## Extracelulární signály

- proteiny, peptidy, aminokyseliny, nukleotidy, lipidy, steroidy, mastné kyseliny, plyny
- hormony - odvozené od aminokyselin (adrenalin, thyroxin)
  - peptidy a proteiny (inzulín, glukagon, oxytocin)
  - steroidní (testosteron, estrogen, kortizol)
  - vitamín D, kyselina retinová
- cytokiny - interleukiny, interferony
  - nádorové nekrotické faktory (TNF- $\alpha$ , TNF- $\beta$ , TNF- $\gamma$ )
  - růstové faktory (EGF, PDGF, IGF-1, GM-CSF, GHF, NGF)
- nervové mediátory (acetylcholin, GABA)
- lokální mediátory (histamin, oxid dusnatý)







Signály **hydrofilní**: vazba na membránové receptory, krátkodobá odpověď

Signály **lipofilní**: vazba na intracelulární receptory, dlouhodobá odpověď

# Extracelulární signalizace

Přenos signálu ze zdrojové buňky na receptor buňky cílové

1. **endokrinní** - buňky vzdáleny, přenos signálu krví (př. hormony)
2. **autokrinní** - stejná buňka
3. **parakrinní** - produkce signálu do tělních tekutin, lokální účinek (př. histamin, NO)
4. **dutý spoj** - buňky v těsném kontaktu, tubulární struktura (př.  $\text{Ca}^{2+}$ , cAMP)
5. **přímý kontakt** - ligand i receptor na povrchu buněk v přímého kontaktu (př. FasL)
6. **synapse** - nervová soustava, permeabilita membrán (př. acetylcholin)







# Signalizace

## Intracelulární signalizace

- přenos signálu na cílovou molekulu uvnitř buňky

## Odpověď buňky

- genová exprese, aktivita metabolických enzymů, konfigurace cytoskeletu, permeabilita membrány, syntéza DNA, indukce apoptózy
- přítomnost receptorů a výbava buňky rozhoduje o tom, na který signál bude buňka reagovat
- stejný signál může mít různé účinky u různých buněk (např. acetylcholin)
- rychlost reakce - změna funkce proteinů (s - min), změna v expresi genů (min - hod)



# Signální dráhy



**První přenašeč signálu:** prvotní signál zachycený buňkou

**Druhé přenašeče signálu:** malé molekuly produkované uvnitř buňky po vazbě ligandu na receptor

**Intracelulární signalizace zahrnuje**

- přenos signálu a jeho převod do srozumitelné podoby
- zesílení, rozdělení signálu
- propojení signálních drah

Po přijetí signálu se rovnováha signálních molekul velmi rychle obnovuje.



# Intracelulární receptory


- receptory steroidních a tyroidních hormonů, vitamínu D, kyseliny retinové, oxidu dusnatého
- difuze ligandu cytoplazmatickou membránou → vazba na receptor → změna konformace receptoru → regulace transkripce cílových genů

## Funkční domény receptorů

- doména pro vazbu ligandu
- doména pro dimerizaci
- aktivační doména - vazba k TFIID, TFIIB
- DNA vazebná doména - motiv dvou zinkových prstů

## 1. Cytoplazmatické receptory


- steroidní hormony, glukokortikoidy, testosteron
- vazba HSP90
- tvorba homodimeru, přechod do jádra, aktivace příslušných genů
- př. androgenní receptor



# Intracelulární receptory



## 1. Cytoplazmatické receptory

- dvoustupňová reakce na steroidní hormony



## 2. jaderné receptory




- tyroidní hormony, vit D, kyselina retinová
- tvoří heterodimery (RXR)
- př. vitamín D - v krvi vázán na DBP protein - jaderný receptor VDR



# Intracelulární receptory

## Oxid dusnatý (NO)



- parakrinní signál, volný průnik přes membrány buněk
- NO syntáza - deaminace argininu
- rychlý, lokální účinek
- vazodilatátor - aplikace nitroglycerinu při angíně pectoris
  - prodloužení účinku NO po aplikaci viagry
- acetylcholin → vznik a uvolnění NO z endotelových buněk → difuze k buňkám hladké svaloviny → aktivace guanylátcyklázy → relaxace svalové buňky





# Přehled proteinkináz


- fosforylace - vazba fosfátové skupiny na AK
- jako donor fosfátové skupiny slouží ATP, vznik ADP
- tyrosinkinázy - vazba fosfátu na fenolickou skupinu Tyr
- serin/treoninkinázy - vazba fosfátu na hydroxylovou skupinu Ser či Thr



## SERIN / TREONIN KINÁZY

### 1. proteinkináza A, PKA


- cAMP dependentní protein kináza
- homodimer, regulační (R) a katalytická (C) doména
- po vazbě cAMP na R jsou C uvolněny a mohou fosforylovat cílové proteiny
- př. rozklad glykogenu ve svalových vláknech, syntéza somatostatinu v D-buňkách



# Přehled proteinkináz


## 2. proteinkináza G, PKG

- cGMP dependentní protein kináza, homodimer
- regulační doména: dimerizace, vazba cGMP, blok aktivního místa
- katalytická doména: fosforylace
- PKG-I - hladká svalovina, trombocyty, endotely, kardiomyocyty
- PKG-II - buňky ledvin, střevní mukóza, pankreas



## 3. proteinkináza C, PKC

- monomer v blízkosti plazmalemy, aktivace účinkem DAG, PtdSer a  $\text{Ca}^{2+}$
- regulační doména - vazba DAG, PtdSer a  $\text{Ca}^{2+}$ , blok aktivního místa
- katalytická doména - fosforylace



# Přehled proteinkináz


Struktura PKA, PKC a PKG je vysoce příbuzná

## Regulační doména

- pseudosubstrát blokuje aktivní místo
- leucinový zip pro dimerizaci
- vazebná místa pro ligandy



## Katalytická doména

- aktivní místo enzymu s kinázovou aktivitou
- vazba ATP



## 4. Ca<sup>2+</sup>/kalmodulin dependentní proteinkináza II (CaMKII)

- regulována komplexem Ca<sup>2+</sup>/kalmodulin, autofosforylace
- katalytická doména - fosforylace
- regulační doména - pseudosubstrát, vazba monomerů do multimerů
- specializované CaMKII - př. kináza lehkého řetězce myozinu






# Přehled proteinkináz

## TYROSIN KINÁZY

- kinázová doména SH1
- receptorové - vázané na plazmatickou membránu, součást receptorů
- nereceptorové - asociují s receptory, děleny do rodin:

### 1. proteinkinázy Src-rodiny

- SH1; regulační domény SH2, SH3; ukotvení k membráně přes SH4
- c-Src - inaktivní: fosforylace Tyr-527, vazba SH2, blok SH1
  - aktivace: defosforylací či vyvázáním fosfátu na Tyr-527, fosforylace Tyr-416
- asociace s receptory - receptorové tyrosinkinázy, receptory vázané s G-proteiny, adhezní receptory



### 2. proteinkinázy Jak-rodiny

- přímá aktivace receptory pro interferon, Jak/STAT signální dráha

### 3. proteinkinázy Syk-rodiny

# Přehled proteinkináz

## MAP-PROTEINKINÁZY

- proteinkinázy aktivované mitogeny

### 1. MAP-kinázakinázakinázy (MAPKKK)


- aktivace MAPKK přes Ser či Thr
- př. Raf-proteinkináza přímo aktivovaná Ras proteinem

### 2. MAP-kinázakinázy (MAPKK)

- aktivace MAPK fosforylací Thr a Tyr (Thr-X-Tyr)
- př. MAP/ERK-proteinkináza (MEK-proteinkináza)

### 3. MAP-kinázy (MAPK)

- po své aktivaci migrují k cílovým molekulám



## SERIN / TREONIN KINÁZY

- proteinkináza A (PAK)
- proteinkináza G (PKG)
- proteinkináza C (PKC)
- Ca<sup>2+</sup>/kalmodulin d. proteinkináza II (CaMKII)


## NERECEPTOROVÉ TYROSIN KINÁZY

- proteinkinázy Src-rodiny
- proteinkinázy Jak-rodiny
- proteinkinázy Syk-rodiny

# Další enzymy signálních drah

## Adenylátcykláza

- ATP → bisfosfát + cyklický adenosinmonofosfátu (cAMP)



## Guanylátcykláza


- GTP → bisfosfát + cyklický guanosinmonofosfát (cGMP)

**Typ 1** - homodimer, receptor pro různé ligandy

- domény: extracelulární, transmembránová kinázová, cyklázová
- př. ANF: vyloučení Na<sup>+</sup> a vody z ledvin


**Typ 2** - rozpustný heterodimer (α, β)

- aktivace vazbou NO
- domény: vazebná (hem), cyklázová




## cAMP-fosfodiesteráza, cGMP-fosfodiesteráza

- hydrolýza cAMP / cGMP na AMP / GMP



# Další enzymy signálních drah



PI fosfatidylinositol  
PIP fosfatidylinositol-4-fosfát  
PIP<sub>2</sub> fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát  
PIP<sub>3</sub> fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát

DAG diacylglycerol  
Ins(1,4,5)P<sub>3</sub> inositol-1,4,5-trisfosfát

**Fوسفولipáza C (PLC)** hydrolyzuje PIP<sub>2</sub> na DAG a Ins(1,4,5)P<sub>3</sub>

# Povrchové receptory

## Signalizace zprostředkovaná povrchovými receptory

1. mimobuněčný signál (ligand)
2. povrchový receptor
3. sekundární přenašeč
4. cílová molekula (efektor)

## Typy povrchových receptorů

### 1. Receptory spojené s iontovými kanály

- průchodnost kanálů dle přítomnosti ligandu
- změna permeability membrány
- rychlá signalizace na synapsích


### 2. Katalytické receptory

- získání katalytické schopnosti po vazbě ligandu
- transmembránové proteiny s PTK aktivitou


### 3. Receptory vázané na G protein

- přes G-protein ovlivňují aktivitu enzymů nebo průchodnost kanálů


Receptory spojené s iontovými kanály




Katalytické receptory



Receptory vázané na G-protein



Intracelulární receptory







# Receptory spojené s iontovým kanálem

- iontový kanál v plazmatické membráně
- vazba ligandu → konformační změna receptoru → otevření kanálu → pohyb iontů → disociace ligandu z receptoru → uzavření kanálu
- ligandy - neurotransmitery, peptidové hormony
- molekuly procházející kanálem - ionty  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Cl}^-$

## Signalizace na synapsích


- převod chemických signálů na elektrické
- excitovaný presynaptický neuron vypouští neurotransmitter, který se váže na receptor spojený s iontovým kanálem
- otevřeným kanálem proudí ionty, které vyvolají excitaci postsynaptického neuronu
- př. receptor pro serotonin  
receptor pro GABA ( $\gamma$ -aminomáslená kyselina)



# Katalytické receptory

## TYROSINPROTEINKINÁZOVÉ RECEPTORY



- tyrosinproteinkinázová aktivita regulovaná ligandy
- společné strukturní rysy
- **extracelulární doména**
  - N-konec, glykosylována
  - vazba ligandu
  - určuje typ signálu, na který bude buňka citlivá
- **transmembránová doména**
  - krátká, hydrofobní,  $\alpha$ -šroubovice
- **cytoplazmatická doména**
  - C-konec, tyrosinproteinkinázová aktivita
  - určuje typ signální dráhy a tím i buněčnou odpověď
- kolem 50 receptorů
- 14 rodin podle motivu v extracelulárních doménách



# Katalytické receptory


## Aktivace tyrosinproteinkinázových receptorů

- vazba ligandu v extracelulární doméně
- změna konformace a dimerizace receptoru
- stimulace tyrosinproteinkinázové aktivity, autofosforylace
- P-Tyr jsou vazebnými místy pro intracelulární proteiny, které předávají signál dál




# SH2 doména

- **Src Homology 2**
- strukturní doména (cca 100 AK) u většiny eukaryotických organismů
- vazba na P-Tyr mění konformaci a aktivitu proteinu s SH2
- **podíl na interakcích signálních molekul**
  - spojuje katalytické receptory s dalšími molekulami signálních drah
  - součástí enzymů (Src, Jak, Lck, Fyn, Syk, PLCG, PI3K)  
adaptorových molekul (Grb2)  
transkripčních faktorů (STAT)  
regulátorů signalizace (SOCS)
- signální dráha přes proteiny Ras = příklad zapojení SH2 domény do signalizací




# Rodina proteinů Ras

- monomerní GTPázy, vazba GDP/GTP
- vazba k plazmatické membráně
- aktivace - **GEF faktor**, uvolnění GDP
- Ras váže GTP a přenáší signál na své efekторы
- inaktivaci - **GAP protein**, hydrolýza GTP
- nadrodina proteinů Ras - rodiny Ras (růst a diferenciace buněk)
  - Rho (morfologie a pohyb buněk)
  - Rab a Arf (transport měchýřků)
  - Ran (jaderný transport)



## Signalizace přes Grb2-Sos



- Grb2 - SH2: aktivovaný tyrosinproteinkinázový receptor
  - SH3: vazba k Sos
- Sos funguje jako GEF a zajišťuje aktivaci Ras




# Rodina proteinů Ras

## MAPK dráha zahájená aktivací Raf

- Raf - Ser/Thr MAPKKK
  - v inaktivním stavu udržuje faktor 14-3-3 konformaci blokující katalytické místo
  - vazba Ras-GTP indukuje disociaci 14-3-3




- MAPKK - MEK
- MAPK - ERK, transport do jádra, aktivace transkripčních faktorů
- transkripční faktory indukují transkripci specifických genů
- přenos signálů od mitogenů
- dominantní při signalizaci určující růst, vývoj a diferenciaci buněk



# Rodina proteinů Ras

## Efektory proteinů Ras






## Nádorová onemocnění

- stále aktivní Ras-GTP (blok hydrolýzy GTP, mutace GAP proteinů)
- H-Ras, K-Ras a N-Ras nejčastější onkogeny nádorových onemocnění (u 20 - 30 % nádorů)
- inhibitory Ras proteinů předmětem protinádorové léčby

# Přímá aktivace transkripčních faktorů

## Signální dráha Jak/STAT


- Jak - asociuje s receptorem
- STAT - transkripční faktory (SH2), translokace cytoplazma → jádro
- vazba cytokinu → dimerizace receptoru → fosforylace Jak, fosforylace receptoru → vazba a aktivace STAT → dimerizuje STAT → translokace do jádra → aktivace cílových genů
- negativní regulace dráhy
  - fosfatáza SHP1: vazba na P-Tyr receptoru (SH2), defosforylace Jak
  - proteiny SOCS: vazba na P-Tyr receptoru (SH2), blok struktury vazba ubikvitin ligázy, degradace Jak v proteazomu






# Sekundární přenašeče


- nízká molekulová hmotnost
- dobře rozpustné
- krátký poločas rozpadu
- intracelulární signály
- přenos, amplifikace a rozdělení signálu z receptorů
- po přijetí signálu aktivovány enzymy zodpovědné za jejich tvorbu
- jejich koncentrace v buňce stoupá a klesá v závislosti na přítomnosti mimobuněčného signálu
- vyvolávají rychlou změnu aktivity enzymů nebo jiných proteinů




**3', 5'-cyklický adenosinmonofosfát (cAMP)**  
Aktivuje proteinkinázu A (PKA)



**3', 5'-cyklický guanosinmonofosfát (cGMP)**  
Aktivuje proteinkinázu G (PKG)





**Inositol-1,4,5-trisfosfát (Ins(1,4,5)P<sub>3</sub>)**  
Otevírá Ca<sup>2+</sup> kanály ER



**1,2-diacylglycerol (DAG)**  
Aktivuje proteinkinázu C (PKC)

# Receptory vázané na G-protein

## G-proteiny (trimerní)



Podjednotka  $\alpha$  - vazba GDP/GTP, GTPáza  
Podjednotky  $\beta\gamma$  - ukotvení v plazmatické membráně

## Základní stav


- asociace  $\alpha\beta\gamma$  podjednotek, GDP na  $\alpha$

## Aktivace

- vazba ligandu na receptor vede k výměně GDP za GTP
- disociace  $\alpha$  od  $\beta\gamma$
- $\alpha$  a  $\beta\gamma$  regulují aktivitu specifických cílových proteinů



## Inaktivace

- po hydrolýze GTP na GDP, návrat do trimerního stavu



# Receptory vázané na G-protein

<b>G<sub>αs</sub></b>	α	aktivace adenylátcyklázy, Ca <sup>2+</sup> kanálů
<b>G<sub>αi</sub></b>	α	inaktivace adenylátcyklázy, aktivace fosfolipázy C a cGMP fosfodiesterázy
	βγ	aktivace K <sup>+</sup> kanálů a fosfolipázy C
<b>G<sub>αq</sub></b>	α	aktivace fosfolipázy C
<b>G<sub>α12</sub></b>	α	aktivace Rho



## Efektory

- adenylátcykláza - nárůst cAMP - aktivace PKA, regulace iontových kanálů
- fosfolipáza C - vznik DAG, Ins(1,4,5)P3 - aktivace PKC, otevření Ca<sup>2+</sup> kanálů
- Ca<sup>2+</sup> kanál

# Receptory vázané na G-protein


Robert J. Lefkowitz, Brian K. Kobilka  
2012 NC za chemii



- sedm  $\alpha$  helixů (22-24 AK) v plazmatické membráně
- $\alpha$  helixy spojeny variabilními smyčkami
  - extracelulární: vazba ligandu
  - intracelulární: vazba G-proteinu
- vazba ligandu mění konformaci intracelulární části receptoru, na kterou se váže a aktivuje G proteinu

## Ligandy


- neurotransmitery, neuropeptidy
- odoranty, lipidy
- hormony - př. serotonin, epinefrin, glukagon, tyrotropin, kalcitonin, ACTH, prostaglandiny
- ztráta citlivosti vlivem přetrvávající přítomnosti ligandu



# Receptory vázané na G-protein


## Biologické účinky

- růst a diferenciace buněk, chemotaxe
- přenos signálů z chuťových, pachových a světelným vjemů
- nervová signalizace
- regulace krevního tlaku, funkce endokrinních žláz
- embryogeneze a vývoj organismu



## Nemoci spjaté s G-proteiny


- nádorová onemocnění (1/5 nádorů)
- infekce virem HIV (CXCR4 a CCR5)
- cholera (*Vibrio cholerae*)
  - cholera toxin z podjednotek A a B
  - podjednotka B: vazba na povrch buněk (GM1)
  - podjednotka A: ADP-ribosylace  $G_{\alpha s}$ , ne hydrolyza GTP
  - hyperaktivace adenylátcyklázy → vysoká koncentrace cAMP v epitelu střeva → propustnost iontových kanálů → únik vody a iontů do lumen střeva → prudké průjmy





# Nitrobuněčné signální dráhy

## Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP)

- koncentrace závislá na aktivitě:  
adenylátcyklázy  
cAMP fosfodiesterázy




- aktivace PKA → fosforylace cílových substrátů
  - i) transkripční faktor CREB: vazba k sekvencím CRE, aktivace příslušných genů
  - ii) receptory steroidních hormonů
  - iii) kináza lehkého řetězce myozinu (MLCK) v buňkách hladké svaloviny



# Nitrobuněčné signální dráhy


## Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP)

- objeven při studiu metabolismu glykogenu
- glykogen - zásobárna glukózy
- při stresu se do krve produkuje adrenalin, který stimuluje svalové a jaterní buňky k uvolnění a štěpení glykogenu



## Mechanismus

- vazba adrenalinu na  $\beta$ -adrenergní receptory svalových buněk
- aktivace G-proteinu  $\rightarrow$  aktivace adenylátcyklázy  $\rightarrow$  zvýšení hladiny cAMP  $\rightarrow$  aktivace PKA
- fosforylace/aktivace fosforylázové kinázy
- fosforylace/aktivace glykogenové fosforylázy
- štěpení glykogenu na glukóza-1-fosfát, která je po defosforylaci uvolněna do krve
- PKA zároveň fosforyluje/inaktivuje glykogen syntázu





# Signalizace přes inzulínový receptor

**Inzulín** - heterodimer, B buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní  
- snižuje hladinu glukózy v krvi, podporuje její využití buňkami a přeměnu na glykogen

**Inzulínový receptor** - IR, tyrosinproteinkinázový receptor, heterotetramer

## Signální dráha

- vazba inzulínu → autofosforylace/aktivace IR → fosforylace/aktivace IRS-1
- na IRS-1 se přes SH2 domény váží
  - i) Grb2-Sos → Ras-Raf-MAPK dráha
  - ii) PI(3)K → tvorba PIP3 → aktivace Akt - translokace glukózového transportéru GLUT4 k membráně  
- aktivace glykogen syntázy







# Nitrobuněčné signální dráhy

## Cyklický guanosinmonofosfát (cGMP)


- koncentrace závislá na aktivitě guanylátcyklázy a cGMP fosfodiesterázy
- aktivuje PKG - stimulace iontových kanálů ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$ )
  - uvolnění hladké svaloviny, dilatace tepen, sekrece  $\text{Na}^+$  a vody v trávicí soustavě
- mění propustnost iontových kanálů v tyčinkách oční sítnice
  - tma: guanylátcykláza tvoří cGMP, iontové kanály otevřeny
  - světlo: absorpce fotonu  $\rightarrow$  aktivace rodopsinu  $\rightarrow$  aktivace G-proteinu  $\rightarrow$  aktivace fosfodiesterázy  $\rightarrow$  hydrolýza cGMP  $\rightarrow$  zavření iontových kanálů  $\rightarrow$  hyperpolarizace membrány  $\rightarrow$  vizuální signál





# Nitrobuněčné signální dráhy

## Dráha $\text{Ca}^{2+}$

- rozdílná koncentrace v cytoplasmě ( $10^{-7}$  M) a mimobuněčné tekutině ( $10^{-3}$  M)
- buňka jej nepřijímá, aktivně vyčerpává, váže do organel
- zvýšení koncentrace v cytoplasmě
  1. depolarizace membrán akčním potenciálem
  2. fosfolipáza C štěpí  $\text{PIP}_2$ , vzniklý  $\text{Ins}(1,4,5)\text{P}_3$  otvírá  $\text{Ca}^{2+}$  kanál endoplazmatického retikula
- cílové proteiny - troponin C v buňkách kosterního svalstva (svalová kontrakce), kalmodulin




$\text{Ca}^{2+}$  signální vlna v oplozeném vajíčku



# Nitrobuněčné signální dráhy

## Kalmodulin

- globulární domény (vazba  $\text{Ca}^{2+}$ ) spojené flexibilní oblastí (vazba k různým substrátům)
- vazba čtyř iontů  $\text{Ca}^{2+}$  mění jeho konformaci, vyšší afinita k proteinům, které mění svoji aktivitu
- úloha v metabolismu (aktivace fosforylázové kinázy), kontrakci hladké svaloviny (aktivace MLCK), expresi genů (CREB), sekreci neurotransmiterů, zánětu, pohybu buněk, apoptóze



## Interakce cAMP a $\text{Ca}^{2+}$ drah


- komplex  $\text{Ca}^{2+}$ /kalmodulin může vázat a regulovat aktivitu adenylátcyklázy a fosfodiesterázy
- PKA může fosforylovat některé kanály určující obsah  $\text{Ca}^{2+}$  v cytosolu
- CaMKII může být fosforylována PKA
- PKA a CaMKII často fosforylují aminokyseliny stejného proteinu (např. CREB)

# Nitrobuněčné signální dráhy

## Dráha inositolových fosfolipidů



- PLC $\beta$  aktivována G-proteinem z rodiny G $\alpha_q$
- PLC $\gamma$  aktivována po vazbě na tyrosinproteinkinázový receptor (SH2 doména)
- Ins(1,4,5)P<sub>3</sub> uvolňuje Ca<sup>2+</sup> z buněčných zásob
- DAG aktivuje PKC, PI3K



# Oxid dusnatý při vazodilataci - mechanismus účinku



Nervová zakončení signalizující uvolnění hladké svaloviny uvolňují acetylcholin

## Buňky endotelu

- vazba acetylcholinu na receptor vázaný na G-protein, aktivace  $G\alpha_q$
- aktivace  $PLC\beta$ , produkce  $Ins(1,4,5)P_3$
- uvolnění  $Ca^{2+}$  z endoplazmatického retikula, tvorba komplexu  $Ca^{2+}$ /kalmodulin
- aktivace NO syntázy, produkce NO, který difunduje k buňkám hladké svaloviny




## Buňky hladké svaloviny

- vstup NO membránou, aktivace rozpustné guanylátcyklázy, produkce cGMP
- aktivace PKG, fosforylace řady svalových proteinů, relaxace svalové buňky



# Utlumení signálních drah



- snížení hladiny hormonů, defosforylace složek signálních drah, degradace sekundárních přenašečů
- nitrobuněčné negativní regulátory (SOCS)
- odstranění receptorů z povrchu buňky endocytózou
  - př. pohlcení EGFR do klatrinových váčků, degradace v lysozomu
- přítomnost mutantních složek signálních drah
  - př. dominantně negativní mutace receptoru pro FGF



- sekrece proteinů, které vychytávají hormony
  - př. kontrola resorpce kostí


# Tvorba kostí u savců

- osteoklasty: odbourávání kostní hmoty, receptor RANK
- osteoblasty: tvorba mezibuněčné hmoty  
produkce ligandu RANKL a osteoprotegerinu (OPG)
- osteocyty: klidová forma osteoblastu
- vazba RANKL na RANK aktivuje diferenciaci osteoklastů, resorpci kostí
- útlum resorpce kosti přes sekreci OPG, který brání vazbě RANKL na RANK
- poruchy tvorby kostí u člověka
  - i) osteoporóza: přílišná resorpce kosti, nedostatečná denzita kostní tkáně, zvýšená křehkost kostí
  - ii) osteopetróza: abnormálně nízká resorpce kosti, zvýšená denzita kostní tkáně  
lámání kostí, poškození kostní dřeně



Normální stav

Osteoporóza



Tvorba kosti

Resorpce kosti

# Zvídavé otázky

---

Buňka dokáže rychle odpovědět na extracelulární signál pokud:

- A. buňka nevyžaduje receptor pro signální molekulu
- B. odpověď nevyžaduje, aby se změnil proteiny v cílové buňce
- C. odpověď nevyžaduje, aby se spustila exprese genů či syntéza proteinů

Co potřebuje cílová buňka, aby mohla odpovědět na extracelulární signální molekulu?

- A. přístup k signální molekule
- B. přítomnost odpovídajícího receptoru
- C. odpovídající intracelulární signální dráhu
- D. vše z uvedeného

Po vazbě ligandu se tyrosinproteinkinázové receptory aktivují dimerizací, což umožňuje:

- A. každý polypeptidový řetězec dimeru fosforyluje sám sebe na tyrosinu cytoplazmatické domény
- B. každý polypeptidový řetězec dimeru fosforyluje druhý řetězec na tyrosinu cytoplazmatické domény
- C. internalizaci receptoru, což umožní fosforylaci a aktivaci různých intracelulárních signálních proteinů

Jaká je funkce diacylglycerolu (DAG) v dráze inositolových fosfolipidů?

- A. Aktivuje fosfolipázu C (PLC)
- B. Sám o sobě váže a aktivuje proteinkinázu C (PKC)
- C. Spolu s  $\text{Ca}^{2+}$  váže PKC z cytosolu k plazmatické membráně a aktivuje ji
- D. Váže se k  $\text{Ca}^{2+}$  kanálům, otevírá je a umožňuje extracelulárními  $\text{Ca}^{2+}$  dostat se do buňky

Mutantní Ras protein, který se často vyskytuje u nádorů, nemůže hydrolyzovat GTP na GDP a proto:

- A. se nemůže zapnout
- B. se nemůže vypnout
- C. nemůže být degradován
- D. je schopný přímo aktivovat MAPK dráhu



# Zvídavé otázky

Každý extracelulární signál indukuje podobnou odpověď v rozdílných cílových buňkách (ANO / NE)

Jaká je funkce inositol-1,4,5-trisfosfátu (Ins(1,4,5)P<sub>3</sub>) v dráze inositolových fosfolipidů?

- A. vytváří díry do membrány endoplazmatického retikula (ER), čímž vypouští Ca<sup>2+</sup> z ER do cytoplazmy
- B. váže se k Ca<sup>2+</sup> kanálům v membráně ER, čímž je otevírá a vypouští Ca<sup>2+</sup> z ER do cytoplazmy
- C. Přímo aktivuje proteinkinázu C (PKC)
- D. Aktivuje fosfolipázu C (PLC)

Když je adenylát cykláza aktivována přes receptor vázaný na G-protein, tak:

- A. mění AMP na cAMP
- B. mění ADP na cAMP
- C. mění ATP na cAMP
- D. mění cAMP na AMP

Protein Ras je aktivován Ras-aktivačním proteinem, který:

- A. způsobuje vazbu Ras ke G-proteinu
- B. fosforyluje Ras
- C. defosforyluje Ras
- D. vyvolává u Ras výměnu GDP za GTP

Paralelní intracelulární signální dráhy mohou interagovat mimojiné proto, že proteinkinázy z jedné dráhy mohou fosforylovat a regulovat proteiny z jiných drah (ANO / NE)

Která z následujících molekul není malou intracelulární signální molekulou (sekundárním přenašečem)?

- A. cAMP
- B. Fosfolipáza C
- C. Inositol-1,4,5-trisfosfát
- D. Diacylglycerol

