

# Diskrétní matematika – 3. týden

## Elementární teorie čísel – Eulerova věta, řád prvku

Lukáš Vokřínek

Masarykova univerzita  
Fakulta informatiky

jaro 2020

# Obsah přednášky

- 1 Aritmetické funkce
  - Eulerova funkce  $\varphi$
- 2 Malá Fermatova věta, Eulerova věta
- 3 Lineární kongruence
- 4 Soustavy lineárních kongruencí o jedné neznámé

# Doporučené zdroje

- Jan Slovák, Martin Panák, Michal Bulant  
**Matematika drsně a svižně**, e-text na  
[www.math.muni.cz/Matematika\\_drsne\\_svizne](http://www.math.muni.cz/Matematika_drsne_svizne).
- Michal Bulant, výukový text k přednášce **Elementární teorie čísel**, <http://is.muni.cz/el/1431/podzim2012/M6520/um/main-print.pdf>
- Jiří Herman, Radan Kučera, Jaromír Šimša, **Metody řešení matematických úloh**. MU Brno, 2001.
- William Stein, **Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets**, Springer, 2008. Dostupné na  
<http://wstein.org/ent/ent.pdf>
- Radan Kučera, výukový text k přednášce **Algoritmy teorie čísel**,  
<http://www.math.muni.cz/~kucera/texty/ATC10.pdf>

# Aritmetické funkce

Aritmetickou funkcí zde rozumíme funkci, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel.

## Definice

Rozložme přirozené číslo  $n$  na prvočísla:  $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ . Hodnotu Möbiovy funkce  $\mu(n)$  definujeme rovnu 0, pokud pro některé  $i$  platí  $\alpha_i > 1$  a rovnu  $(-1)^k$  v opačném případě. Dále definujeme  $\mu(1) = 1$ .

## Příklad

$$\mu(4) = \mu(2^2) = 0, \mu(6) = \mu(2 \cdot 3) = (-1)^2, \mu(2) = \mu(3) = -1.$$

Dokážeme nyní několik důležitých vlastností Möbiovy funkce, zejména tzv. *Möbiovu inverzní formuli*.

### Lemma

Pro  $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$  platí  $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ .

### Důkaz.

Zapříšeme-li  $n$  ve tvaru  $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ , pak všechny dělitele  $d$  čísla  $n$  jsou tvaru  $d = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ , kde  $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$  pro všechna  $i \in \{1, \dots, k\}$ . Proto

$$\begin{aligned}\sum_{d|n} \mu(d) &= \sum_{\substack{(\beta_1, \dots, \beta_k) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^k \\ 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i}} \mu(p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}) = \\ &= \sum_{(\beta_1, \dots, \beta_k) \in \{0,1\}^k} \mu(p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}) \\ &= \binom{k}{0} + \binom{k}{1} \cdot (-1) + \binom{k}{2} \cdot (-1)^2 + \cdots + \binom{k}{k} \cdot (-1)^k \\ &= (1 + (-1))^k = 0.\end{aligned}$$

S Möbiiovou funkcí úzce souvisí pojem *Dirichletův součin* (konvoluce):

### Definice

Bud'te  $f, g$  aritmetické funkce. Jejich *Dirichletův součin* je definován předpisem

$$(f \circ g)(n) = \sum_{d|n} f(d) \cdot g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d_1 d_2 = n} f(d_1) \cdot g(d_2).$$

### Lemma

*Dirichletův součin je asociativní.*

### Důkaz.

$$((f \circ g) \circ h)(n) = \sum_{d_1 d_2 d_3 = n} f(d_1) \cdot g(d_2) \cdot h(d_3) = (f \circ (g \circ h))(n)$$



## Příklad

Definujme dvě pomocné funkce  $\mathbb{I}$  a  $I$  předpisem  $\mathbb{I}(1) = 1$ ,  $\mathbb{I}(n) = 0$  pro všechna  $n > 1$ , resp.  $I(n) = 1$  pro všechna  $n \in \mathbb{N}$ . Pak pro každou aritmetickou funkci  $f$  platí:

$$f \circ \mathbb{I} = \mathbb{I} \circ f = f \quad \text{a} \quad (I \circ f)(n) = (f \circ I)(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

Dále platí  $I \circ \mu = \mu \circ I = \mathbb{I}$ , neboť

$$\begin{aligned} (I \circ \mu)(n) &= \sum_{d|n} I(d)\mu\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} I\left(\frac{n}{d}\right)\mu(d) = \\ &= \sum_{d|n} \mu(d) = 0 \quad \text{pro všechna } n > 1 \end{aligned}$$

podle lemmatu za definicí Möbiovy funkce (pro  $n = 1$  je tvrzení zřejmé).

## Věta (Möbiova inverzní formule)

*Nechť je aritmetická funkce  $F$  definovaná pomocí aritmetické funkce  $f$  předpisem  $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ . Pak lze funkci  $f$  vyjádřit ve tvaru*

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \cdot F(d).$$

### Důkaz.

Vztah  $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$  lze jiným způsobem zapsat jako  $F = f \circ I$ . Proto  $F \circ \mu = (f \circ I) \circ \mu = f \circ (I \circ \mu) = f \circ \mathbb{I} = f$ , což je tvrzení věty. □

## Definice

Multiplikativní funkcí přirozených čísel rozumíme takovou aritmetickou funkci, která splňuje, že pro všechny dvojice **nesoudělných** čísel  $a, b \in \mathbb{N}$  platí

$$f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b).$$

## Příklad

Multiplikativními funkcemi jsou např. funkce  $f(n) = \sigma(n)$ ,  $f(n) = \tau(n)$ , či  $f(n) = \mu(n)$  nebo, jak brzy dokážeme i tzv. Eulerova funkce  $f(n) = \varphi(n)$ .

# Eulerova funkce

## Definice

Nechť  $n \in \mathbb{N}$ . Definujme Eulerovu funkci  $\varphi$  předpisem

$$\varphi(n) = |\{a \in \mathbb{N} \mid 0 < a \leq n, (a, n) = 1\}|$$

## Příklad

$\varphi(1) = 1, \varphi(5) = 4, \varphi(6) = 2$ , je-li p prvočíslo, je zřejmě  
 $\varphi(p) = p - 1$ .

Nyní dokážeme několik důležitých tvrzení o funkci  $\varphi$ :

### Lemma

*Nechť  $n \in \mathbb{N}$ . Pak  $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ .*

### Důkaz.

Uvažme  $n$  zlomků

$$\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}.$$

Zkrátíme-li zlomky na základní tvar a seskupíme podle jmenovatelů, snadno dostaneme právě uvedené tvrzení. □

## Věta

Nechť  $n \in \mathbb{N}$ , jehož rozklad je tvaru  $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ . Pak

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

## Důkaz.

S využitím předchozího lemmatu a Möbiovy inverzní formule dostáváme

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = n - \frac{n}{p_1} - \cdots - \frac{n}{p_k} + \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 \cdots p_k} = \\ &= n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).\end{aligned}$$



## Poznámka

Předchozí výsledek lze obdržet i bez použití Möbiovy inverzní formule pomocí principu inkluze a exkluze na základě zjištění počtu čísel soudělných s  $n$  v určitém intervalu.

## Důsledek

Nechť  $a, b \in \mathbb{N}$ ,  $(a, b) = 1$ . Pak

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

## Poznámka

Rovněž toto tvrzení lze odvodit nezávisle na základě poznatku  $(n, ab) = 1 \iff (n, a) = 1 \wedge (n, b) = 1$ . Spolu se snadno odvoditelným výsledkem

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = (p - 1) \cdot p^{\alpha-1}$$

pak lze odvodit vztah pro výpočet  $\varphi$  již třetím způsobem.

## Příklad

Vypočtěte  $\varphi(72)$ .

## Řešení

$$72 = 2^3 \cdot 3^2 \implies \varphi(72) = 72 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 24, \text{ alternativně}$$
$$\varphi(72) = \varphi(8) \cdot \varphi(9) = 4 \cdot 6 = 24.$$

□

## Příklad

Dokažte, že  $\forall n \in \mathbb{N} : \varphi(4n+2) = \varphi(2n+1)$ .

## Řešení

$$\varphi(4n+2) = \varphi(2 \cdot (2n+1)) = \varphi(2) \cdot \varphi(2n+1) = \varphi(2n+1).$$

□

# Malá Fermatova věta

Tato tvrzení patří mezi nejdůležitější výsledky elementární teorie čísel.

## Věta (Fermatova, Malá Fermatova)

Nechť  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $p$  prvočíslo,  $p \nmid a$ . Pak

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

## Důkaz.

Tvrzení vyplýne jako snadný důsledek Eulerovy věty. Dá se ale dokázat i přímo (např. matematickou indukcí nebo kombinatoricky) □

## Důsledek

Nechť  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $p$  prvočíslo. Pak

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

# Úplná a redukovaná soustava zbytků

## Definice

*Úplná soustava zbytků modulo  $m$*  je libovolná  $m$ -tice čísel po dvou nekongruentních modulo  $m$  (nejčastěji  $0, 1, \dots, m - 1$ ).

*Redukovaná soustava zbytků modulo  $m$*  je libovolná  $\varphi(m)$ -tice čísel nesoudělných s  $m$  a po dvou nekongruentních modulo  $m$ .

## Lemma

*Nechť  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$  tvoří redukovanou soustavu zbytků modulo  $m$ . Je-li  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = 1$  pak i čísla  $a \cdot x_1, \dots, a \cdot x_{\varphi(m)}$  tvoří redukovanou soustavu zbytků modulo  $m$ .*

## Důkaz.

Protože  $(a, m) = 1$  a  $(x_i, m) = 1$ , platí  $(a \cdot x_i, m) = 1$ . Kdyby pro nějaká  $i, j$  platilo  $a \cdot x_i \equiv a \cdot x_j \pmod{m}$ , po vydělení obou stran kongruence číslem  $a$  nesoudělným s  $m$  dostaneme  $x_i \equiv x_j \pmod{m}$ . □

# Eulerova věta

## Věta (Eulerova)

Nechť  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $m \in \mathbb{N}$ ,  $(a, m) = 1$ . Pak

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

## Důkaz.

Budť  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$  libovolná redukovaná soustava zbytků modulo  $m$ . Podle předchozího lemmatu je i  $a \cdot x_1, \dots, a \cdot x_{\varphi(m)}$  redukovaná soustava zbytků modulo  $m$ . Platí tedy, že pro každé  $i$  existuje  $j$  ( $i, j \in \{1, 2, \dots, \varphi(m)\}$ ) tak, že  $a \cdot x_i \equiv x_j \pmod{m}$ .

Vynásobením dostáváme

$(a \cdot x_1) \cdot (a \cdot x_2) \cdots (a \cdot x_{\varphi(m)}) \equiv x_1 \cdot x_2 \cdots x_{\varphi(m)} \pmod{m}$ . Po úpravě

$$a^{\varphi(m)} \cdot x_1 \cdot x_2 \cdots x_{\varphi(m)} \equiv x_1 \cdot x_2 \cdots x_{\varphi(m)} \pmod{m}$$

vydělení číslem  $x_1 \cdot x_2 \cdots x_{\varphi(m)}$  dostaneme požadované. □

# Řád čísla

S Eulerovou funkcí a Eulerovou větou úzce souvisí důležitý pojem  
*řád čísla modulo m*:

## Definice

Nechť  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $m \in \mathbb{N}$  ( $a, m) = 1$ . *Řádem čísla a modulo m* rozumíme nejmenší přirozené číslo  $n$  splňující

$$a^n \equiv 1 \pmod{m}.$$

## Poznámka

To, že je řád definován, plyne z Eulerovy věty – pro každé číslo nesoudělné s modulem je totiž jistě jeho řád nejvýše roven  $\varphi(m)$ . Jak později uvidíme, velmi důležitá jsou právě ta čísla, jejichž **řád je roven právě  $\varphi(m)$**  – tato čísla nazýváme primitivními kořeny modulo  $m$  a hrají důležitou roli mj. při řešení binomických kongruencí.

## Příklad

Pro libovolné  $m \in \mathbb{N}$  má číslo 1 modulo  $m$  řád 1. Číslo  $-1$  má řád

- 1 pro  $m = 1$  nebo  $m = 2$
- 2 pro  $m > 2$

## Příklad

Určete řád čísla 2 modulo 7.

## Řešení

$$2^1 = 2 \not\equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^2 = 4 \not\equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

Řád čísla 2 modulo 7 je tedy roven 3.



Uveďme nyní několik zásadních tvrzení udávajících vlastnosti řádu čísla modulo  $m$ :

### Lemma

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = (b, m) = 1$ . Jestliže  $a \equiv b \pmod{m}$ , pak obě čísla  $a, b$  mají stejný řád modulo  $m$ .

### Důkaz.

Umocněním kongruence  $a \equiv b \pmod{m}$  na  $n$ -tou dostaneme  $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ , tedy  $a^n \equiv 1 \pmod{m} \iff b^n \equiv 1 \pmod{m}$ .



## Lemma

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = 1$ . Je-li řád čísla  $a$  modulo  $m$  roven  $r \cdot s$ , (kde  $r, s \in \mathbb{N}$ ), pak řád čísla  $a^r$  modulo  $m$  je roven  $s$ .

## Důkaz.

Protože žádné z čísel  $a, a^2, a^3, \dots, a^{rs-1}$  není kongruentní s 1 modulo  $m$ , není ani žádné z čísel  $a^r, a^{2r}, a^{3r}, \dots, a^{(s-1)r}$  kongruentní s 1. Platí ale  $(a^r)^s \equiv 1 \pmod{m}$ , proto je řád  $a^r$  modulo  $m$  roven  $s$ . □

## Poznámka

Opak obecně neplatí – z toho, že řád čísla  $a^r$  modulo  $m$  je roven  $s$  ještě neplyne, že řád čísla  $a$  modulo  $m$  je  $r \cdot s$ .

Např pro  $m = 13$  máme:

$a = 3$ ,  $a^2 = 9 \pmod{13}$ ,  $a^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13} \Rightarrow 3$  má řád 3 mod 13.

$b = -4$ ,  $b^2 = 16 \not\equiv 1 \pmod{13}$ ,  $b^3 = -64 \equiv 1 \pmod{13} \Rightarrow -4$  má řád 3 mod 13.

Přitom  $(-4)^2 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$  má stejný řád 3 jako číslo 3, ale číslo  $-4$  nemá řád  $2 \cdot 3$ .

Přesný popis závislosti řádu na exponentu dávají následující 2 věty:

### Věta

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = 1$ . Označme  $r$  řád čísla  $a$  modulo  $m$ . Pak pro libovolná  $t, s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  platí

$$a^t \equiv a^s \pmod{m} \iff t \equiv s \pmod{r}.$$

## Důkaz.

Bez újmy na obecnosti lze předpokládat, že  $t \geq s$ . Vydělíme-li číslo  $t - s$  číslem  $r$  se zbytkem, dostaneme  $t - s = q \cdot r + z$ , kde  $q, z \in \mathbb{N}_0, 0 \leq z < r$ .

" $\Leftarrow$ " Protože  $t \equiv s \pmod{r}$ , máme  $z = 0$ , a tedy  $a^{t-s} = a^{qr} = (a^r)^q \equiv 1^q \pmod{m}$ . Vynásobením obou stran kongruence číslem  $a^s$  dostaneme tvrzení.

" $\Rightarrow$ " Z  $a^t \equiv a^s \pmod{m}$  plyne  $a^s \cdot a^{qr+z} \equiv a^s \pmod{m}$ . Protože je  $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ , je rovněž  $a^{qr+z} \equiv a^z \pmod{m}$ . Celkem po vydělení obou stran kongruence číslem  $a^s$  (které je nesoudělné s modulem), dostáváme  $a^z \equiv 1 \pmod{m}$ . Protože  $z < r$ , plyne z definice řádu, že  $z = 0$ , a tedy  $r \mid t - s$ . □

Zřejmým důsledkem předchozí věty a Eulerovy věty je následující tvrzení

### Důsledek

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = 1$ . Označme  $r$  řád čísla  $a$  modulo  $m$ .

- 1 Pro libovolné  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  platí

$$a^n \equiv 1 \pmod{m} \iff r \mid n.$$

- 2  $r \mid \varphi(m)$

Následující věta je zobecněním předchozího Lemmatu.

### Věta

Nechť  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = 1$ . Je-li řad čísla  $a$  modulo  $m$  roven  $r \in \mathbb{N}$ , je řad čísla  $a^n$  modulo  $m$  roven  $\frac{r}{(n,r)}$ .

### Důkaz.

Protože  $\frac{r \cdot n}{(r,n)} = [r, n]$ , což je zřejmě násobek  $r$ , máme

$$(a^n)^{\frac{r}{(r,n)}} = a^{[r,n]} \equiv 1 \pmod{m}$$

(plyne z předchozího Důsledku, neboť  $r \mid [r, n]$ ). Na druhou stranu, je-li  $k \in \mathbb{N}$  libovolné takové, že  $(a^n)^k = a^{n \cdot k} \equiv 1 \pmod{m}$ , dostáváme ( $r$  je řad  $a$ ), že  $r \mid n \cdot k$  a dále víme, že  $\frac{r}{(n,r)} \mid \frac{n}{(n,r)} \cdot k$  a díky nesoudělnosti čísel  $\frac{r}{(n,r)}$  a  $\frac{n}{(n,r)}$  dostáváme  $\frac{r}{(n,r)} \mid k$ . Proto je  $\frac{r}{(n,r)}$  řádem čísla  $a^n$  modulo  $m$ . □

Poslední z této řady tvrzení dává do souvislosti řady dvou čísel a řad jejich součinu:

### Lemma

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = (b, m) = 1$ . Jestliže  $a$  je řádu  $r$  a  $b$  je řádu  $s$  modulo  $m$ , kde  $(r, s) = 1$ , pak číslo  $a \cdot b$  je řádu  $r \cdot s$  modulo  $m$ .

### Důkaz.

Označme  $\delta$  řád čísla  $a \cdot b$ . Pak  $(ab)^\delta \equiv 1 \pmod{m}$  a umocněním obou stran kongruence dostaneme  $a^{r\delta} b^{r\delta} \equiv 1 \pmod{m}$ . Protože je  $r$  řádem čísla  $a$ , je  $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ , tj.  $b^{r\delta} \equiv 1 \pmod{m}$ , a proto  $s \mid r\delta$ . Z nesoudělnosti  $r$  a  $s$  plyne  $s \mid \delta$ . Analogicky dostaneme i  $r \mid \delta$ , a tedy (opět s využitím nesoudělnosti  $r, s$ )  $r \cdot s \mid \delta$ . Obráceně zřejmě platí  $(ab)^{rs} \equiv 1 \pmod{m}$ , proto  $\delta \mid rs$ . Celkem tedy  $\delta = rs$ .



# Kongruence o jedné neznámé

## Definice

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$ . Zápis

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m}$$

nazýváme *kongruencí o jedné neznámé  $x$*  a rozumíme jím úkol  
nalézt *množinu řešení*, tj. množinu všech takových čísel  $c \in \mathbb{Z}$ , pro  
která  $f(c) \equiv g(c) \pmod{m}$ .

Dvě kongruence o jedné neznámé nazveme *ekvivalentní*, mají-li  
stejnou množinu řešení.

Uvedená kongruence je ekvivalentní s kongruencí

$$\underbrace{f(x) - g(x)}_{\in \mathbb{Z}[x]} \equiv 0 \pmod{m}.$$

# Hledání řešení výčtem všech možností

## Věta

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ . Pro libovolná  $a, b \in \mathbb{Z}$  platí

$$a \equiv b \pmod{m} \implies f(a) \equiv f(b) \pmod{m}.$$

## Důkaz.

Nechť je  $f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ , kde  $c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Z}$ . Protože  $a \equiv b \pmod{m}$ , pro každé  $i = 1, 2, \dots, n$  platí  $c_i a^i \equiv c_i b^i \pmod{m}$ , a tedy sečtením těchto kongruencí pro  $i = 1, 2, \dots, n$  a kongruence  $c_0 \equiv c_0 \pmod{m}$  dostaneme

$$c_n a^n + \cdots + c_1 a + c_0 \equiv c_n b^n + \cdots + c_1 b + c_0 \pmod{m},$$

tj.  $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$ .



# Počet řešení kongruence

## Důsledek

*Množina řešení libovolné kongruence modulo  $m$  je sjednocením některých zbytkových tříd modulo  $m$ .*

## Definice

*Počtem řešení kongruence o jedné neznámé modulo  $m$  rozumíme počet zbytkových tříd modulo  $m$  obsahujících řešení této kongruence.*

## Příklad

- 1 Kongruence  $2x \equiv 3 \pmod{3}$  má jedno řešení (modulo 3).
- 2 Kongruence  $10x \equiv 15 \pmod{15}$  má pět řešení (modulo 15).
- 3 Kongruence z příkladu (1) a (2) jsou ekvivalentní.

## Věta

Nechť  $m \in \mathbb{N}$ ,  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Označme  $d = (a, m)$ . Pak kongruence

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

(o jedné neznámé  $x$ ) má řešení právě tehdy, když  $d \mid b$ .

Pokud platí  $d \mid b$ , má tato kongruence právě  $d$  řešení (modulo  $m$ ).

## Důkaz.

Dokážeme nejprve, že uvedená podmínka je nutná. Je-li celé číslo  $c$  řešením této kongruence, pak nutně  $m \mid a \cdot c - b$ . Pokud přitom  $d = (a, m)$ , pak protože  $d \mid m$  i  $d \mid a \cdot c - b$  a  $d \mid a \cdot c - (a \cdot c - b) = b$ .

## Dokončení důkazu.

Obráceně dokážeme, že pokud  $d \mid b$ , pak má daná kongruence právě  $d$  řešení modulo  $m$ . Označme  $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$  a  $m_1 \in \mathbb{N}$  tak, že  $a = d \cdot a_1$ ,  $b = d \cdot b_1$  a  $m = d \cdot m_1$ . Řešená kongruence je tedy ekvivalentní s kongruencí

$$a_1 \cdot x \equiv b_1 \pmod{m_1},$$

kde  $(a_1, m_1) = 1$ . Tuto kongruenci můžeme vynásobit číslem  $a_1^{\varphi(m_1)-1}$  a díky Eulerově větě obdržíme

$$x \equiv b_1 \cdot a_1^{\varphi(m_1)-1} \pmod{m_1}.$$

Tato kongruence má jediné řešení modulo  $m_1$  a tedy  $d = m/m_1$  řešení modulo  $m$ .



Následující příklad ukáže, že postup uvedený v důkazu věty obvykle není tím nejfektivnějším – s výhodou lze použít jak Bezoutovu větu, tak ekvivalentní úpravy řešené kongruence.

## Příklad

Řešte  $39x \equiv 41 \pmod{47}$

- 1 Nejprve využijeme Eulerovu větu, stejně jako v důkazu předchozí věty.
- 2 Další možností je využít Bezoutovu větu.
- 3 Obvykle nejrychlejším, ale nejhůře algoritmizovatelným způsobem řešení je metoda takových úprav kongruence, které zachovávají množinu řešení.

$$\begin{aligned} 39x \equiv 41 \pmod{47} &\iff -8x \equiv -6 \pmod{47} \iff \\ 4x \equiv 3 \pmod{47} &\iff 4x \equiv -44 \pmod{47} \iff \\ x \equiv -11 \pmod{47} &\iff x \equiv 36 \pmod{47} \end{aligned}$$

# Wilsonova věta

Pomocí věty o řešitelnosti lineárních kongruencí lze dokázat mj. významnou Wilsonovu větu udávající nutnou (i postačující) podmínu prvočíselnosti. Takové podmínky jsou velmi významné ve výpočetní teorii čísel, kdy je třeba efektivně poznat, je-li dané velké číslo prvočíslem. Bohužel dosud není známo, jak rychle vypočítat modulární faktoriál velkého čísla, proto není v praxi Wilsonova věta k tomuto účelu používána.

## Věta (Wilsonova)

*Přirozené číslo  $n > 1$  je prvočíslo, právě když*

$$(n - 1)! \equiv -1 \pmod{n}$$

Vcelku přímočarý důkaz je v učebnici.

# Soustavy lineárních kongruencí

Máme-li soustavu lineárních kongruencí o téže neznámé, můžeme podle předchozí věty rozhodnout o řešitelnosti každé z nich.

V případě, kdy aspoň jedna z kongruencí nemá řešení, nemá řešení ani celá soustava. Naopak, jestliže každá z kongruencí řešení má, upravíme ji do tvaru  $x \equiv c_i \pmod{m_i}$ . Dostaneme tak soustavu kongruencí

$$x \equiv c_1 \pmod{m_1}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv c_k \pmod{m_k}$$

Zřejmě stačí vyřešit případ  $k = 2$ , řešení soustavy více kongruencí snadno obdržíme opakováným řešením soustav dvou kongruencí.

## Věta

Nechť  $c_1, c_2$  jsou celá čísla,  $m_1, m_2$  přirozená. Označme  $d = (m_1, m_2)$ . Soustava dvou kongruencí

$$x \equiv c_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv c_2 \pmod{m_2}$$

v případě  $c_1 \not\equiv c_2 \pmod{d}$  nemá řešení. Jestliže naopak  $c_1 \equiv c_2 \pmod{d}$ , pak existuje celé číslo  $c$  tak, že  $x \in \mathbb{Z}$  vyhovuje soustavě, právě když vyhovuje kongruenci

$$x \equiv c \pmod{[m_1, m_2]}.$$

## Důkaz.

Má-li soustava nějaké řešení  $x \in \mathbb{Z}$ , platí nutně  $x \equiv c_1 \pmod{d}$ ,  $x \equiv c_2 \pmod{d}$ , a tedy i  $c_1 \equiv c_2 \pmod{d}$ . Odtud plyne, že v případě  $c_1 \not\equiv c_2 \pmod{d}$  soustava nemůže mít řešení.

## Dokončení důkazu.

Předpokládejme dále  $c_1 \equiv c_2 \pmod{d}$ . První kongruenci řešené soustavy vyhovují všechna celá čísla  $x$  tvaru  $x = c_1 + tm_1$ , kde  $t \in \mathbb{Z}$  je libovolné. Toto  $x$  bude vyhovovat i druhé kongruenci soustavy, právě když bude platit  $c_1 + tm_1 \equiv c_2 \pmod{m_2}$ , tj.  $tm_1 \equiv c_2 - c_1 \pmod{m_2}$ . Podle věty o řešitelnosti lineárních kongruencí má tato kongruence (vzhledem k  $t$ ) řešení, neboť  $d = (m_1, m_2)$  dělí  $c_2 - c_1$ , a  $t \in \mathbb{Z}$  splňuje tuto kongruenci právě když

$$t \equiv \frac{c_2 - c_1}{d} \cdot \left( \frac{m_1}{d} \right)^{\varphi(\frac{m_2}{d})-1} \pmod{\frac{m_2}{d}},$$

tj. právě když

$$x = c_1 + tm_1 = c_1 + (c_2 - c_1) \cdot \left( \frac{m_1}{d} \right)^{\varphi(\frac{m_2}{d})} + r \frac{m_1 m_2}{d} = c + r \cdot [m_1, m_2],$$

kde  $r \in \mathbb{Z}$  je libovolné a  $c = c_1 + (c_2 - c_1) \cdot (m_1/d)^{\varphi(m_2/d)}$ , neboť  $m_1 m_2 = d \cdot [m_1, m_2]$ . Našli jsme tedy takové  $c \in \mathbb{Z}$ , že libovolné  $x \in \mathbb{Z}$  splňuje soustavu, právě když  $x \equiv c \pmod{[m_1, m_2]}$ , což jsme chtěli dokázat. □

Všimněme si, že důkaz této věty je konstruktivní, tj. udává vzorec, jak číslo  $c$  najít. Věta nám tedy dává metodu, jak pomocí jediné kongruence zachytit podmínu, že  $x$  vyhovuje této soustavě . Podstatné je, že tato nová kongruence je téhož tvaru jako obě původní. Můžeme proto tuto metodu aplikovat i na soustavu – nejprve z první a druhé kongruence vytvoříme kongruenci jedinou, které vyhovují právě ta  $x$ , která vyhovovala původním dvěma kongruencím, pak z nově vzniklé a z třetí kongruence vytvoříme další atd. Při každém kroku se nám počet kongruencí soustavy sníží o 1, po  $k - 1$  krocích tedy dostaneme kongruenci jedinou, která nám bude popisovat všechna řešení dané soustavy.

# Čínská zbytková věta (CRT)

Ve čtvrtém století se čínský matematik Sun Ze (Sun Tsu) ptal na číslo, které při dělení třemi dává zbytek 2, při dělení pěti zbytek 3 a při dělení sedmi je zbytek opět 2.

## Důsledek (Čínská zbytková věta)

Nechť  $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$  jsou po dvou nesoudělná,  $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ .  
Pak platí: soustava

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

má jediné řešení modulo  $m_1 \cdot m_2 \cdots m_k$ .

## Důkaz.

Jde o jednoduchý důsledek předchozího tvrzení, který lze ale rovněž elegantně dokázat přímo. □

Uvědomme si, že jde o docela silné tvrzení (které ve skutečnosti platí v podstatně obecnějších algebraických strukturách), umožňující nám při předepsání libovolných zbytků podle zvolených (po dvou nesoudělných) modulů garantovat, že existuje číslo s těmito předepsanými zbytky.

### Příklad

Řešte systém kongruencí

$$\begin{aligned}x &\equiv 1 \pmod{10} \\x &\equiv 5 \pmod{18} \\x &\equiv -4 \pmod{25}.\end{aligned}$$

### Řešení

Výsledkem je  $x \equiv 221 \pmod{450}$ .

Čínskou zbytkovou větu můžeme použít také „v opačném směru“.

### Příklad

Řešte kongruenci  $23\,941x \equiv 915 \pmod{3564}$ .

### Řešení

Rozložme  $3564 = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 11$ . Protože ani 2, ani 3, ani 11 nedělí číslo 23 941, platí  $(23\,941, 3564) = 1$  a má tedy kongruence řešení. Protože  $\varphi(3564) = 2 \cdot (3^3 \cdot 2) \cdot 10 = 1080$ , je řešení tvaru  $x \equiv 915 \cdot 23\,941^{1079} \pmod{3564}$ . Úprava čísla stojícího na pravé straně by však vyžádala značné úsilí. Proto budeme kongruenci řešit poněkud jinak.

## Řešení

Víme, že  $x \in \mathbb{Z}$  řešením dané kongruence, právě když je řešením soustavy

$$23941x \equiv 915 \pmod{2^2}$$

$$23941x \equiv 915 \pmod{3^4}$$

$$23941x \equiv 915 \pmod{11}.$$

Vyřešíme-li postupně každou z kongruencí soustavy, dostaneme ekvivalentní soustavu

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv -3 \pmod{81}$$

$$x \equiv -4 \pmod{11},$$

odkud snadno postupem pro řešení soustav kongruencí dostaneme  $x \equiv -1137 \pmod{3564}$ , což je také řešení zadанé kongruence.

# Modulární reprezentace čísel

Při počítání s velkými čísly je někdy výhodnější než s dekadickým či binárním zápisem čísel pracovat s tzv. *modulární reprezentací* (též *residue number system*), která umožňuje snadnou paralelizaci výpočtů s velkými čísly. Takový systém je určen  $k$ -ticí modulů (obvykle po dvou nesoudělných) a každé číslo menší než jejich součin je pak jednoznačně reprezentováno  $k$ -ticí zbytků (jejichž hodnoty nepřevyšují příslušné moduly) – viz např.

<http://goo.gl/oM25m>.

## Příklad

Pětice modulů  $3, 5, 7, 11, 13$  nám umožní jednoznačně reprezentovat čísla menší než  $15015$  a efektivně provádět (v případě potřeby distribuovaně) běžné aritmetické operace.

Vypočtěme např. součin čísel  $1234$  a  $5678$ , v této modulární soustavě reprezentovaných pěticemi  $[1, 4, 2, 2, 12]$  a  $[2, 3, 1, 2, 10]$ . Součin provedeme po složkách a dostaneme  $[2, 2, 2, 4, 3]$ , což na závěr pomocí CRT převedeme zpět na  $9662$ , což je modulo  $15015$  totéž jako  $1234 \cdot 5678$ .