

Svazy

Bud' (A, \leq) uspořádaná množina a $B \subseteq A$ podmnožina. Prvek $a \in A$ se nazývá **dolní závora** množiny B , jestliže pro každý prvek $b \in B$ platí $a \leq b$. Podmnožina $B \subseteq A$ se nazývá **zdola ohraničená**, má-li alespoň jednu dolní závora v (A, \leq) . Duálními pojmy k těmto pojům jsou **horní závora** podmnožiny B a **shora ohraničená** podmnožina B . To opět znamená, že prvek $a \in A$ je horní závora množiny B v (A, \leq) právě tehdy, když tento prvek je dolní závora množiny B v duálně uspořádané množině (A, \geq) , a podmnožina B je shora ohraničená v (A, \leq) právě tehdy, když je zdola ohraničená v (A, \geq) .

Bud' opět (A, \leq) uspořádaná množina a $B \subseteq A$ podmnožina. Prvek $a \in A$ se nazývá **infimum** množiny B , jestliže

a je dolní závora množiny B a přitom
pro každou dolní závora $c \in A$ množiny B platí $c \leq a$.

To znamená, že takový prvek a je největší dolní závora množiny B . Je tedy infimum množiny B , pokud existuje, určeno jednoznačně a značí se symbolem $\inf B$. Duálním pojmem k tomuto pojmu je **supremum** množiny B a značí se symbolem $\sup B$.

Příklad. V uspořádané množině $(\mathbb{N}, |)$ má každá neprázdňá konečňá podmnožina $M \subseteq \mathbb{N}$ supremum $\sup M$ – je jím nejmenší společňý násobek čísel obsažených v M . Pro prázdňou množinu \emptyset jakožto podmnožinu v \mathbb{N} pak platí $\sup \emptyset = 1$. Žádná nekonečňá podmnožina $M \subseteq \mathbb{N}$ zde ovšem nemá horní závora a tedy ani supremum, neboť každé číslo $m \in \mathbb{N}$ má jen konečňý počet přirozených dělitelů.

Příklad. Bud' A nekonečňá množina. Označme $\mathcal{F}(A)$ množinu všech těch podmnožin $X \subseteq A$, pro něž jedna z množin $X, A - X$ je konečňá. Je-li nyní $Y \subseteq A$ taková podmnožina,

že obě množiny Y , $A - Y$ jsou nekonečné, pak množina jedno-prvkových množin $\{\{y\} \mid y \in Y\}$ je podmnožinou v $\mathcal{F}(A)$, která v uspořádané množině $(\mathcal{F}(A), \subseteq)$ nemá supremum. Má zde totiž nekonečně mnoho horních závor, z nichž ale žádná není nejmenší.

Poznámky. Buď (A, \leq) uspořádaná množina. Pak $\inf A$ a $\sup \emptyset$ existují právě tehdy, když v A existuje nejmenší prvek x , a v tom případě platí $\inf A = \sup \emptyset = x$. Duální tvrzení platí pro $\sup A$ a $\inf \emptyset$. To znamená, že tyto prvky existují právě tehdy, když v A existuje největší prvek y , a v tom případě platí $\sup A = \inf \emptyset = y$.

Buď dále $B \subseteq A$ podmnožina. Existují-li prvky $\inf B$, resp. $\sup B$, pak každý z těchto prvků může, ale obecně nemusí ležet v samotné množině B . První případ nastává právě tehdy, když množina B má nejmenší, resp. největší prvek. V takovém případě právě tyto prvky představují prvky $\inf B$, resp. $\sup B$.

Uspořádaná množina (A, \leq) , v níž pro libovolné prvky $a, b \in A$ existují $\sup\{a, b\}$ a $\inf\{a, b\}$, se nazývá **svaz**.

Uspořádaná množina (A, \leq) , v níž pro libovolnou podmnožinu $B \subseteq A$ existují $\sup B$ a $\inf B$, se nazývá **úplný svaz**.

Všimněme si, že v uspořádané množině (A, \leq) pro libovolné prvky $a, b \in A$ platí

$$a \leq b \iff \inf\{a, b\} = a \iff \sup\{a, b\} = b.$$

Odtud ihned plyne, že každý řetězec je svaz. Jsou ale řetězce, které nejsou úplnými svazy – například řetězec (\mathbb{Q}, \leq) .

Příklad. Buď A množina a buď $\mathcal{P}(A)$ její potenční množina. Pak v uspořádané množině $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ libovolná podmnožina $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{P}(A)$ má supremum i infimum a platí pro ně

$$\sup \mathcal{Q} = \bigcup \mathcal{Q}, \quad \inf \mathcal{Q} = \bigcap \mathcal{Q}.$$

(Přitom pro podmnožinu $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(A)$ zde chápeme $\bigcap \emptyset$ jako A .)
Je tedy $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ úplný svaz.

Příklad. Bud' A nekonečná množina. Není těžké ověřit, že pak uspořádaná množina $(\mathcal{F}(A), \subseteq)$ z předminulého příkladu je svaz, ale viděli jsme tam, že to není úplný svaz.

Příklad. Uspořádaná množina $(\mathbb{N}, |)$ je svaz, neboť pro každá $m, n \in \mathbb{N}$ je $\sup\{m, n\}$ nejmenší společný násobek čísel m, n a $\inf\{m, n\}$ je největší společný dělitel čísel m, n . Není zde ale největší prvek, takže nejde o úplný svaz. Podobně uspořádaná množina $(\omega, |)$ je svaz a lze se přesvědčit, že se jedná dokonce o úplný svaz.

Tvrzení. Bud' (A, \leq) svaz. Pak pro libovolnou neprázdnou konečnou podmnožinu $B \subseteq A$ existují $\sup B$ a $\inf B$.

Důkaz. Postupujeme indukcí vzhledem k počtu prvků v B . Obsahuje-li B jeden nebo dva prvky, není co dokazovat. V indukčním kroku máme ukázat, že pro libovolnou neprázdnou konečnou podmnožinu $B \subseteq A$, $B \neq A$, pro niž $\sup B$ a $\inf B$ existují, a pro libovolný prvek $a \in A - B$ existují také $\sup(B \cup \{a\})$ a $\inf(B \cup \{a\})$. Ověříme například existenci $\sup(B \cup \{a\})$. Uvažme prvek $c = \sup\{\sup B, a\}$. Poněvadž $c \geq \sup B$ a $c \geq a$, je jasné, že c je horní závora množiny $B \cup \{a\}$. Nechť nyní d je libovolná horní závora množiny $B \cup \{a\}$. Pak $d \geq a$ a d je rovněž horní závora množiny B , odkud plyne $d \geq \sup B$. Celkem tedy $d \geq \sup\{\sup B, a\}$, čili $d \geq c$. To ukazuje, že $c = \sup(B \cup \{a\})$.

Důsledek. Každý konečný neprázdný svaz je úplný.

Často užíváme následujícího jednoduššího označení. Je-li (A, \leq) svaz, pak pro libovolné prvky $a, b \in A$ prvek $\sup\{a, b\}$ značíme krátce jako $a \vee b$ a prvek $\inf\{a, b\}$ značíme krátce jako $a \wedge b$. Pak je možno formulovat následující fakt.

Tvrzení. Buď (A, \leq) svaz. Potom pro libovolné prvky $a, b, c \in A$ platí následující rovnosti:

$$\begin{array}{lll}
 a \vee a = a & a \wedge a = a & (\text{idempotence}) \\
 a \vee b = b \vee a & a \wedge b = b \wedge a & (\text{komutativita}) \\
 (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) & (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) & (\text{asociativita}) \\
 a \vee (a \wedge b) = a & a \wedge (a \vee b) = a & (\text{absorbce})
 \end{array}$$

Důkaz. Idempotence a komutativita jsou zřejmé. Pokud jde o asociativitu, podobný obrat jako v předchozím důkazu ukáže, že prvky na obou stranách první rovnosti jsou rovny $\sup\{a, b, c\}$ a prvky na obou stranách druhé rovnosti jsou rovny $\inf\{a, b, c\}$. Rovněž ověření zákonů absorbce je snadné.

Význam uvedených rovností spočívá také v tom, že tyto rovnosti netoliko vyplývají z definice pojmu svazu, ale bylo by možno ukázat, že těmito rovnostmi je pojem svazu již kompletně charakterizován zhruba v tom smyslu, že by je bylo možno použít jako východisko pro jinou, ekvivalentní definici tohoto pojmu.

Tvrzení. Buď (A, \leq) libovolný svaz. Pak jsou následující dvě podmínky ekvivalentní:

$$\begin{array}{l}
 (*) \quad (\forall a, b, c \in A)(a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)), \\
 (**) \quad (\forall e, f, g \in A)(e \vee (f \wedge g) = (e \vee f) \wedge (e \vee g)).
 \end{array}$$

Důkaz. Nechť platí podmínka $(*)$ a nechť $e, f, g \in A$. Pak

$$\begin{aligned}
 (e \vee f) \wedge (e \vee g) &= ((e \vee f) \wedge e) \vee ((e \vee f) \wedge g) && (\text{podle } (*)) \\
 &= e \vee (g \wedge (e \vee f)) && (\text{absorbce}) \\
 &= e \vee ((g \wedge e) \vee (g \wedge f)) && (\text{podle } (*)) \\
 &= (e \vee (g \wedge e)) \vee (g \wedge f) && (\text{asociativita}) \\
 &= e \vee (f \wedge g), && (\text{absorbce})
 \end{aligned}$$

takže platí také podmínka (**). Analogicky se ukáže, že z (**) plyne (*).

Svaz (A, \leq) splňující kteroukoliv z podmínek (*), (**) uvedených v předchozím tvrzení se nazývá **distributivní**. Zmíněné tvrzení vlastně říká, že svaz (A, \geq) duální k distributivnímu svazu (A, \leq) je rovněž distributivní.

Všechny svazy uvedené v předchozích příkladech této kapitoly jsou distributivní. Uvidíme ale, že existují svazy, které nejsou distributivní.

Věta. Buď (A, \leq) uspořádaná množina, v níž pro každou podmnožinu $B \subseteq A$ existuje $\inf B$. Pak pro libovolnou podmnožinu $C \subseteq A$ existuje také $\sup C$.

Poznámka. Uvedený předpoklad v sobě zahrnuje požadavek existence prvku $\inf \emptyset$, tedy existenci největšího prvku v (A, \leq) .

Důkaz. Buď $C \subseteq A$ libovolná podmnožina. Nechť D je množina všech horních závor množiny C v (A, \leq) . Uvažme prvek $f = \inf D$. Ukážeme, že pak $f = \sup C$. Nejprve si všimněme, že pro každý prvek $c \in C$ platí, že $c \leq d$ pro všechna $d \in D$, což znamená, že c je dolní závora množiny D v (A, \leq) . Ovšem f je největší dolní závora této množiny. Nutně tedy platí $c \leq f$ pro všechna $c \in C$. To znamená, že f je horní závora množiny C v (A, \leq) . Nechť dále $g \in A$ je libovolná horní závora této množiny. Pak $g \in D$, odkud plyne, že $f \leq g$. To potvrzuje, že $f = \sup C$.

Dokázaná věta vlastně říká, že uspořádaná množina (A, \leq) je úplným svazem, jakmile pro libovolnou podmnožinu $B \subseteq A$ existuje $\inf B$.

Poznamenejme také, že platí rovněž věta duální k uvedené větě, tedy věta, v níž jsou prohozená suprema a infima.

Příklad. Buď A množina. Připomeňme, že symbolem $\mathcal{E}(A)$ jsme značili množinu všech ekvivalencí na A . Tyto ekvivalence jakožto relace na A , tedy jakožto podmnožiny v $A \times A$ lze porovnávat množinovou inkluzí \subseteq . Vzniká tak uspořádaná množina $(\mathcal{E}(A), \subseteq)$. Ukážeme, že se jedná o úplný svaz. K tomu podle předchozí věty stačí ukázat, že pro libovolnou podmnožinu $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{E}(A)$ existuje $\inf \mathcal{G}$. Snadno se ovšem vidí, že je-li $\mathcal{G} \neq \emptyset$, pak průnik $\bigcap \mathcal{G}$ všech ekvivalencí z \mathcal{G} je zase ekvivalence na A . Odtud ihned plyne, že v tom případě máme

$$\inf \mathcal{G} = \bigcap \mathcal{G}.$$

Konečně je jasné, že pro $\mathcal{G} = \emptyset$ je $\inf \emptyset = A \times A$. Je tedy opravdu $(\mathcal{E}(A), \subseteq)$ úplný svaz. Poznamenejme, že má-li množina A alespoň tři prvky, jedná se současně o příklad svazu, který není distributivní.

Závěrem dokážeme následující fakt týkající se řetězce (\mathbb{R}, \leq) všech reálných čísel uspořádaných obvyklým způsobem podle velikosti.

Tvrzení. Každá neprázdňá zdola ohraničená podmnožina $M \subseteq \mathbb{R}$ má infimum v (\mathbb{R}, \leq) . Každá neprázdňá shora ohraničená podmnožina $N \subseteq \mathbb{R}$ má supremum v (\mathbb{R}, \leq) .

Důkaz. Poněvadž se jedná o dvě vzájemně duální tvrzení a zobrazení přiřazující každému číslu $r \in \mathbb{R}$ číslo $-r$ je izomorfismus řetězce (\mathbb{R}, \leq) na duální řetězec (\mathbb{R}, \geq) , stačí dokázat například první z uvedených tvrzení. Použijeme k tomu reprezentaci reálných čísel pomocí řezů v (\mathbb{Q}, \leq) z konce minulé kapitoly, tedy fakt, že řetězec (\mathbb{R}, \leq) je izomorfní s tam popsáným řetězcem (\mathcal{R}, \preceq) .

Buď tedy $M \subseteq \mathbb{R}$ libovolná neprázdňá zdola ohraničená podmnožina. Nechť $s \in \mathbb{R}$ je takové číslo, že $s \leq r$ pro všechna $r \in M$. Nechť $\Psi \subseteq \mathcal{R}$ je množina všech řezů odpovídajících číslům z M při zmíněném izomorfismu a nechť (G, H) je řez v \mathcal{R}

odpovídající číslu s . Pak z toho, že $s \leq r$ pro všechna $r \in M$, plyne, že $L \subseteq H$ pro všechny řezy (K, L) v Ψ . Uvažme množinu

$$V = \bigcup_{(K,L) \in \Psi} L$$

vzniklou sjednocením množin L všech řezů (K, L) obsažených v Ψ . Pak ovšem také $V \subseteq H$. Je tedy množina V neprázdná a zdola ohraničená. Přitom tato množina nemá nejmenší prvek, neboť kdyby existoval prvek $t \in V$, který by zde byl nejmenším prvkem, bylo by $t \in L$ pro některý řez (K, L) v Ψ a t by pak byl nejmenší prvek v L , což není možné, neboť takové řezy nejsou v \mathcal{R} obsaženy. Navíc je vidět, že pro každé $v \in V$ a pro každé $q \in \mathbb{Q}$ splňující $v < q$ platí také $q \in V$. Skutečně pak totiž zase $v \in L$ pro některý řez (K, L) v Ψ , odkud plyne $q \in L$. Položíme-li tedy $U = \mathbb{Q} - V$, víme podle předchozí kapitoly, že (U, V) je řez v (\mathbb{Q}, \leq) , a je to buď dedekindovský řez 1. druhu nebo mezera. To znamená, že (U, V) je řez v \mathcal{R} . Nechť $w \in \mathbb{R}$ je číslo odpovídající tomuto řezu ve shora zmiňovaném izomorfismu. Poněvadž pro každý řez (K, L) v Ψ máme $L \subseteq V$, plyne odtud, že $w \leq r$ pro všechna $r \in M$. Nechť konečně $z \in \mathbb{R}$ je jakékoliv takové číslo, že $z \leq r$ pro všechna $r \in M$. Nechť (X, Y) je řez v \mathcal{R} odpovídající číslu z . Pak odtud plyne, že $L \subseteq Y$ pro všechny řezy (K, L) v Ψ . To ale celkem znamená, že $V \subseteq Y$, takže $z \leq w$. Tím je prokázáno, že $w = \inf M$.

Uvedené tvrzení je možno ještě přeformulovat následujícím způsobem. Připojme k množině \mathbb{R} dva nové prvky $-\infty$ a ∞ a rozšířme uspořádání \leq z \mathbb{R} na $\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ tak, aby pro každé $r \in \mathbb{R}$ platilo $-\infty < r < \infty$. Tímto způsobem vzniká řetězec $(\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}, \leq)$. Není těžké si rozmyslet, že pak předchozí tvrzení lze převést do následující podoby.

Důsledek. Řetězec $(\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}, \leq)$ je úplný svaz.