

# IB000 Úvod do informatiky — příklady na procvičení

## Sada 8 — Zadání

### Téma

Vhodně definované vlastnosti relací, uzávěry relací. Výroky. Výroková logika, valuace, normální tvar výrokových formulí, negace výrokových formulí, pravdivost a splnitelnost výrokových formulí. Predikátová logika, negace formulí predikátové logiky.

### Příklad 1.

- Určete reflexivní uzávěr relace  $\{(x, y) \mid xy = 0\} \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ .
- Určete symetrický uzávěr relace  $\{(x, y) \mid xy = 0\} \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ .
- Určete tranzitivní uzávěr relace  $\{(x, y) \mid xy = 0\} \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ .
- Určete reflexivní, symetrický a tranzitivní uzávěr relace  $\{(x, y) \mid xy = 0\} \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ .
- Určete reflexivní uzávěr relace  $\{(2i + 1, 2i + 3) \mid i \in \mathbb{N}_0\}$ .
- Určete symetrický uzávěr relace  $\{(2i + 1, 2i + 3) \mid i \in \mathbb{N}_0\}$ .
- Určete tranzitivní uzávěr relace  $\{(2i + 1, 2i + 3) \mid i \in \mathbb{N}_0\}$ .
- Určete reflexivní, symetrický a tranzitivní uzávěr relace  $\{(2i + 1, 2i + 3) \mid i \in \mathbb{N}_0\}$ .
- Nechť  $R = \{(x, y) \mid x \leq 2y \wedge y \leq 2x\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ , kde  $\mathbb{R}$  značí množinu všech reálných čísel. Určete  $R \circ R$ .

### Příklad 2.

Nechť  $A, B, C, D$  jsou atomické propozice. Nechť  $\nu$  je valuace, která splňuje  $\nu(A) = \nu(B) = \text{true}$  a  $\nu(C) = \nu(D) = \text{false}$ . Podle definice  $S_\nu$  určete  $S_\nu(\varphi)$ , je-li

- $\varphi \equiv (C \vee D) \Rightarrow \neg(D \wedge (A \Rightarrow B))$
- $\varphi \equiv (\neg A \Rightarrow (B \wedge \neg B)) \Rightarrow \neg\neg A$
- $\varphi \equiv (\neg C \Rightarrow \neg(\neg A \iff \neg B)) \wedge ((D \Rightarrow B) \vee (\neg B \Rightarrow C))$

### Příklad 3.

Nechť  $A, B, C, D$  jsou atomické propozice. Znegujte následující formule. (Protože znegováním se myslí i převedení do normálního tvaru, máte za úkol pro formuli  $\varphi$  vypočítat  $\mathcal{F}(\neg\varphi)$  pomocí příslušných funkcí  $\mathcal{F}$  a  $\mathcal{G}$  definovaných na přednášce.)

- $\varphi \equiv (C \vee D) \Rightarrow \neg(D \wedge (A \Rightarrow B))$
- $\varphi \equiv (\neg C \Rightarrow \neg(\neg A \iff \neg B)) \wedge ((D \Rightarrow B) \vee (\neg B \Rightarrow C))$
- $\forall x \in \mathbb{N}_0. x > 0 \Rightarrow \exists y, z \in \mathbb{N}_0. y \mid x \wedge z \mid x \Rightarrow \exists w \in \mathbb{N}_0. w > x \wedge z \mid w \wedge y \mid w$

### Příklad 4.

Formalizujte (tj. запиšte jako formule výrokové, resp. predikátové logiky) a negujte následující tvrzení. Pokud se tvrzení týká čísel, vyjádřete vlastnosti pomocí aritmetických operací. Formule zapisujte v normálním tvaru.

- Když budu hodný, Ježíšek mi nadělí hezké dárky.
- Ne každý čaj mi chutná.
- Rostlina, která u mne přežije rok, je plevel.
- Když je přes den zataženo a v noci jasno, bude ráno mrznout nebo přijde obleva.

e) Nechť  $n$  je sudé přirozené číslo. Potom pro každé přirozené číslo  $m$  platí, že když  $m$  je sudé, potom  $m + n$  je sudé, a když  $m$  je liché, potom  $m + n$  je liché.

f) Přirozené číslo  $p$  je *prvočíslo*, jestliže není dělitelné jiným přirozeným číslem kromě čísla 1 a sebe samého.

g) Když je přirozené číslo  $a$  větší než 8, nebo když je dělitelné přirozeným číslem  $b$ , potom  $a$  je větší než  $b$  a  $a \cdot b$  je větší než  $b$ .

### Příklad 5.

V následujících příkladech máte za úkol znegovat definiční podmínky různých pojmů. Definice pojmů zapište jako formule výrokové, resp. predikátové logiky a znegujte je.

a) Nechť  $n$  je přirozené číslo. Co znamená, že  $n$  není liché?

b) Nechť  $R$  je relace. Co znamená, že  $R$  není antisymetrická?

c) Nechť  $f \subseteq A \times B$  je parciální funkce. Co znamená, že  $f$  není minimální prvek uspořádané množiny  $(\mathcal{F}, \subseteq)$ , kde  $\mathcal{F}$  je množina všech parciálních funkcí z  $A$  do  $B$ ?

d) Nechť  $f \subseteq A \times B$  je parciální funkce. Co znamená, že  $f$  není nejmenší prvek uspořádané množiny  $(\mathcal{F}, \subseteq)$ , kde  $\mathcal{F}$  je množina všech parciálních funkcí z  $A$  do  $B$ ?

e) Řekneme, že přirozené číslo  $m$  je *šťastné a veselé*, jestliže pro žádné přirozené číslo  $n$  větší než  $m$  neplatí, že  $m$  dělí  $n$  a  $m + n$  je liché. Co znamená, že číslo  $m$  není šťastné a veselé?

f) Řekneme, že přirozené číslo  $k$  je *odvážné*, jestliže existují přirozená čísla  $a, b$  taková, že  $a$  i  $b$  je různé od čísla 1 a zároveň  $k^2 = a^2b^2$ . Co znamená, že číslo  $k$  není odvážné?

g) Nechť  $R \subseteq M \times M$  je binární relace na množině  $M$ . Řekneme, že relace  $R$  je *přitažlivá*, jestliže pro každé  $x, y \in M$  platí: pokud  $(x, y) \in R$ , potom existuje  $z \in M$  takové, že  $(x, z) \in R$  a  $(y, z) \in R$ . Co znamená, že relace  $R \subseteq M \times M$  není přitažlivá?

h) Nechť  $f : M \rightarrow M$  je funkce. Řekneme, že  $f$  má *trojúhelník*, jestliže pro každé  $x \in M$  platí  $f(x) \neq x$  a existují navzájem různá  $x_1, x_2, x_3 \in M$  taková, že  $f(x_1) = x_2$ ,  $f(x_2) = x_3$  a  $f(x_3) = x_1$ . Co znamená, že funkce  $f : M \rightarrow M$  nemá trojúhelník?

### Příklad 6.

Mějme výrokovou formuli  $\varphi \equiv (A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow A)$ .

a) Najděte všechny valuace  $\nu$ , pro něž  $S_\nu(\varphi) = \text{true}$ . Kolik jich je?

b) Najděte všechny valuace  $\nu$ , pro něž  $S_\nu(\varphi) = \text{false}$ . Kolik jich je?

### Příklad 7.

Rozhodněte, zda následující formule výrokové logiky jsou splnitelné. Pokud ano, nalezněte valuaci, která to dosvědčuje.

a)  $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \wedge A \wedge \neg C$

b)  $(D \iff (\neg E \vee D)) \wedge \neg((D \wedge E) \Rightarrow A)$

c)  $(\neg\neg B \wedge A) \iff ((\neg A \Rightarrow B) \wedge (\neg B \Rightarrow A))$

### Příklad 8.

Označme  $\mathcal{V}$  množinu všech valuací. Uvažujme uspořádanou množinu  $(\mathcal{U}, \subseteq)$ , kde  $\mathcal{U} = \{f \subseteq At \times \{\text{true}, \text{false}\} \mid f \text{ je parciální funkce}\}$  (jedná se opět o množinu parciálních funkcí uspořádaných množinovou inkluzí).

a) Dokažte, že platí  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$ .

**b)** Charakterizujte valuační v uspořádané množině  $(\mathcal{U}, \subseteq)$  a dokažte, že je podaná charakterizace správná.

**c)** V uspořádané množině  $(\mathcal{U}, \subseteq)$  určete všechny maximální dolní závory množiny  $\{\nu \in \mathcal{V} \mid S_\nu(B \wedge (C \Rightarrow A)) = \text{true}\}$ . Jsou to valuační?

**d)** Co musí splňovat výroková formule  $\psi$ , aby v uspořádané množině  $(\mathcal{U}, \subseteq)$  měla množina  $\{f \in \mathcal{U} \mid \exists \nu \in \mathcal{V}. f \subseteq \nu \wedge S_\nu(\psi) = \text{true}\}$  infimum? Bude infimum valuační?

### Příklad 9.

Nechť pro  $i \in \mathbb{N}$  je  $A_i \in At$  atomická propozice. Pro všechna  $n \in \mathbb{N}_0$  definujme formule  $\varphi_n$  takto:

- $\varphi_0 \equiv \text{true}$
- $\varphi_{n+1} \equiv \varphi_n \wedge A_n$

(Tedy například  $\varphi_3 \equiv ((\text{true} \wedge A_1) \wedge A_2) \wedge A_3$ , přičemž na uzavorkování zřejmě nezáleží.)

**a)** Pro každé  $n \in \mathbb{N}$  nalezněte valuační  $\nu_n$  takovou, že

$$S_{\nu_n}(\varphi_i) = \begin{cases} \text{true} & \text{pro } i \leq n \\ \text{false} & \text{jinak} \end{cases}$$

**b)** Nalezněte valuační  $\mu$  takovou, aby pro všechna  $n \in \mathbb{N}_0$  platilo  $S_\mu(\varphi_n) = \text{false}$ .

**c)** Nalezněte valuační  $\eta$  takovou, aby pro všechna  $n \in \mathbb{N}_0$  platilo  $S_\eta(\varphi_n) = \text{true}$ .