

Základy matematiky — podzim 2004 — 1. termín — 6.1.2005

1. (8krát ± 1 bod (správně 1 bod, chybně -1 , bez odpovědi 0)) Odpovězte (škrtnutím nehodícího se **ano** nebo **ne** na patřičném řádku), zda jsou pravdivá následující tvrzení (čtěte **velmi** pozorně!):
 - (a) **ano** — **ne** Každá podmnožina množiny \mathbb{R} je buď konečná nebo spočetná.
 - (b) **ano** — **ne** Jádro zobrazení $f : A \rightarrow B$ je symetrická relace na množině A .
 - (c) **ano** — **ne** Pro libovolnou binární relaci R na neprázdné množině A a pro každé dva prvky $a, b \in A$ platí právě jeden ze vztahů $aRb, aR^{-1}b$.
 - (d) **ano** — **ne** Pro libovolné uspořádané množiny $(A, \leq), (B, \leq), (C, \leq)$ a zobrazení $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ platí: $g \circ f$ je izotonní $\implies f$ je izotonní.
 - (e) **ano** — **ne** Je-li R uspořádání množiny A , pak $R \cap R^{-1}$ je též uspořádání množiny A .
 - (f) **ano** — **ne** Je-li uspořádaná množina (A, \leq) úplný svaz, pak (A, \geq) je také úplný svaz.
 - (g) **ano** — **ne** Prázdná množina je podgrupou každé grupy.
 - (h) **ano** — **ne** Okruh $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ zbytkových tříd modulo 6 je obor integrity.
2. (7 bodů) Definujte pojem relace ekvivalence na množině A a rozklad množiny A podle relace ekvivalence. Zkonstruuje, pomocí těchto pojmů, množinu racionálních čísel \mathbb{Q} z množiny celých čísel \mathbb{Z} . (*Pouze množinu \mathbb{Q} , definice operací se nepožadují.*)
3. (5krát 2 body) Udejte příklad
 - (a) množin X a Y takových, že $|\mathcal{P}(X) \cap \mathcal{P}(Y)| = 2$;
 - (b) izotonního zobrazení $f : (\mathbb{N}, \leq) \rightarrow (\mathbb{N}, \leq)$, které není injektivní (zde \leq je uspořádání podle velikosti);
 - (c) uspořádané množiny, která má maximální prvek, nemá největší prvek a nemá minimální prvek;
 - (d) binární relace na tříprvkové množině $A = \{1, 2, 3\}$, která je reflexivní a není tranzitivní;
 - (e) binární operace na množině \mathbb{Z} která je asociativní, ale nemá neutrální prvek.
4. (10 bodů) Buď \mathbb{R}^+ množina všech kladných reálných čísel. Na množině $M = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ definujeme binární operaci \circ vztahem $(a, b, c) \circ (a', b', c') = (aa', ab' + bc', cc')$, pro $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}^+$. Rozhodněte, zda je operace \circ asociativní. Rozhodněte, zda je operace \circ komutativní. Je (M, \circ) grupa? Odpovědi zdůvodněte.
5. (10 bodů) Nechť konečná množina A má n prvků, kde $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$. Určete kolik je rozkladů množiny A , které mají alespoň $n - 2$ tříd rozkladu.
6. (10 bodů) Na množině \mathbb{R} je definována binární relace ρ vztahem $x\rho y \iff (x + y = xy \vee x = y)$ pro $x, y \in \mathbb{R}$. Dokažte, že ρ je relace ekvivalence na množině \mathbb{R} . Popište rozklad $\mathbb{R} \setminus \rho$. Určete kolik má tento rozklad tříd a kolik prvků mají jednotlivé třídy.
7. (10 bodů) Na množině \mathbb{Q} definujeme binární relaci \preceq takto: $x \preceq y \iff (\exists k \in \mathbb{N})(y = k \cdot x)$, pro $x, y \in \mathbb{Q}$. Dokažte, že \preceq je uspořádání. Nalezněte všechny minimální a maximální prvky uspořádané množiny (\mathbb{Q}, \preceq) . Je (\mathbb{Q}, \preceq) úplný svaz? Je identické zobrazení $id_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ izotonní zobrazení z (\mathbb{Q}, \preceq) do (\mathbb{Q}, \leq) ? Je identické zobrazení $id_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ izotonní zobrazení z (\mathbb{Q}, \leq) do (\mathbb{Q}, \preceq) ? Odpovědi zdůvodněte. (Pozn: \leq je uspořádání racionálních čísel podle velikosti.)
8. (10 bodů) Buď dána neprázdna množina A a uspořádání \leq na množině A . Na množině A^A všech zobrazení z množiny A do sebe definujeme uspořádání \preceq takto: $f \preceq g \iff (\forall a \in A)(f(a) \leq g(a))$, pro $f, g \in A^A$. Dokažte, že pro libovolná zobrazení $f, g, h \in A^A$ platí $(f \preceq g \implies f \circ h \preceq g \circ h)$. Nalezněte všechna zobrazení $z \in A^A$ pro něž platí $(\forall f \in A^A)(z \circ f = z)$. Dokažte, že pokud (A, \leq) je úplný svaz, pak (A^A, \preceq) je také úplný svaz.