

**FORMÁLNÍ JAZYKY A AUTOMATY I**  
**ŘEŠENÍ cvičení 1.**

1. Všechny jazyky jsou podmnožinou jazyka  $L_1$ . Dále platí:

$L_1 = L_6$ : inkluze  $L_6 \subseteq L_1$  je zřejmá. Ukážeme opačnou inkluzi, t.j.  $L_1 \subseteq L_6$ .

Zřejmě prázdné slovo je prvkem obou jazyků. Každé neprázdné slovo  $w \in L_1$  může být nazíráno jako posloupnost, ve které se střídají skupiny symbolů  $a$  se skupinami symbolů  $b$ . Přesněji, slovo  $w$  můžeme zapsat jako  $w = a^{i_1}b^{j_1} \dots a^{i_n}b^{j_n}$ , kde  $i_1 \geq 0$ ;  $j_1, i_2, \dots, i_n > 0$ ;  $j_n \geq 0$ ;  $n \geq 1$  a  $i_1 + j_n > 0$ .

Předpokládejme, že  $j_n > 0$ , tzn. slovo  $w$  končí skupinou symbolů  $b$  (případ  $j_n = 0$  se řeší analogicky). Indukcí vzhledem k  $n$  prokážeme, že  $w \in \{a^*b\}^*$ .

1°.  $w = a^{i_1}b^{j_1} = a^{i_1}b \underbrace{a^0b^0b \dots a^0b}_{j_1-1}$ . Proto  $w \in \{a^*b\}^{j_1}$ .

2°. Podle indukčního předpokladu tvrzení platí pro  $n$ . Dokážeme jej pro  $n+1$ . Slovo  $w$  obsahující  $n+1$  skupin symbolů  $b$  můžeme napsat jako zřetězení slov  $v_1$  a  $v_2$ , kde  $v_1 = a^{i_1}b^{j_1} \dots a^{i_n}b^{j_n}$  a  $v_2 = a^{i_{n+1}}b^{j_{n+1}}$ . Podle IP obě slova patří do  $\{a^*b\}^*$ , a proto slovo  $w$  patří do  $\{a^*b\}^*$ .

$L_2 \subset L_1$ : slovo  $aa \notin L_2$  ale  $aa \in L_1$ .

$L_3 \subset L_1$ : slovo  $baab \notin L_3$  ale  $baab \in L_1$ .

$L_4 \subset L_3$ : Jestli  $w \in L_4$ , pak z definice operace zřetězení jazyků plyne existence slov  $v_1, v_2, v_3$  takových, že  $v_1 = a$ ,  $v_2 = a^i$  a  $v_3 = b^j$  ( $i, j \geq 0$ ). Slova  $v_1v_2$  a  $v_3$  dokazují příslušnost slova  $w$  do  $L_3$ . Inkluze je ostrá, protože  $\varepsilon \notin L_4$ .

$L_4 \subset L_5$ : Podobně jako v předcházejícím případě;  $v_1 \in \{a\}$  a  $v_2v_3 \in \{a, b\}^*$ . Inkluze je ostrá, protože slovo  $ba \notin L_4$  ale  $ba \in L_5$ .

$L_5 \subset L_1$ : slovo  $bb \notin L_5$  ale  $bb \in L_1$ .

Všechny zbývající dvojice jsou nesrovnatelné.

2. a)  $X = \{00\}^* \cdot \{1000, 0100, 0010, 0001, 00\} \cdot \{00\}^*$ .

b) Označme  $L = \{0, 1\}^*$ . Pak

$$Y = (L\{000\}L \cup L\{111\}L)^c \cap [\{1\}L\{1\} \cup \{0\}L\{0\} \cup \{0\} \cup \{1\}].$$

3. Buď  $w \in (L_1 \cup L_2) \cdot L_3$ .  $\iff$

$$w = u \cdot v, \text{ kde } v \in L_3 \text{ a } u \in L_1 \text{ anebo } u \in L_2. \iff$$

$$u \cdot v \in L_1 \cdot L_3 \text{ anebo } u \cdot v \in L_2 \cdot L_3 \iff$$

$$w \in (L_1 \cdot L_3) \cup (L_2 \cdot L_3).$$

Pro  $L_1 = \{a\}$ ,  $L_2 = \{aa\}$  a  $L_3 = \{a, aa\}$  rovnost b) neplatí.

4. Buď  $w \in (L_1 \cdot L_2)^+ \cdot L_1$   $\iff$

$$w = uv, \text{ kde } v \in L_1 \text{ a } u \in (L_1 \cdot L_2)^+ \iff$$

$$w = uv, \text{ kde } v \in L_1 \text{ a } u = x_1y_1 \dots x_ny_n, \text{ kde } x_i \in L_1 \text{ a } y_i \in L_2 \text{ pro } i = 1, \dots, n. \iff$$

$$w = UV, \text{ kde } U = x_1 \in L_1 \text{ a } V = y_1x_2 \dots y_nv \in (L_2 \cdot L_1)^+ \iff$$

$$w \in L_1 \cdot (L_2 \cdot L_1)^+.$$

Rovnost  $(L_1 \cdot L_2)^0 \cdot L_1 = L_1 = L_1 \cdot (L_2 \cdot L_1)^0$  je zřejmá.

Pro  $L_1 = \{a\}$ ,  $L_2 = \{b\}$  rovnost b) neplatí; slovo  $ba \in (L_1 \cup L_2)^*$  ale  $ba \notin L_1^*(L_1^* \cdot L_2)^*$

5. a)  $h^{-1}(aabaabaa) = \{ababc, abccbc, ccbabc, ccbccbc\}$ .

b)  $h(L) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#_a(w) = 3\#_b(w); w \text{ neobsahuje podřetězec } bb\}$ .

c)  $h^{-1}(L) = \{w \in \{a, c\}^* \mid \#_c(w) \text{ je sudý}\}$ .