

Matematika II – 3. přednáška

Derivace

Michal Bulant

Masarykova univerzita
Fakulta informatiky

12. 10. 2011

Obsah přednášky

- 1 Přírůstky do ZOO
- 2 Derivace
 - Vlastnosti a pravidla derivací
 - Derivace vyšších řádů
- 3 Derivace elementárních funkcí

Doporučené zdroje

- Martin Panák, Jan Slovák – **Drsná matematika**, e-text.
- Roman Hilscher – MB102, e-text.

Doporučené zdroje

- Martin Panák, Jan Slovák – **Drsná matematika**, e-text.
- Roman Hilscher – MB102, e-text.
- Zuzana Došlá, Jaromír Kuben – Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, MU Brno, 2003, 215 s., ISBN 80-210-3121-2 (rovněž na <http://www.math.muni.cz/~dosla/skript.pdf>).

Plán přednášky

- 1 Přírůstky do ZOO
- 2 Derivace
 - Vlastnosti a pravidla derivací
 - Derivace vyšších řádů
- 3 Derivace elementárních funkcí

Limity příslušníků ZOO

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Limity příslušníků ZOO

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Řešení

Pro $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ platí $\sin x < x < \operatorname{tg} x$ (viz obr.).

A protože je pro tato x hodnota $\sin x > 0$, je

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \text{tj.} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Jelikož je funkce $\cos x$ *spojitá* (v nule), obě strany nerovnosti se pro $x \rightarrow 0^+$ blíží k 1, a tedy podle věty o třech limitách je

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}.$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}.$$

Řešení

Dosazením za $x = 0$ dostaneme, že tato limita je typu $\left| \frac{0}{0} \right|$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos^2 x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2 x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\sin x}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + \cos x}}_{\rightarrow \frac{1}{2}} \right) = 1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} = 0. \end{aligned}$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

Řešení

Dosazením za $x = 0$ dostaneme, že tato limita je typu $\left| \frac{0}{0} \right|$.

Pro $x \in (0, \frac{1}{2})$ zvolme n tak, aby $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$. Z definice e navíc

$(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} < e < (1 + \frac{1}{n-1})^n$, odkud dostaneme nerovnost

$1 + \frac{x}{x+1} < e^x < 1 + \frac{x}{1-2x}$, neboli $\frac{1}{x+1} < \frac{e^x-1}{x} < \frac{1}{1-2x}$.

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

Řešení

Dosažením za $x = 0$ dostaneme, že tato limita je typu $\left| \frac{0}{0} \right|$.

Pro $x \in (0, \frac{1}{2})$ zvolme n tak, aby $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$. Z definice e navíc $(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} < e < (1 + \frac{1}{n-1})^n$, odkud dostaneme nerovnost

$$1 + \frac{x}{x+1} < e^x < 1 + \frac{x}{1-2x}, \text{ neboli } \frac{1}{x+1} < \frac{e^x-1}{x} < \frac{1}{1-2x}.$$

Z věty o třech limitách pak plyne $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x-1}{x} = 1$. Podobně dostaneme opačné nerovnosti pro $x \in (-\frac{1}{2}, 0)$, a tedy $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x-1}{x} = 1$.

Celkově tedy dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

Řešení

Z předchozího příkladu víme, že pro malé x je $e^x - 1 \approx x$, tedy je $e^x \approx 1 + x$. Logaritmováním (*limita složené funkce*) obou stran dostaneme, že $x \approx \ln(1+x)$. Tedy platí, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}.$$

Příklad

Určete

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}.$$

Řešení

Dosazením za $x = 0$ dostaneme, že tato limita je typu $\left| \frac{0}{0} \right|$.
Pomocí rovnosti $a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}$ dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a}}_{\rightarrow 1} \cdot \ln a = \ln a,$$

a tedy je

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

Plán přednášky

- 1 Přírůstky do ZOO
- 2 Derivace
 - Vlastnosti a pravidla derivací
 - Derivace vyšších řádů
- 3 Derivace elementárních funkcí

Derivace

Definice

Nechť f je reálná funkce s definičním oborem $A \subset \mathbb{R}$ a $x_0 \in A$.
Jestliže existuje limita

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$$

pak říkáme, že f má v bodě x_0 **derivaci** a . Píšeme často $a = f'(x_0)$
nebo $a = \frac{df}{dx}(x_0)$ případně $a = \frac{d}{dx}f(x_0)$.

Derivace funkce je **vlastní**, resp. **nevlastní**, když je takovou
příslušná limita.

Jednostranné derivace (tj. derivaci zprava a zleva) definujeme
zcela stejně pomocí limity zprava a zleva.

Analyzujme diferenční podíl (viz obr.)

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \operatorname{tg} \varphi,$$

což je směrnice sečny procházející body $M = [x_0, f(x_0)]$ a $N = [x, f(x)]$

Analyzujme diferenční podíl (viz obr.)

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \operatorname{tg} \varphi,$$

což je směrnice sečny procházející body $M = [x_0, f(x_0)]$ a

$N = [x, f(x)]$

Pokud se x blíží k x_0 (tj. bod N se blíží k bodu M), sečna MN se stává *tečnou v bodě M* , a tedy je

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

směrnicí tečny v bodě $M = [x_0, f(x_0)]$.

Příklad

Určete rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = 1/x$ v bodě $x_0 = 1$.

Řešení

Směrnici tečny získáme vypočtením příslušné limity

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1-x}{x}}{\frac{x-1}{1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x} = -1.\end{aligned}$$

Příklad

Určete rovnici tečny ke grafu funkce $f(x) = 1/x$ v bodě $x_0 = 1$.

Řešení

Směrnici tečny získáme vypočtením příslušné limity

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1-x}{x}}{\frac{x-1}{1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x} = -1. \end{aligned}$$

Rovnici tečny pak dostaneme ze vztahu

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0),$$

tj.

$$y = -x + 2.$$

Poznámka

- Derivace $f'(x_0)$ (jako limita) je vždy limitou typu $\frac{0}{0}$.

Poznámka

- Derivace $f'(x_0)$ (jako limita) je vždy limitou typu $\frac{0}{0}$.
- Každá funkce má v libovolném bodě x_0 nejvýše jednu derivaci.

Poznámka

- Derivace $f'(x_0)$ (jako limita) je vždy limitou typu $\frac{0}{0}$.
- Každá funkce má v libovolném bodě x_0 nejvýše jednu derivaci.
- Hodnota $f'(x_0)$ popisuje rychlost změny funkce $f(x)$ v bodě x_0 (růst nebo pokles a současně velikost tohoto růstu nebo poklesu).

Poznámka

- Derivace $f'(x_0)$ (jako limita) je vždy limitou typu $\frac{0}{0}$.
- Každá funkce má v libovolném bodě x_0 nejvýše jednu derivaci.
- Hodnota $f'(x_0)$ popisuje rychlost změny funkce $f(x)$ v bodě x_0 (růst nebo pokles a současně velikost tohoto růstu nebo poklesu).
- Položíme-li $h := x - x_0$, dostaneme

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Poznámka

- Derivace $f'(x_0)$ (jako limita) je vždy limitou typu $\frac{0}{0}$.
- Každá funkce má v libovolném bodě x_0 nejvýše jednu derivaci.
- Hodnota $f'(x_0)$ popisuje rychlost změny funkce $f(x)$ v bodě x_0 (růst nebo pokles a současně velikost tohoto růstu nebo poklesu).
- Položíme-li $h := x - x_0$, dostaneme

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

- Tečna $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ dobře aproximuje funkci f v dostatečně malém okolí bodu x_0 .

Poznámka

- Derivace $f'(x_0)$ (jako limita) je vždy limitou typu $\frac{0}{0}$.
- Každá funkce má v libovolném bodě x_0 nejvýše jednu derivaci.
- Hodnota $f'(x_0)$ popisuje rychlost změny funkce $f(x)$ v bodě x_0 (růst nebo pokles a současně velikost tohoto růstu nebo poklesu).
- Položíme-li $h := x - x_0$, dostaneme

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

- Tečna $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ dobře aproximuje funkci f v dostatečně malém okolí bodu x_0 .
- Aby mohla mít funkce $f(x)$ derivaci v bodě x_0 , musí být definována na nějakém okolí bodu x_0 (včetně bodu x_0)!

Poznámka

- Derivace $f'(x_0)$ (jako limita) je vždy limitou typu $\frac{0}{0}$.
- Každá funkce má v libovolném bodě x_0 nejvýše jednu derivaci.
- Hodnota $f'(x_0)$ popisuje rychlost změny funkce $f(x)$ v bodě x_0 (růst nebo pokles a současně velikost tohoto růstu nebo poklesu).
- Položíme-li $h := x - x_0$, dostaneme

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

- Tečna $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ dobře aproximuje funkci f v dostatečně malém okolí bodu x_0 .
- Aby mohla mít funkce $f(x)$ derivaci v bodě x_0 , musí být definována na nějakém okolí bodu x_0 (včetně bodu x_0)!
- $f'(x_0)$ někdy píšeme jako $\frac{df}{dx}(x_0)$, nebo jako $f'(x)|_{x=x_0}$.

Příklad

Určete derivaci funkce $f(x) = \sqrt{x}$ v bodech $x_0 \in \mathcal{D}(f)$.

Příklad

Určete derivaci funkce $f(x) = \sqrt{x}$ v bodech $x_0 \in \mathcal{D}(f)$.

Řešení

Zřejmě je $\mathcal{D}(f) = [0, \infty)$. Pro $x_0 > 0$ je

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}. \end{aligned}$$

Pro $x_0 = 0$ derivace neexistuje (je to krajní bod definičního oboru, a tudíž v něm neexistuje limita – existuje zde pouze limita zprava).

Vypočtěme tedy derivaci zprava:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = \infty.$$

Funkce $f(x) = \sqrt{x}$ tedy má v počátku nevlastní pravostrannou derivaci $f'_+(0) = \infty$, neboli tečna v bodě $x_0 = 0$ je svislá přímka.

Již na první přednášce jsme pomocí binomické věty odvodili vztah pro derivaci monomů

$$(x^n)' = nx^{n-1},$$

podobně můžeme odvodit vztahy pro derivaci dalších elementárních funkcí.

Již na první přednášce jsme pomocí binomické věty odvodili vztah pro derivaci monomů

$$(x^n)' = nx^{n-1},$$

podobně můžeme odvodit vztahy pro derivaci dalších elementárních funkcí.

Pokud se na bod x_0 budeme dívat jako na „proměnnou“, potom můžeme derivaci chápat jako *zobrazení*, které každému bodu x přiřadí hodnotu $f'(x)$ (pokud je tato hodnota vlastní). Tedy $f'(x)$ je opět funkce proměnné x , přičemž pro její definiční obor platí, že

$$\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f).$$

Již na první přednášce jsme pomocí binomické věty odvodili vztah pro derivaci monomů

$$(x^n)' = nx^{n-1},$$

podobně můžeme odvodit vztahy pro derivaci dalších elementárních funkcí.

Pokud se na bod x_0 budeme dívat jako na „proměnnou“, potom můžeme derivaci chápat jako *zobrazení*, které každému bodu x přiřadí hodnotu $f'(x)$ (pokud je tato hodnota vlastní). Tedy $f'(x)$ je opět funkce proměnné x , přičemž pro její definiční obor platí, že

$$\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f).$$

Tedy prozatím odvozené vztahy pro derivace můžeme shrnout jako

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Již na první přednášce jsme pomocí binomické věty odvodili vztah pro derivaci monomů

$$(x^n)' = nx^{n-1},$$

podobně můžeme odvodit vztahy pro derivaci dalších elementárních funkcí.

Pokud se na bod x_0 budeme dívat jako na „proměnnou“, potom můžeme derivaci chápat jako *zobrazení*, které každému bodu x přiřadí hodnotu $f'(x)$ (pokud je tato hodnota vlastní). Tedy $f'(x)$ je opět funkce proměnné x , přičemž pro její definiční obor platí, že

$$\mathcal{D}(f') \subseteq \mathcal{D}(f).$$

Tedy prozatím odvozené vztahy pro derivace můžeme shrnout jako

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Má-li funkce $f(x)$ derivaci v každém bodě množiny (např. intervalu) I , pak říkáme, že $f(x)$ je *diferencovatelná na I* . Např. x^n je diferencovatelná na \mathbb{R} , nebo $\frac{1}{x}$ je diferencovatelná na $(0, \infty)$ a na $(-\infty, 0)$.

Derivace v praxi

rychlost

Je-li $s(t)$ poloha hmotného bodu na přímce v čase t , potom je výraz

$$\frac{\text{celková dráha}}{\text{celkový čas}} = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$$

roven průměrné rychlosti za časový úsek $[t_0, t]$. Zřejmě je pak

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} = s'(t_0)$$

rychlost v okamžiku t_0 , a tedy je

$$v(t) = s'(t), \quad \text{rychlost je derivace dráhy.}$$

Zde je nutné vzít v úvahu, že rychlost $v(t)$ má znaménko, tj. $v(t) > 0$ ve směru pohybu, kdy se $s(t)$ zvětšuje a $v(t) < 0$, když se $s(t)$ zmenšuje.

zrychlení

Protože je zrychlení $a(t)$ změna rychlosti, podobně platí, že

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{v(t) - v(t_0)}{t - t_0} = v'(t_0)$$

je zrychlení v okamžiku t_0 , a tedy je

$$a(t) = v'(t), \quad \text{zrychlení je derivace rychlosti.}$$

výkon

Protože platí, že

$$\text{výkon} = \frac{\text{změna práce}}{\text{změna času}},$$

je

$$P(t) = W'(t), \quad \text{výkon je derivace práce.}$$

výkon

Protože platí, že

$$\text{výkon} = \frac{\text{změna práce}}{\text{změna času}},$$

je

$$P(t) = W'(t), \quad \text{výkon je derivace práce.}$$

proud

Protože platí, že

$$\text{elektrický proud} = \frac{\text{změna napětí}}{\text{změna času}},$$

je

$$I(t) = U'(t), \quad \text{proud je derivace napětí.}$$

Vlastnosti a pravidla derivací

V tomto odstavci odvodíme základní vlastnosti funkce a její derivace a pravidla pro počítání derivací.

Věta

Má-li $f(x)$ v bodě x_0 vlastní derivaci $f'(x_0)$, potom je funkce $f(x)$ spojitá v bodě x_0 .

Vlastnosti a pravidla derivací

V tomto odstavci odvodíme základní vlastnosti funkce a její derivace a pravidla pro počítání derivací.

Věta

Má-li $f(x)$ v bodě x_0 vlastní derivaci $f'(x_0)$, potom je funkce $f(x)$ spojitá v bodě x_0 .

Důkaz.

Chceme ukázat, že $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Protože existuje vlastní $f'(x_0)$ je

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0) + f(x_0)] = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\rightarrow f'(x_0)} \cdot \underbrace{(x - x_0)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{f(x_0)}_{\rightarrow f(x_0)} \right) = f(x_0). \end{aligned}$$

Pravidla pro derivace

Věta

- 1 *Pravidlo konstantního násobku:*

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x).$$

Pravidla pro derivace

Věta

- ① *Pravidlo konstantního násobku:*

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x).$$

- ② *Pravidlo součtu a rozdílu:*

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

Pravidla pro derivace

Věta

- ① *Pravidlo konstantního násobku:*

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x).$$

- ② *Pravidlo součtu a rozdílu:*

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

- ③ *Pravidlo součinu:*

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

Pravidla pro derivace

Věta

- ① *Pravidlo konstantního násobku:*

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x).$$

- ② *Pravidlo součtu a rozdílu:*

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

- ③ *Pravidlo součinu:*

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

- ④ *Pravidlo podílu:*

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

Intuitivně můžeme pravidlům velice snadno rozumět, když si derivaci funkce $y = f(x)$ představíme jako podíl přírůstků závislé proměnné y a nezávislé proměnné x :

$$f' = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Pak při $y = h(x) = f(x) + g(x)$ je přírůstek y dán součtem přírůstků f a g a přírůstek závislé proměnné zůstává stejný. Je tedy derivace součtu součtem derivací.

Intuitivně můžeme pravidlům velice snadno rozumět, když si derivaci funkce $y = f(x)$ představíme jako podíl přírůstků závislé proměnné y a nezávislé proměnné x :

$$f' = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Pak při $y = h(x) = f(x) + g(x)$ je přírůstek y dán součtem přírůstků f a g a přírůstek závislé proměnné zůstává stejný. Je tedy derivace součtu součtem derivací.

U součinu musíme být malinko pozornější. Pro $y = h(x) = f(x)g(x)$ je přírůstek

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x) \\ &= f(x + \Delta x)(g(x + \Delta x) - g(x)) + (f(x + \Delta x) - f(x))g(x)\end{aligned}$$

Nyní ale když budeme zmenšovat přírůstek Δx , jde vlastně o výpočet limity součtu součinů a o tom už víme, že jej lze počítat jako součet součinů limit. Proto z naší formulky lze očekávat pro derivaci součinu fg výraz $fg' + f'g$.

Důkaz.

Pravidla (i) a (ii) jsou triviální z definice derivace (jako limity).
Ukážeme pravidlo součinu:

$$\begin{aligned}(f \cdot g)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x) + f(x_0) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left\{ \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\rightarrow f'(x_0)} \cdot \underbrace{g(x)}_{\rightarrow g(x_0)} + \underbrace{f(x_0)}_{\rightarrow f(x_0)} \cdot \underbrace{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}_{\rightarrow g'(x_0)} \right\} \\ &= f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0),\end{aligned}$$



Ještě zajímavější je to pro derivaci složené funkce $g = h \circ f$, kde definiční obor funkce $z = h(y)$ obsahuje obor hodnot funkce $y = f(x)$. Vhled do problému nám poskytne následující příklad.

Ještě zajímavější je to pro derivaci složené funkce $g = h \circ f$, kde definiční obor funkce $z = h(y)$ obsahuje obor hodnot funkce $y = f(x)$. Vhled do problému nám poskytne následující příklad.

Příklad

Uvažujme soukolí tří ozubených kol, přičemž kolo A má 12 zubů, kolo B má 4 zuby a kolo C má 6 zubů. Jestliže kolo A udělá y otáček, kolo B udělá u otáček a kolo C udělá x otáček, potom platí

$$y = \frac{1}{3} u, \quad u = \frac{3}{2} x, \quad \text{a tedy je} \quad y = \frac{1}{3} u = \frac{1}{3} \frac{3}{2} x = \frac{1}{2} x.$$

Vidíme, že při *skládání funkcí* se velikost změn (= derivace) *násobí*.

Opět vypsáním přírůstků dostáváme

$$g' = \frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{\Delta z}{\Delta y} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Můžeme tedy očekávat, že pravidlo pro výpočet bude
 $(h \circ f)'(x) = h'(f(x))f'(x)$.

Věta (Derivace složené funkce)

Má-li funkce $y = f(u)$ derivaci v bodě $u_0 := g(x_0)$ a funkce $u = g(x)$ derivaci v bodě x_0 , potom má složená funkce $y = (f \circ g)(x) = f(g(x))$ derivaci v bodě x_0 a platí

$$(f \circ g)'(x) = f'(u_0) \cdot g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0).$$

Důkaz.

Vztah pro derivaci podílu lze snadno odvodit přímo z definice, ukážeme zde ale, jak jej odvodit pomocí pravidla pro derivaci složené funkce.

Důkaz.

Vztah pro derivaci podílu lze snadno odvodit přímo z definice, ukážeme zde ale, jak jej odvodit pomocí pravidla pro derivaci složené funkce.

Pro funkci $(1/g) = (g^{-1})$ pravidlo pro derivaci složené funkce říká, že $(g^{-1})' = -g^{-2} \cdot g'$ a konečně pravidlo pro derivaci součinu nám dává právě kýžený vzorec:

$$(f/g)' = (f \cdot g^{-1})' = f'g^{-1} - fg^{-2}g' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$



Derivace inverzních funkcí

Již dávno jsme formulovali pojem **inverzní funkce**: Pokud k dané funkci $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ inverzní funkce f^{-1} existuje (nezaměňujeme značení s funkcí $x \mapsto (f(x))^{-1}$), pak je dána jednoznačně kterýmkoliv ze vztahů $f^{-1} \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}$, $f \circ f^{-1} = \text{id}_{\mathbb{R}}$, a druhý již pak platí také (analogicky id_A, id_B pro $f : A \rightarrow B$).

Derivace inverzních funkcí

Již dávno jsme formulovali pojem **inverzní funkce**: Pokud k dané funkci $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ inverzní funkce f^{-1} existuje (nezaměňujeme značení s funkcí $x \mapsto (f(x))^{-1}$), pak je dána jednoznačně kterýmkoliv ze vztahů $f^{-1} \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}$, $f \circ f^{-1} = \text{id}_{\mathbb{R}}$, a druhý již pak platí také (analogicky id_A , id_B pro $f : A \rightarrow B$).

Pokud bychom věděli, že pro diferencovatelnou funkci f je i f^{-1} diferencovatelná, vztah pro derivaci složené funkce nám (pro $y = f(x)$) dává

$$1 = (\text{id})'(x) = (f^{-1} \circ f)'(x) = (f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x)$$

a tedy přímo víme formuli (zjevně $f'(x)$ v takovém případě nemůže být nulové)

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}.$$

To dobře odpovídá intuitivní představě, že pro $y = f(x)$ je $f' = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ zatímco pro $x = f^{-1}(y)$ je $(f^{-1})'(y) = \frac{\Delta x}{\Delta y}$. Takto skutečně můžeme derivace inverzních funkcí počítat:

Věta

Je-li f diferencovatelná funkce na okolí bodu x_0 a $f'(x_0) \neq 0$, pak existuje na nějakém okolí bodu $y_0 = f(x_0)$ funkce f^{-1} inverzní k f a platí vztah

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

To dobře odpovídá intuitivní představě, že pro $y = f(x)$ je $f' = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ zatímco pro $x = f^{-1}(y)$ je $(f^{-1})'(y) = \frac{\Delta x}{\Delta y}$. Takto skutečně můžeme derivace inverzních funkcí počítat:

Věta

Je-li f diferencovatelná funkce na okolí bodu x_0 a $f'(x_0) \neq 0$, pak existuje na nějakém okolí bodu $y_0 = f(x_0)$ funkce f^{-1} inverzní k f a platí vztah

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Pokud je $f'(x_0) = 0$ izolovaným nulovým bodem derivace $f'(x)$ a inverzní funkce k f na okolí $f(x_0)$ existuje, pak je derivace funkce f^{-1} v bodě $f(x_0)$ nevlastní (přitom je rovna $+\infty$, právě když je f na daném okolí $f(x_0)$ rostoucí).

Příklad

Určete derivaci funkce $\sqrt[3]{x}$.

Příklad

Určete derivaci funkce $\sqrt[3]{x}$.

Řešení

Funkce $y = f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ je inverzní k funkci $x = f(y) = y^3$.
Protože $f'(y) = 3y^2$, máme

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{3y^2} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

Vidíme (ať už z předchozí věty nebo limitním přechodem v předchozím výpočtu), že v bodě $x_0 = 0$ má funkce $\sqrt[3]{x}$ derivaci ∞ .

Jiný (geometrický) pohled na derivaci inverzní funkce

Označme jako φ (známý) směrový úhel tečny ke grafu funkce $x = f(y)$ v bodě $[y_0, x_0]$ vzhledem ke kladnému směru osy y a jako ψ (neznámý) směrový úhel tečny ke grafu funkce $y = f^{-1}(x)$ v bodě $[x_0, y_0]$ vzhledem ke kladnému směru osy x , přičemž platí, že $\operatorname{tg} \varphi = f'(y_0)$ je známá hodnota a my chceme určit neznámou hodnotu

$$\operatorname{tg} \psi = (f^{-1})'(x_0).$$

Jiný (geometrický) pohled na derivaci inverzní funkce

Označme jako φ (známý) směrový úhel tečny ke grafu funkce $x = f(y)$ v bodě $[y_0, x_0]$ vzhledem ke kladnému směru osy y a jako ψ (neznámý) směrový úhel tečny ke grafu funkce $y = f^{-1}(x)$ v bodě $[x_0, y_0]$ vzhledem ke kladnému směru osy x , přičemž platí, že $\operatorname{tg} \varphi = f'(y_0)$ je známá hodnota a my chceme určit neznámou hodnotu

$$\operatorname{tg} \psi = (f^{-1})'(x_0).$$

Vzhledem k tomu, že $\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}$ (promyslete!), pro $\operatorname{tg} \varphi \neq 0$

$$\text{dostaneme } \operatorname{tg} \psi = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)} = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{1}{\operatorname{tg} \varphi}.$$

Je tedy

$$(f^{-1})'(x_0) = \frac{1}{f'(y_0)}.$$

Jiný (geometrický) pohled na derivaci inverzní funkce

Označme jako φ (známý) směrový úhel tečny ke grafu funkce $x = f(y)$ v bodě $[y_0, x_0]$ vzhledem ke kladnému směru osy y a jako ψ (neznámý) směrový úhel tečny ke grafu funkce $y = f^{-1}(x)$ v bodě $[x_0, y_0]$ vzhledem ke kladnému směru osy x , přičemž platí, že $\operatorname{tg} \varphi = f'(y_0)$ je známá hodnota a my chceme určit neznámou hodnotu

$$\operatorname{tg} \psi = (f^{-1})'(x_0).$$

Vzhledem k tomu, že $\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}$ (promyslete!), pro $\operatorname{tg} \varphi \neq 0$

$$\text{dostaneme } \operatorname{tg} \psi = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)} = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{1}{\operatorname{tg} \varphi}.$$

Je tedy

$$(f^{-1})'(x_0) = \frac{1}{f'(y_0)}.$$

Je-li $\operatorname{tg} \varphi = 0$ (tečna ke grafu původní funkce $x = f(y)$ je vodorovná), potom je tečna ke grafu inverzní funkce $y = f^{-1}(x)$ svislá, tj. $(f^{-1})'(x_0)$ je nevlastní.

Definice

Říkáme, že reálná nebo komplexní funkce f má derivaci druhého řádu v bodě x_0 , jestliže derivace f' existuje na nějakém okolí bodu x_0 a existuje její derivace v bodě x_0 . Píšeme

$$f''(x_0) = (f')'(x_0)$$

nebo také $f^{(2)}(x_0)$. Funkce f je **dvakrát diferencovatelná** na nějakém intervalu A , jestliže má druhou derivaci v každém jeho bodě.

Definice

Říkáme, že reálná nebo komplexní funkce f má derivaci druhého řádu v bodě x_0 , jestliže derivace f' existuje na nějakém okolí bodu x_0 a existuje její derivace v bodě x_0 . Píšeme

$$f''(x_0) = (f')'(x_0)$$

nebo také $f^{(2)}(x_0)$. Funkce f je **dvakrát diferencovatelná** na nějakém intervalu A , jestliže má druhou derivaci v každém jeho bodě.

Derivace vyšších řádů definujeme induktivně. Známe již pojem první a druhá derivace a říkáme, že reálná nebo komplexní funkce f je **k -krát diferencovatelná** pro nějaké přirozené číslo k v bodě x_0 , jestliže je $(k - 1)$ -krát diferencovatelná na nějakém okolí bodu x_0 a její $(k - 1)$ -ní derivace má v bodě x_0 derivaci.

Definice

Říkáme, že reálná nebo komplexní funkce f má derivaci druhého řádu v bodě x_0 , jestliže derivace f' existuje na nějakém okolí bodu x_0 a existuje její derivace v bodě x_0 . Píšeme

$$f''(x_0) = (f')'(x_0)$$

nebo také $f^{(2)}(x_0)$. Funkce f je **dvakrát diferencovatelná** na nějakém intervalu A , jestliže má druhou derivaci v každém jeho bodě.

Derivace vyšších řádů definujeme induktivně. Známe již pojem první a druhá derivace a říkáme, že reálná nebo komplexní funkce f je **k -krát diferencovatelná** pro nějaké přirozené číslo k v bodě x_0 , jestliže je $(k - 1)$ -krát diferencovatelná na nějakém okolí bodu x_0 a její $(k - 1)$ -ní derivace má v bodě x_0 derivaci.

Pro k -tou derivaci funkce $f(x)$ užíváme značení $f^{(k)}(x)$.

Jestliže existují derivace všech řádů na nějakém intervalu, říkáme, že je tam funkce f **hladká**. Většinou se také užívá konvence, že 0-krát diferencovatelná funkce znamená **spojitou funkci**. Pro funkce, jejichž k -tá derivace je spojitá, užíváme označení **třída funkcí** $C^k(A)$ na intervalu A , kde k může nabývat hodnot $0, 1, \dots, \infty$. Často píšeme pouze C^k , je-li definiční obor znám z kontextu.

Plán přednášky

- 1 Přírůstky do ZOO
- 2 Derivace
 - Vlastnosti a pravidla derivací
 - Derivace vyšších řádů
- 3 Derivace elementárních funkcí

Zatím máme shromážděny tyto typy funkcí:

- polynomy f definované na celém \mathbb{R} s hodnotami v \mathbb{R} nebo v \mathbb{C} ,

¹Později „znovu zadefinujeme“ goniometrické funkce pomocí mocninných řad.

Zatím máme shromážděny tyto typy funkcí:

- polynomy f definované na celém \mathbb{R} s hodnotami v \mathbb{R} nebo v \mathbb{C} ,
- racionální funkce f/g definované na celém \mathbb{R} kromě konečné množiny kořenů polynomu g ve jmenovateli zlomku, s hodnotami v \mathbb{R} nebo \mathbb{C} ,

¹Později „znovu zadefinujeme“ goniometrické funkce pomocí mocninných řad.

Zatím máme shromážděny tyto typy funkcí:

- polynomy f definované na celém \mathbb{R} s hodnotami v \mathbb{R} nebo v \mathbb{C} ,
- racionální funkce f/g definované na celém \mathbb{R} kromě konečné množiny kořenů polynomu g ve jmenovateli zlomku, s hodnotami v \mathbb{R} nebo \mathbb{C} ,
- mocninné funkce x^b s obecným $b \in \mathbb{R}$, definované pro $x > 0$ a hodnotami v \mathbb{R} ,

¹Později „znovu zadefinujeme“ goniometrické funkce pomocí mocninných řad.

Zatím máme shromážděny tyto typy funkcí:

- polynomy f definované na celém \mathbb{R} s hodnotami v \mathbb{R} nebo v \mathbb{C} ,
- racionální funkce f/g definované na celém \mathbb{R} kromě konečné množiny kořenů polynomu g ve jmenovateli zlomku, s hodnotami v \mathbb{R} nebo \mathbb{C} ,
- mocninné funkce x^b s obecným $b \in \mathbb{R}$, definované pro $x > 0$ a hodnotami v \mathbb{R} ,
- exponenciální funkce a^x o libovolném základu $a > 0$ definované pro všechna $x \in \mathbb{R}$ a s hodnotami v \mathbb{R} a k nim inverzní funkce logaritmické o základ $a > 0, a \neq 1$,

¹Později „znovu zdefinujeme“ goniometrické funkce pomocí mocninných řad.

Zatím máme shromážděny tyto typy funkcí:

- polynomy f definované na celém \mathbb{R} s hodnotami v \mathbb{R} nebo v \mathbb{C} ,
- racionální funkce f/g definované na celém \mathbb{R} kromě konečné množiny kořenů polynomu g ve jmenovateli zlomku, s hodnotami v \mathbb{R} nebo \mathbb{C} ,
- mocninné funkce x^b s obecným $b \in \mathbb{R}$, definované pro $x > 0$ a hodnotami v \mathbb{R} ,
- exponenciální funkce a^x o libovolném základu $a > 0$ definované pro všechna $x \in \mathbb{R}$ a s hodnotami v \mathbb{R} a k nim inverzní funkce logaritmické o základ $a > 0, a \neq 1$,
- goniometrické funkce $\sin x, \cos x$ (a funkce $\operatorname{tg} x, \operatorname{cotg} x$ od nich odvozené) definované jako souřadnice bodu na jednotkové kružnici, kde $|x|$ je délka oblouku od $[1, 0]$ k $[\cos x, \sin x]$.¹

¹Později „znovu zdefinujeme“ goniometrické funkce pomocí mocninných řad.

Derivace mocniny

Víme, že pro $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ je $(x^n)' = nx^{n-1}$. Nyní ukážeme, že stejný vztah platí pro libovolné (reálné) exponenty, nejen pro přirozená čísla.

Derivace mocniny

Víme, že pro $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ je $(x^n)' = nx^{n-1}$. Nyní ukážeme, že stejný vztah platí pro libovolné (reálné) exponenty, nejen pro přirozená čísla.

Věta (Derivace mocniny)

Pro libovolný exponent $r \in \mathbb{R}$ platí, že

$$(x^r)' = rx^{r-1}, \quad (1)$$

kdykoliv mají uvedené výrazy smysl.

Derivace mocniny

Víme, že pro $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ je $(x^n)' = nx^{n-1}$. Nyní ukážeme, že stejný vztah platí pro libovolné (reálné) exponenty, nejen pro přirozená čísla.

Věta (Derivace mocniny)

Pro libovolný exponent $r \in \mathbb{R}$ platí, že

$$(x^r)' = rx^{r-1}, \quad (1)$$

kdykoliv mají uvedené výrazy smysl.

Důkaz.

Nechť $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}_0$. Pak $m = -n \in \mathbb{N}$ a z věty o derivaci složené funkce dostáváme:

$$\begin{aligned} (x^n)' &= ((x^m)^{-1})' = -(x^m)^{-2} m x^{m-1} = -m x^{-2m+m-1} = \\ &= -m x^{-m-1} = n x^{n-1}. \end{aligned}$$

Derivace mocniny – pokr.

Důkaz.

Dále necht' $r = \frac{1}{q}$, kde $q \in \mathbb{N}$ (tj. derivujeme obecnou odmocninu).

Derivaci funkce $x^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{x}$ odvodíme z věty o derivaci inverzní funkce. Označme si $y = f^{-1}(x) = \sqrt[q]{x}$ a $x = f(y) = y^q$. Protože je $q \in \mathbb{N}$, je $f'(y) = qy^{q-1}$. Platí tedy, že

$$(x^r)' = (\sqrt[q]{x})' = \frac{1}{qy^{q-1}} = \frac{1}{q(\sqrt[q]{x})^{q-1}} = \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{x^{\frac{q-1}{q}}} = \frac{1}{q} x^{\frac{1}{q}-1} = rx^{r-1}.$$

Derivace mocniny – pokr.

Důkaz.

Dále necht' $r = \frac{1}{q}$, kde $q \in \mathbb{N}$ (tj. derivujeme obecnou odmocninu).

Derivaci funkce $x^{\frac{1}{q}} = \sqrt[q]{x}$ odvodíme z věty o derivaci inverzní funkce. Označme si $y = f^{-1}(x) = \sqrt[q]{x}$ a $x = f(y) = y^q$. Protože je $q \in \mathbb{N}$, je $f'(y) = qy^{q-1}$. Platí tedy, že

$$(x^r)' = (\sqrt[q]{x})' = \frac{1}{qy^{q-1}} = \frac{1}{q(\sqrt[q]{x})^{q-1}} = \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{x^{\frac{q-1}{q}}} = \frac{1}{q} x^{\frac{1}{q}-1} = rx^{r-1}.$$

Derivaci funkce $x^{\frac{p}{q}} = (x^{\frac{1}{q}})^p$ odvodíme z věty o derivaci složené funkce

$$\begin{aligned}(x^r)' &= [(x^{\frac{1}{q}})^p]' = p (x^{\frac{1}{q}})^{p-1} \cdot \frac{1}{q} x^{\frac{1}{q}-1} = \frac{p}{q} x^{\frac{p-1}{q}} \cdot x^{\frac{1-q}{q}} = \\ &= \frac{p}{q} x^{\frac{p-1+1-q}{q}} = \frac{p}{q} x^{\frac{p}{q}-1} = rx^{r-1}.\end{aligned}$$

Derivace mocniny – dokončení

Důkaz.

Zbývá přejít od racionálního exponentu k obecnému reálnému, což lze udělat buď úvahami o spojitosti nebo se odkázat na pozdější výsledky o exponenciálních funkcích.

Derivace goniometrických funkcí

Věta

Pro goniometrické funkce platí

$$(\sin x)' = \cos x,$$

$$(\cos x)' = -\sin x,$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x},$$

$$(\operatorname{cotg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Derivace goniometrických funkcí

Věta

Pro goniometrické funkce platí

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x, \\ (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}, & (\operatorname{cotg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}.\end{aligned}$$

Důkaz.

Derivaci funkce $\sin x$ vypočteme přímo z definice:

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ (\sin x) \cdot \underbrace{\frac{\cos h - 1}{h}}_{\rightarrow 0} + (\cos x) \cdot \underbrace{\frac{\sin h}{h}}_{\rightarrow 1} \right\} = \cos x.\end{aligned}$$



Derivace goniometrických funkcí – dokončení

Důkaz.

Derivace ostatních goniometrických funkcí vypočteme z derivace funkce $\sin x$ pomocí jejich vyjádření jako složené funkce či podílu funkcí, jejichž derivaci známe.

Derivace goniometrických funkcí – dokončení

Důkaz.

Derivace ostatních goniometrických funkcí vypočteme z derivace funkce $\sin x$ pomocí jejich vyjádření jako složené funkce či podílu funkcí, jejichž derivaci známe.

$$(\cos x)' = (\sin(\frac{\pi}{2} - x))' = \cos(\frac{\pi}{2} - x) \cdot (-1) = -\sin x,$$

Derivace goniometrických funkcí – dokončení

Důkaz.

Derivace ostatních goniometrických funkcí vypočteme z derivace funkce $\sin x$ pomocí jejich vyjádření jako složené funkce či podílu funkcí, jejichž derivaci známe.

$$(\cos x)' = (\sin(\frac{\pi}{2} - x))' = \cos(\frac{\pi}{2} - x) \cdot (-1) = -\sin x,$$

dále

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (\operatorname{cotg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$



Derivace exponenciálních a logaritmických funkcí

Věta

Pro exponenciální a logaritmické funkce platí

$$\begin{aligned}(e^x)' &= e^x, & (a^x)' &= a^x \ln a, \\ (\ln x)' &= \frac{1}{x}, & (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a}.\end{aligned}$$

Důkaz.

Derivaci funkce e^x vypočteme z definice za použití základní limity spočítané dříve:

$$\begin{aligned}(e^x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h} = \\ &= e^x \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}}_{=1} = e^x \cdot 1 = e^x.\end{aligned}$$

Derivace exponenciálních a logaritmických funkcí – pokr.

Důkaz.

Podobně bychom z definice mohli spočítat derivaci funkce a^x pro obecné a , s využitím vyjádření $a^x = e^{x \ln a}$ ale snadno vypočteme, že

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = \ln a \cdot a^x.$$

Derivace exponenciálních a logaritmických funkcí – pokr.

Důkaz.

Podobně bychom z definice mohli spočítat derivaci funkce a^x pro obecné a , s využitím vyjádření $a^x = e^{x \ln a}$ ale snadno vypočteme, že

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = \ln a \cdot a^x.$$

Podobně, protože logaritmická funkce byla definovaná jako inverzní k exponenciální, pro $y = f^{-1}(x) = \ln x$ a pro $x = f(y) = e^y$ máme $f'(y) = e^y$, takže

$$(\ln x)' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

Derivace exponenciálních a logaritmických funkcí – pokr.

Důkaz.

Podobně bychom z definice mohli spočítat derivaci funkce a^x pro obecné a , s využitím vyjádření $a^x = e^{x \ln a}$ ale snadno vypočteme, že

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = \ln a \cdot a^x.$$

Podobně, protože logaritmická funkce byla definovaná jako inverzní k exponenciální, pro $y = f^{-1}(x) = \ln x$ a pro $x = f(y) = e^y$ máme $f'(y) = e^y$, takže

$$(\ln x)' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

a

$$(\log_a x)' = \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right)' = \frac{1}{\ln a} \cdot (\ln x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$



Derivace mocniny napodruhé

Důsledek

Pro libovolné $r \in \mathbb{R}$ platí

$$(x^r)' = rx^{r-1}, \quad x > 0.$$

Důkaz.

Z pravidla pro derivaci složené funkce a z derivace logaritmu plyne, že

$$(x^r)' = (e^{r \ln x})' = e^{r \ln x} \cdot (r \ln x)' = x^r \cdot r \frac{1}{x} = rx^r \cdot x^{-1} = rx^{r-1}.$$



Další přírůstky – cyklometrické funkce

Cyklometrické funkce jsou inverzní ke goniometrickým. Protože jsou všechny goniometrické funkce periodické s periodou 2π , jsou jejich inverze definované vždy jen v rámci jedné periody a to ještě jen na části, kdy je daná funkce buď rostoucí nebo klesající. Jsou to funkce

$$\arcsin = \sin^{-1}$$

s definičním oborem $[-1, 1]$ a oborem hodnot $[-\pi/2, \pi/2]$. Dále

$$\arccos = \cos^{-1}$$

s definičním oborem $[-1, 1]$ a oborem hodnot $[0, \pi]$.



Zbývají ještě funkce

$$\arctg = \operatorname{tg}^{-1}$$

s definičním oborem $(-\infty, \infty)$ a oborem hodnot $(-\pi/2, \pi/2)$ a konečně

$$\operatorname{arccotg} = \operatorname{cotg}^{-1}$$

s definičním oborem $(-\infty, \infty)$ a oborem hodnot $(0, \pi)$.



0

Derivace cyklometrických funkcí

Věta

Pro cyklometrické funkce platí

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Derivace cyklometrických funkcí

Věta

Pro cyklometrické funkce platí

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Důkaz.

Derivace všech cyklometrických funkcí vypočteme z pravidla pro derivování inverzní funkce.

Derivace cyklometrických funkcí

Věta

Pro cyklometrické funkce platí

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Důkaz.

Derivace všech cyklometrických funkcí vypočteme z pravidla pro derivování inverzní funkce. Pro $y = f^{-1}(x) = \arcsin x$ a pro $x = f(y) = \sin y$ máme $f'(y) = \cos y$, a proto dostáváme

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)}.$$



Důkaz.

Tento výsledek ale ještě zjednodušíme. Protože pro libovolné $y \in \mathbb{R}$ je $(\cos y)^2 + (\sin y)^2 = 1$, je

$$1 = [\cos(\arcsin x)]^2 + [\underbrace{\sin(\arcsin x)}_{=x}]^2 = \cos^2(\arcsin x) + x^2,$$
$$\Rightarrow \cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

A tedy platí, že

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Důkaz.

Tento výsledek ale ještě zjednodušíme. Protože pro libovolné $y \in \mathbb{R}$ je $(\cos y)^2 + (\sin y)^2 = 1$, je

$$1 = [\cos(\arcsin x)]^2 + [\underbrace{\sin(\arcsin x)}_{=x}]^2 = \cos^2(\arcsin x) + x^2,$$
$$\Rightarrow \cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

A tedy platí, že

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Obdobným způsobem postupujeme i u ostatních cyklometrických funkcí. □

Vlastnosti jednotlivých obyvatelů zvířetníku a jejich vztahy:

funkce	definiční obor	třída	derivace	inverze
polynomy f	celé \mathbb{R}	C^∞	f' opět polynom	f^{-1} existuje jen lokálně a neumíme obecnou formulí
kubické splajny h	celé \mathbb{R}	C^2	h' je opět splajn	formule s odmocninami a jen lokálně
racionální funkce f/g	celé \mathbb{R} mimo kořeny g	C^∞	opět racionální funkce: $\frac{f'g - fg'}{g^2}$	existuje jen lokálně a neumíme obecnou formulí

funkce	definiční obor	třída	derivace	inverze
mocninné funkce x^a	interval $(0, \infty)$	C^∞	funkce ax^{a-1}	existuje všude a je opět mocninnou funkcí $y^{1/a}$
exponenciální funkce a^x , $a > 0$, $a \neq 1$	celé \mathbb{R}	C^∞	existuje všude a je $\ln a \cdot a^x$	logaritmická funkce \log_a
goniometrické funkce $\sin x$, $\cos x$	celé \mathbb{R}	C^∞	existuje všude, vzorec známe	cyklometrické funkce, existují lokálně