

# Matematika I – 4. přednáška

## Relace a zobrazení

Jan Slovák

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

8. 10. 2012

# Obsah přednášky

- 1 Relace a zobrazení
- 2 Relace na množině
- 3 Rozklad podle ekvivalence

V závěrečné části úvodní motivační kapitoly se vrátíme k formálnímu popisu matematických struktur, budeme se je ale průběžně snažit ilustrovat na již známých příkladech. Zároveň můžeme tuto část brát jako cvičení ve formálním přístupu k objektům a konceptům matematiky.

### Definition

**Binární relací** mezi množinami  $A$  a  $B$  rozumíme podmnožinu  $R$  kartézského součinu  $A \times B$ . Často píšeme  $a \simeq_R b$  pro vyjádření skutečnosti, že  $(a, b) \in R$ , tj. že body  $a \in A$  a  $b \in B$  jsou v relaci  $R$ . **Definičním oborem relace** je podmnožina

$$D \subset A, \quad D = \{a \in A; \exists b \in B, (a, b) \in R\}.$$

Podobně **oborem hodnot relace** je podmnožina

$$I \subset B, \quad I = \{b \in B; \exists a \in A, (a, b) \in R\}.$$

Speciálním případem relace mezi množinami je **zobrazení z množiny  $A$  do množiny  $B$** . Je to případ, kdy pro každý prvek definičního oboru relace existuje právě jeden prvek z oboru hodnot, který je s ním v relaci. Nám známým případem zobrazení jsou všechny skalární funkce, kde oborem hodnot zobrazení je množina skalárů, třeba celých nebo reálných čísel. Pro zobrazení zpravidla používáme značení, které jsme také u skalárních funkcí zavedli.

Píšeme

$$f : D \subset A \rightarrow I \subset B, f(a) = b$$

pro vyjádření skutečnosti, že  $(a, b)$  patří do relace, a říkáme, že  $b$  je hodnotou zobrazení  $f$  v bodě  $a$ .

Dále říkáme, že  $f$  je

- zobrazení množiny  $A$  do množiny  $B$ , jestliže je  $D = A$ ,
- zobrazení množiny  $A$  na množinu  $B$ , jestliže je  $D = A$  a  $I = B$ , často také **surjektivní zobrazení**
- **injektivní zobrazení**, jestliže je  $D = A$  a pro každé  $b \in I$  existuje právě jeden **vzor**  $a \in A$ ,  $f(a) = b$ .

Vyjádření zobrazení  $f : A \rightarrow B$  jakožto relace

$f \subset A \times B$ ,  $f = \{(a, f(a)); a \in A\}$  známe také pod názvem **graf zobrazení  $f$** .

U zobrazení je jasná koncepce, jak se skládají. Máme-li zobrazení  $f : A \rightarrow B$  a  $g : B \rightarrow C$ , pak jejich **složení**  $g \circ f$  je definováno

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Ve značení používaném pro relace totéž můžeme zapsat jako

$$\begin{aligned} f &\subset A \times B, & f &= \{(a, f(a)); a \in A\} \\ g &\subset B \times C, & g &= \{(b, g(b)); b \in B\} \\ g \circ f &\subset A \times C, & g \circ f &= \{(a, g(f(a))); a \in A\}. \end{aligned}$$

Zcela obdobně definujeme **skládání relací**, v předchozích vztazích jen doplníme existenční kvantifikátory, tj. musíme uvažovat všechny „vzory“ a všechny „obrazy“. Uvažme relace  $R \subset A \times B$ ,  $S \subset B \times C$ . Potom

$$S \circ R \subset A \times C, \quad S \circ R = \{(a, c); \exists b \in B, (a, b) \in R, (b, c) \in S\}.$$

Zvláštním případem relace je **identické zobrazení**

$$\text{id}_A = \{(a, a) \in A \times A; a \in A\}$$

na množině  $A$ . Je neutrální vzhledem ke skládání s každou relací s definičním oborem nebo oborem hodnot  $A$ .

Pro každou relaci  $R \subset A \times B$  definujeme **inverzní relaci**

$$R^{-1} = \{(b, a); (a, b) \in R\} \subset B \times A.$$

Pozor, u zobrazení, je stejný pojem užíván ve specifitější situaci. Samozřejmě, že existuje pro každé zobrazení jeho inverzní relace, ta však nemusí být zobrazením. Zcela logicky proto hovoříme o existenci inverzního zobrazení, pokud každý prvek  $b \in B$  je obrazem pro právě jeden vzor v  $A$ . V takovém případě je samozřejmě inverzní zobrazení právě inverzní relací.

Všimněme si, že složením zobrazení a jeho inverzního zobrazení (pokud obě existují) vždy vznikne identické zobrazení, u obecných relací tomu tak být nemusí.



## Definition

V případě  $A = B$  hovoříme o relaci na množině  $A$ . Říkáme, že  $R$  je:

- **reflexivní**, pokud  $\text{id}_A \subset R$  (tj.  $(a, a) \in R$  pro všechny  $a \in A$ ),
- **symetrická**, pokud  $R^{-1} = R$  (tj. pokud  $(a, b) \in R$ , pak i  $(b, a) \in R$ ),
- **antisymetrická**, pokud  $R^{-1} \cap R \subset \text{id}_A$  (tj. pokud  $(a, b) \in R$  a zároveň  $(b, a) \in R$ , pak  $a = b$ ),
- **tranzitivní**, pokud  $R \circ R \subset R$ , tj. pokud z  $(a, b) \in R$  a  $(b, c) \in R$  vyplývá i  $(a, c) \in R$ .

Relace se nazývá **ekvivalence**, pokud je současně reflexivní, symetrická i tranzitivní. Relace se nazývá **uspořádání** jestliže je reflexivní, tranzitivní a antisymetrická.

Dobrym příkladem uspořádaní je inkluze. Uvažme množinu  $2^A$  všech podmnožin konečné množiny  $A$  (značení je speciálním případem obvyklé notace  $B^A$  pro množinu všech zobrazení  $A \rightarrow B$ ) a na ní relaci  $X \subset Z$  danou vlastností „být podmnožinou“. Evidentně jsou splněny všechny tři vlastnosti pro uspořádaní: skutečně, je-li  $X \subset Y$  a zároveň  $Y \subset X$  musí být nutně množiny  $X$  a  $Y$  stejné. Je-li  $X \subset Y \subset Z$  je také  $X \subset Z$  a také reflexivita je zřejmá. Říkáme, že uspořádaní je **úplné**, když pro každé dva prvky platí že jsou **srovnatelné**, tj. buď  $a \leq b$  nebo  $b \leq a$ . Všimněme si, že ne všechny dvojice  $(X, Y)$  podmnožin v  $A$  jsou srovnatelné v tomto smyslu. Přesněji, pokud je v  $A$  více než jeden prvek, existují podmnožiny  $X$  a  $Y$ , kdy není ani  $X \subset Y$  ani  $Y \subset X$ .

Každá ekvivalence  $R$  na množině  $A$  zadává zároveň **rozklad** množiny  $A$  na podmnožiny vzájemně ekvivalentních prvků, tzv. **třídy ekvivalence**. Klademe pro libovolné  $a \in A$

$$R_a = \{b \in A; (a, b) \in R\}.$$

Často budeme psát pro  $R_a$  prostě  $[a]$ , je-li z kontextu zřejmé, o kterou ekvivalenci jde.

Zjevně  $R_a = R_b$  právě, když  $(a, b) \in R$  a každá taková podmnožina je tedy reprezentována kterýmkoliv svým prvkem, tzv.

**reprezentantem**. Zároveň  $R_a \cap R_b \neq \emptyset$  právě, když  $R_a = R_b$ , tj. třídy ekvivalence jsou po dvou disjunktní. Konečně,  $A = \bigcup_{a \in A} R_a$ , tj. celá množina  $A$  se skutečně rozloží na jednotlivé třídy.

Můžeme také třídám rozkladu rozumět tak, že třídu  $[a]$  vnímáme jako prvek  $a$  „až na ekvivalenci“.

## Příklad – zbytkové třídy

Pro pevně zvolené přirozené číslo  $k$  definujeme ekvivalenci  $\sim_k$  tak, že dvě čísla  $a, b \in \mathbb{Z}$  jsou ekvivalentní, jestliže jejich zbytek po dělení číslem  $k$  je stejný. Výslednou množinu tříd ekvivalence označujeme  $\mathbb{Z}_k$ .

Nejjednodušší je tato procedura pro  $k = 2$ . To dostáváme  $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ , kde nula reprezentuje sudá čísla, zatímco jednička čísla lichá. Opět lze snadno zjistit, že pomocí reprezentantů můžeme definovat násobení a sčítání.

Výsledná množina „skalárů“ je komutativním tělesem (tj. splňuje i vlastnost (P) pole) právě když je  $k$  prvočíslo.

Tento jednoduchý příklad ukazuje, jak důležité je umět nahlížet na třídy ekvivalence jako na celistvý objekt a soustředit se na vlastnosti těchto objektů, nikoliv formální popisy jejich konstrukcí. Ty jsou však důležité k ověření, že takové objekty vůbec existují.