

Cvičení 13.: Jednoduchá lineární regresní analýza II

Příklad 1.: Rozhodněte, zda následující dvojice přímek mohou být sdruženými regresními přímkami. V kladném případě najděte těžiště příslušného tečkového diagramu.

a) $y = 13 - 2x$, $x = 2,5$

Výsledek: Uvedené přímky mohou být sdruženými regresními přímkami. Protínají se v bodě o souřadnicích $[2,5; 8]$.

b) $y = 13 - 2x$, $x = 0,4y$

Výsledek: Uvedené přímky mohou být sdruženými regresními přímkami. Protínají se v bodě o souřadnicích $[2,8; 7,2]$.

c) $y = 13 - 2x$, $x = 8 - y$

Výsledek: Uvedené přímky nemohou být sdruženými regresními přímkami.

d) $y = 13 - 2x$, $x = 6,5 - 0,5y$

Výsledek: Uvedené přímky mohou být sdruženými regresními přímkami a splynou.

Příklad 2.: Od šesti náhodně vybraných domácností byly získány údaje o počtu členů (veličina X) a měsíčních výdajích za určitý druh zboží (veličina Y).

X	1	2	3	4	5	6
Y	550	750	1200	1450	2200	2250

a) Najděte rovnici regresní přímky, která vystihuje závislost výdajů na počtu členů domácností. Pro úsporu času máte uvedeny následující výsledky:

$$\sum_{i=1}^6 x_i = 21, \sum_{i=1}^6 y_i = 8400, \sum_{i=1}^6 x_i y_i = 35950, \sum_{i=1}^6 x_i^2 = 91, \sum_{i=1}^6 y_i^2 = 14310000.$$

b) Vypočtěte index determinace a interpretujte ho.

Výsledek:

ad a) $y = 90 + 374,286x$

ad b) $ID^2 = 0,961$. Znamená to, že 96,1 % variability výdajů za určitý druh zboží je vysvětleno regresní přímkou.

Příklad 3.: Koeficienty regresní přímky vyjadřující závislost Y na X jsou $b_0 = 67,5$, $b_1 = 0,3$. Koeficient korelace veličin X a Y je 0,75. Průměr veličiny X je 25, veličiny Y je 75. Najděte koeficienty druhé regresní přímky.

Výsledek: Druhá regresní přímka má rovnici $x = -115,625 + 1,875y$

Příklad 4.: Na podzim byla uskladněna zimní jablka. Po čase bylo vždy odebráno několik kusů a u každého byla posuzována chuť, tvrdost, kvalita slupky a celkový vzhled jablka. Vyšší počet bodů odpovídá lepší kvalitě ovoce. Doba, která uplynula od uskladnění, je nezávisle proměnná veličina X, počet bodů závisle proměnná veličina Y.


X	Y
0	5 6 4 5
2	9 7 8
4	9 8 10 10 8
6	8 5 7 4 6
8	3 1 2

Na hladině významnosti 0,05 testujte hypotézu, že regresní přímka je vhodný model závislosti Y na X. Pokud bude hypotéza o adekvátnosti regresní přímky zamítnuta, použijte model regresní paraboly.

Řešení v systému STATISTICA:

Načteme datový soubor zimni_jablka.sta se dvěma proměnnými X a Y a 20 případy.

Data znázorníme graficky:



Je zřejmé, že přímka nebude vhodným regresním modelem.

Test adekvátnosti modelu provedeme pomocí Obecných regresních modelů:

Statistiky – Pokročilé lineární/nelineární modely – Obecné regresní modely – Jednorozměrná regrese - OK – na záložce Možnosti zaškrtneme Kvalita proložení – OK – Závislá Y, Spoj. nezáv. prom. X – OK – Více výsledků – Celkové R – ve stromové struktuře vlevo vybereme Test kvality modelu.

Dependent Variable	Test of Lack of Fit (zimni_jablka.sta)										
	SS Residual	df Residual	MS Residual	SS Pure Err	df Pure Err	MS Pure Err	SS Lack of Fit	df Lack of Fit	MS Lack of Fit	F	p
Y	114,3056	18	6,350309	20,00000	15	1,333333	94,30556	3	31,43519	23,57639	0,000006

Hodnota testové statistiky je 23,576 a odpovídající p-hodnota je blízka 0. Na hladině významnosti 0,05 tedy zamítáme hypotézu, že přímka je vhodným modelem k popisu závislosti kvality jablek na době skladování.

Použijeme-li model $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$, nemůžeme na hladině významnosti 0,05 zamítnout hypotézu, že tento model je adekvátní, neboť odpovídající p-hodnota je 0,4619:

Dependent Variable	Test of Lack of Fit (zimni_jablka.sta)										
	SS Residual	df Residual	MS Residual	SS Pure Err	df Pure Err	MS Pure Err	SS Lack of Fit	df Lack of Fit	MS Lack of Fit	F	p
Y	22,16943	17	1,304084	20,00000	15	1,333333	2,169434	2	1,084717	0,813538	0,461919

Odhadnuté parametry:

Regression Summary for Dependent Variable: Y (zimni_jablka.st)						
R= ,90909975 R2= ,82646235 Adjusted R2= ,80604616						
F(2,17)=40,481 p<,00000 Std.Error of estimate: 1,1420						
N=20	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(17)	p-value
Intercept			5,038438	0,542163	9,29322	0,000000
X	2,32875	0,331422	2,193419	0,312162	7,02653	0,000002
Xkv	-2,78576	0,331422	-0,325953	0,038779	-8,40547	0,000000

Výsledný model má tvar: $y = 5,0384 + 2,1934x - 0,3260x^2$.

Příklad 5.: Jsou známy údaje o počtu obyvatel USA v letech 1815 až 1975 (v milionech osob):

1815	1825	1835	1845	1855	1865	1875	1885	1895	1905	1915	1925	1935	1945	1955	1965	1975
8,3	11	14,7	19,7	26,7	35,2	44,4	55,9	68,9	83,2	98,8	114,2	127,1	140,1	164	190,9	214,3

Předpokládáme, že růst populace se řídí exponenciální regresní funkcí $y = e^{\beta_0 + \beta_1 x}$, kde y je počet jedinců a x je čas, $x = 1815, 1825, \dots, 1975$.

Odhadněte parametry exponenciální regresní funkce. Znázorněte data s proloženou regresní funkcí. Pomocí D-W statistiky testujte hypotézu, že mezi rezidui neexistuje pozitivní autokorelace.


Návod: Data jsou uložena v souboru populace_USA.sta. V datovém souboru přidáme novou proměnnou LnY, do jejíhož Dlouhého jména napíšeme Log(Y). Provedeme regresní analýzu se závisle proměnnou LnY a nezávisle proměnnou X.

Výsledky regrese se závislou proměnnou : lny (populace_USA.sta)						
R= ,98522411 R2= ,97066655 Upravené R2= ,96871099						
F(1,15)=496,36 p<,00000 Směrod. chyba odhadu : ,18230						
N=17	b*	Sm.chyba z b*	b	Sm.chyba z b	t(15)	p-hodn.
Abs.člen			-34,0828	1,710803	-19,9221	0,000000
X	0,985224	0,044222	0,0201	0,000902	22,2792	0,000000

Výsledný model má tedy tvar: $y = e^{-34,0828 + 0,201 \cdot x}$

Dílčí t-testy vedou k zamítnutí hypotéz o nevýznamnosti regresních parametrů β_0, β_1 , obě p-hodnoty jsou blízké 0. Testová statistika celkového F-testu nabývá hodnotu 496,36, odpovídající p-hodnota je také velmi blízká 0. Exponenciální model vysvětluje variabilitu počtu osob v USA v letech 1815 – 1975 z 97 %.

Grafické znázornění dat s proloženou regresní funkcí:



D-W statistika nabývá hodnoty 0,1532. Kritické hodnoty pro $\alpha = 0,05$, $n = 15$, $p = 2$ jsou: $d_L = 0,95$, $d_U = 1,54$. Testová statistika je menší než d_L , tedy jsme na hladině významnosti 0,05 prokázali existenci pozitivní autokorelace reziduí.

Nepovinný úkol: Postupem popsáním v přednášce odstraňte problém autokorelovaných reziduí.

Příklad k samostatnému řešení: Ředitel státní správy nebyl spokojen s prací jistého oddělení. Nařídil proto, aby po dobu půl roku nejméně jednou měsíčně byla práce pracovníků tohoto oddělení kontrolována a hodnocena. Po půl roce obdržel výsledky hodnocení a chtěl vědět, zda se práce zlepšila. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty bodového hodnocení (škála 1 až 10, 1 nejlepší, 10 nejhorší) za příslušné měsíce:

body	8,0	7,8	7,3	6,4	6,0	5,6
měsíc	leden	leden	leden	únor	únor	únor
body	5,4	4,8	5,7	5,0	4,8	4,7
měsíc	březen	březen	březen	duben	květen	červen

Proveďte test adekvátnosti přímkového modelu [$p = 0,043$] a kvadratického modelu [$p = 0,6$]. Pomocí kvadratického modelu najděte 95% empirický interval spolehlivosti pro predikci bodového hodnocení pro měsíc červen a pomocí statistického softwaru nakreslete graf 95% pásu spolehlivosti. [predikce = 4,896, dolní mez = 4,128, horní mez = 5,664]. Data jsou uložena v souboru statni_sprava.sta.

