

Matematika III, 3. cvičení

Příklad 1. Určete rovnici tečné roviny ke grafu funkce $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$ v bodě $[x_0, y_0, z_0] = [1, 1, ?]$.

Výsledek. $z_0 = 4, 3x + 5y - z = 4$.

Příklad 2. Pomocí Taylorova polynomu 2. stupně přibližně vypočtete $\sqrt{2,98^2 + 4,05^2}$.

Lokální extrémy funkcí více proměnných

Připomeňme, že pro funkci jedné proměnné $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a její stacionární bod x_0 (tj. bod $x_0 \in \mathbb{R}$, pro který platí $f'(x_0) = 0$) platí:

- je-li $f''(x_0) < 0$, má funkce f v bodě x_0 ostré lokální maximum,
- pokud má funkce f v bodě x_0 neostré lokální minimum, je $f''(x_0) \geq 0$,
- je-li $f''(x_0) > 0$, má funkce f v bodě x_0 ostré lokální minimum,
- pokud má funkce f v bodě x_0 neostré lokální maximum, je $f''(x_0) \leq 0$.

Pro jednoduchost budeme uvažovat funkci dvou proměnných $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, obecný případ pro funkci $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ byl probrán na přednášce. Podobné tvrzení jako pro lokální extrémy funkcí jedné proměnné dostaneme pro funkce dvou (resp. více) proměnných:

Nechť $[x_0, y_0]$ je stacionární bod funkce $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (tedy platí $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$) a nechť má tato funkce v nějakém okolí bodu $[x_0, y_0]$ spojité parciální derivace druhého řádu. Pak platí:

- Je-li $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ a

$$\det Hf(x_0, y_0) = \det \begin{pmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{xy}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = f''_{xx}(x_0, y_0)f''_{yy}(x_0, y_0) - [f''_{xy}(x_0, y_0)]^2 > 0,$$

má funkce f v bodě $[x_0, y_0]$ ostré lokální minimum,

- Je-li $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ a $\det Hf(x_0, y_0) > 0$, má funkce f v bodě $[x_0, y_0]$ ostré lokální maximum,
- Je-li $\det Hf(x_0, y_0) < 0$, extrém v bodě $[x_0, y_0]$ nenastává,
- V ostatních případech (tj. pokud $\det Hf(x_0, y_0) = 0$), nic o extrému v bodě $[x_0, y_0]$ nevíme, musíme použít různé triky.

Dále platí, že funkce $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (platí to i pro funkce více než dvou proměnných) může mít lokální extrém pouze ve svém stacionárním bodě nebo v bodě, kde alespoň jedna z parciálních derivací neexistuje.

Příklad 3. Určete lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$.

Výsledek. Tři stacionární body: $P_1 = [0, 0]$, $P_2 = [1, 1]$, $P_3 = [-1, -1]$. V P_1 extrém nenastává, v obou bodech P_2, P_3 má funkce f ostré lokální minimum.

Příklad 4. Určete lokální extrémy funkce $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Výsledek. Stacionární body jsou $P_1 = [0, 0]$, $P_2 = [1, 1]$, v P_1 není extrém, v P_2 je ostré lokální minimum.

Příklad 5. Určete lokální extrémy funkce $f(x, y) = \ln(5x) - x^2 + xy + y^2$.

Výsledek. Stacionární body jsou $P_1 = [\sqrt{2/5}, -1/\sqrt{10}]$, $P_2 = [-\sqrt{2/5}, 1/\sqrt{10}]$, ani v jednom z nich extrém nenastává.

Příklad 6. Určete lokální extrémy funkce

$$f(x, y, z) = x + \frac{y^2}{4x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z}$$

ležící v prvním oktantu (tj v části prostoru, kde jsou všechny tři souřadnice nezáporné) a určete jejich typ.

Výsledek. Jediný stacionární bod je $[\frac{1}{2}, 1, 1]$, ve kterém je lokální minimum, neboť

$$Hf = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

je pozitivně definitní např. podle Sylvestrova kritéria ($a_{11} > 0$, $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0$, $\det Hf > 0$).

Příklad 7. Najděte všechny stacionární body funkce $z = f(x, y)$ definované implicitně rovnicí $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ a zjistěte, zda jsou v těchto bodech lokální extrémy.

Výsledek. Vyjde

$$z'_x = -\frac{4x + 8z}{8x + 2z - 1}, \quad z'_y = -\frac{4y}{8x + 2z - 1},$$

stacionární body jsou $[-2, 0, 1]$, $[\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7}]$. Dále

$Hf(-2, 0) = \begin{pmatrix} 4/15 & 0 \\ 0 & 4/15 \end{pmatrix}$, takže funkce $f(x, y)$ má v bodě $[-2, 0]$ lokální minimum;

$Hf(\frac{16}{7}, 0) = \begin{pmatrix} -4/15 & 0 \\ 0 & -4/15 \end{pmatrix}$, takže funkce $f(x, y)$ má v bodě $[-2, 0]$ lokální maximum.

Příklad 8. Určete lokální extrémy funkce $f(x, y) = xy \ln(x^2 + y^2)$.

Výsledek.

$$f'_x = y \left[\ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2} \right], \quad f'_y = x \left[\ln(x^2 + y^2) + \frac{2y^2}{x^2 + y^2} \right],$$

stacionární body jsou

$$P_{1,2} = [0, \pm 1], \quad P_{3,4} = [\pm 1, 0], \quad P_{5-8} = [\pm 1/\sqrt{2e}, \pm 1/\sqrt{2e}].$$

Dále

$$f''_{xx} = \frac{2xy(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f''_{xy} = \ln(x^2 + y^2) + 2 - \frac{4x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f''_{yy} = \frac{2xy(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$\det Hf(P_{1-4}) = \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -4 < 0$, tudíž v bodech P_{1-4} není extrém.

Pro $P_5 = [1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$ a $P_6 = [-1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]$ je $f''_{xx}(P_{5,6}) = 2 > 0$, $\det Hf(P_{5,6}) = 4 > 0$, tudíž v bodech P_5, P_6 je ostré lokální minimum.

Pro $P_7 = [1/\sqrt{2e}, -1/\sqrt{2e}]$ a $P_8 = [-1/\sqrt{2e}, 1/\sqrt{2e}]$ je $f''_{xx}(P_{7,8}) = -2 < 0$, $\det Hf(P_{5,6}) = 4 > 0$, tudíž v bodech P_7, P_8 je ostré lokální maximum.

Příklad 9. Najděte lokální extrémy funkce $f(x, y) = x - 2y + \ln \sqrt{x^2 + y^2} + 3 \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ a pro každý extrém určete jeho typ.

Výsledek. Vyjde

$$f'_x = 1 + \frac{x - 3y}{x^2 + y^2}, \quad f'_y = -2 + \frac{3x + y}{x^2 + y^2},$$

stacionární bod je $[-7/5, 1/5]$. Dále

$$f''_{xx} = \frac{y^2 - x^2 + 6xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f''_{xy} = \frac{3y^2 - 3x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad f''_{yy} = \frac{x^2 - y^2 - 6xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

$Hf(-7/5, 1/5) = \begin{pmatrix} -9/10 & -13/10 \\ -13/10 & 9/10 \end{pmatrix}$, takže funkce $f(x, y)$ v bodě $[-7/5, 1/5]$ nemá extrém.