

Matematika III – 10. týden  
Číselné charakteristiky – střední hodnota, rozptyl,  
kovariance, korelace, momenty

Jan Slovák

Masarykova univerzita  
Fakulta informatiky

23.–27. 11. 2015

# Obsah přednášky

- 1 Literatura
- 2 Střední hodnota, rozptyl a kvantilová funkce
- 3 Kovariance
- 4 Momentová funkce

## Kde je dobré číst?

- Karel Zvára, Josef Štěpán, Pravděpodobnost a matematická pravděpodobnost statistika, Matfyzpress, 2006, 230pp.
- J. Slovák, M. Panák, M. Bulant, Matematika drsně a svižně, Muni Press, Brno 2013, v+773 s., elektronická edice [www.math.muni.cz/Matematika\\_drsne\\_svizne](http://www.math.muni.cz/Matematika_drsne_svizne)
- Marie Budíková, Štěpán Mikoláš, Pavel Osecký, Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika (sbírka příkladů), Masarykova univerzita, 3. vydání, 2004, 117 stran, ISBN 80-210-3313-4.
- Marie Budíková, Tomáš Lerch, Štěpán Mikoláš, Základní statistické metody, Masarykova univerzita, 2005, 170 stran, ISBN 80-210-3886-1.
- Riley, K.F., Hobson, M.P., Bence, S.J. Mathematical Methods for Physics and Engineering, second edition, Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0 521 89067 5, xxiii + 1232 pp.

# Střední hodnota

Nechť  $X$  je náhodná veličina s diskrétním rozdělením. Jestliže řada  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k P(X = x_k)$  konverguje absolutně (zejména tedy pro všechny  $X$  s konečně mnoha možnými hodnotami  $x_k$ ), pak její součet  $EX$  nazýváme **střední hodnotou**  $X$ .

Je-li  $X$  náhodná veličina se spojitým rozdělením s hustotou  $f(x)$  a nevlastní integrál  $\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$  konverguje absolutně, pak jeho hodnota  $EX$  se nazývá **střední hodnota**  $X$ .

Je tedy  $EX = np$ , je-li  $X \sim \text{Bi}(n, p)$ , zatímco pro rovnoměrné rozdělení na intervalu  $(a, b)$  dostaneme dle očekávání

$$EX = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{2} \frac{b^2 - a^2}{b-a} = \frac{1}{2}(a+b).$$

# Vlastnosti střední hodnoty

## Theorem

*Uvažme náhodné veličiny  $X, Y$ , skaláry  $a, b \in \mathbb{R}$ , náhodný vektor  $W = (X_1, \dots, X_n)$  a čtvercovou skalární matici  $B$  s  $n$  řádky.*

- *Pro konstantní náhodnou veličinu  $X = a \in \mathbb{R}$  je  $E a = a$ .*
- $E(a + bX) = a + b E X$ .
- $E(X + Y) = E X + E Y$ .
- $E(a + BW) = a + B(E W)$ .

## Theorem

*Jsou-li veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé, pak  $E(XY) = E X E Y$ .*

# Rozptyl

Další charakteristika popisuje, jak moc se dá čekat, že se hodnoty náhodné veličiny „hemží“ kolem nějaké hodnoty.

## Definition

Nechť  $X$  je náhodná veličina s konečnou střední hodnotou. Pak definujeme **rozptyl** veličiny  $X$  výrazem

$$\text{var } X = E(X - E X)^2,$$

pokud taková konečná hodnota existuje.

Odmocnina z rozptylu  $\sqrt{\text{var } X}$  se nazývá **směrodatná odchylna** náhodné veličiny  $X$ .

Jde o zjevnou obdobu definice kvadrátu vzdálenosti vektorů nebo funkcí. Zachycujeme tak „očekávanou vzdálenost“ hodnot  $X$  od její střední hodnoty.

## Theorem

*Jestliže má náhodná veličina  $X$  konečný rozptyl, pro libovolné skaláry  $a, b \in \mathbb{R}$  platí*

- $\text{var } X = E X^2 - (E X)^2$
- $\text{var}(a + bX) = b^2 \text{var } X$
- $\sqrt{\text{var}(a + bX)} = |b| \sqrt{\text{var } X}$ .

Občas přiřazujeme k  $X$  **normovanou** veličinu  $Z$ ,

$$Z = \frac{X - E X}{\sqrt{\text{var } X}},$$

kteřá má zjevně nulovou střední hodnotu a jednotkový rozptyl.

Normální rozdělení  $Z$  má hustotu  $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$  distribuční funkci  $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ .  
Náhodná veličina  $Y = \mu + \sigma Z$ ,  $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$  má distribuční funkci

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\frac{y-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\
 &\quad \{\text{substituce } x = \mu + \sigma z\} \\
 &= \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx
 \end{aligned}$$

Takové rozdělení je *normální*, píšeme  $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ .  
Parametry odpovídají střední hodnotě a rozptylu.



Uvažme  $Z \sim N(0, 1)$  a podívejme se na náhodnou veličinu  $X = Z^2$ .

$$\begin{aligned}F_X(x) &= P[Z^2 < x] \\&= \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\&= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^{-1/2} e^{-t/2} dt\end{aligned}$$

s hustotou

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} t^{-1/2} e^{-t/2}.$$

Říkáme mu rozdělení  $\chi^2$ , píšeme  $X \sim \chi^2(1)$ .

# kvantilová funkce

Je-li  $F(x)$  distribuční funkce náhodné veličiny  $X$ , pak

$$F^{-1}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R}; F(x) \geq u\}, \quad 0 < u < 1$$

je kvantilová funkce náhodné veličiny  $X$ .

Hodnota  $F^{-1}(\alpha)$  se nazývá  $\alpha$ -kvantil.

Tzv. kritické hodnoty pro veličinu  $X$  jsou pak  $F^{-1}(1 - \alpha)$ .

# Čebyševova nerovnost

## Theorem

*Má-li  $X$  rozptyl a  $\epsilon > 0$  je libovolné, pak platí*

$$P(|X - EX| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{var } X}{\epsilon^2}.$$

# Kovariance veličin

Jsou-li  $X$  a  $Y$  dvě náhodné veličiny, pro které existují jejich konečné rozptyly, pak definujeme jejich **kovarianci** vztahem

$$\text{cov}(X, Y) = E(X - E X)(Y - E Y).$$

Evidentně je  $\text{cov}(X, X) = \text{var } X$  a  $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$ .

## Theorem

*Nechť existují konečné rozptyly veličin  $X$  a  $Y$ . Pak*

- $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - (E X)(E Y)$
- *pro jakékoliv skaláry  $a, b, c, d$  platí*  
 $\text{cov}(a + bX, c + dY) = bd \text{cov}(X, Y)$
- $\text{var}(X + Y) = \text{var } X + \text{var } Y + 2 \text{cov}(X, Y)$ .

Od kovariance snadno odvodíme tzv. **korelační koeficient** dvou náhodných veličin  $X$  a  $Y$ . Definujeme jej jako kovarianci příslušných normovaných veličin:

$$\rho_{X,Y} = \text{cov} \left( \frac{X - EX}{\sqrt{\text{var } X}}, \frac{Y - EY}{\sqrt{\text{var } Y}} \right) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var } X \text{ var } Y}}.$$

### Theorem

- $\rho_{a+bX, c+dY} = \text{sign}(bd)\rho_{X,Y}$ , pro  $bd \neq 0$
- $\rho_{X,X} = 1$
- $\rho_{X,Y} = 0$ , pokud jsou veličiny  $X$  a  $Y$  nezávislé.
- pokud je  $\rho_{X,Y}$  definován, pak je v absolutní hodnotě roven jedné právě, když existují konstanty  $a, b, c$  tak, že  $P(aX + bY = c) = 1$ .

# Varianční matice

Uvažme náhodný vektor  $W = (X_1, \dots, X_n)$  takový, že pro všechny jeho komponenty existuje rozptyl. Pak **varianční matice**  $\text{var } W$  je dána

$$\text{var } W = \begin{pmatrix} \text{var } X_1 & \text{cov}(X_1, X_2) & \dots & \text{cov}(X_1, X_n) \\ \text{cov}(X_2, X_1) & \text{var } X_2 & \dots & \text{cov}(X_2, X_n) \\ & & \dots & \\ \text{cov}(X_n, X_1) & \text{cov}(X_n, X_2) & \dots & \text{var } X_n \end{pmatrix}.$$

## Theorem

*Pro náhodný vektor  $X$ , skaláry  $a$ , matice skalárů  $B$  platí*

$$\text{var}(a + BX) = B \text{var } XB^T.$$

# Momenty

Podobně jako rozptyl můžeme uvažovat výrazy vyšších řádů:

$$\mu'_k = E X^k, \quad \mu_k = E(X - E X)^k.$$

Nazýváme je  $k$ -tý moment a  $k$ -tý centrální moment náhodné veličiny  $X$ . Momenty lze všechny dostat jako koeficienty v mocninné řadě následujícím způsobem.

Pro volný reálný parametr  $t$  definujeme **momentovou vytvořující funkci** pro náhodnou veličinu  $X$  vztahem

$$M_X(t) = E e^{tX}.$$

Tato funkce (za docela rozumných předpokladů následující věty) zcela určuje náhodné veličiny a má řadu užitečných vlastností (tj. *stejná momentová funkce na nějakém netriviálním intervalu  $\implies$  stejná distribuční funkce*).

## Theorem

*Nechť  $X$  je náhodná veličina pro kterou na intervalu  $(-a, a)$  existuje její analytická momentová vytvořující funkce. Pak na tomto intervalu je  $M_X(t)$  dána absolutně konvergující řadou*

$$M_t(X) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} E X^k.$$

## Theorem

*Pro součet náhodných veličin platí:*

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t).$$



# Momentová vytvořující funkce pro $X \sim \text{Bi}(0, 1)$

Často je jednodušší počítat momenty z jejich vytvořující funkce než přímo.

Pro alternativní rozdělení náhodné veličiny  $Y \sim A(p)$  spočteme snadno

$$M_Y(t) = E e^{tY} = e^0(1 - p) + e^t p = p(e^t - 1) + 1.$$

Protože je binomické rozdělení  $X \sim \text{Bi}(n, p)$  dáno jako součet  $n$  alternativních rozdělení  $Y_i \sim A(p)$ , je zjevně v tomto případě

$$M(t) = M_X(t) = (p(e^t - 1) + 1)^n.$$

Obecně platí  $\mu'_k = \frac{d^k}{dt^k} M_X(t)|_{t=0}$ . Je tedy např. první moment binomického rozdělení skutečně  $np$  (první derivace  $M(t)$  v nule), což je střední hodnota. Druhý moment je  $np(1 - p)$ , čímž jsme ověřili výsledek pro rozptyl.

Momentová vytvořující funkce pro  $Z \sim N(0, 1)$ 

$$\begin{aligned}M_Z(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2) dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2 - 2tx + t^2 - t^2}{2}\right) dx \\&= \exp(t^2/2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-t)^2}{2}\right) dx \\&= \exp(t^2/2).\end{aligned}$$

(V předposledním řádku je integrálem dána pravděpodobnost jakékoliv hodnoty pro normální rozdělení, proto je to jednička.)

Derivováním:  $(M_Z)'(0) = 0$  a  $(M_Z)''(0) = (te^{t^2/2})'(0) = 1$ . Je tedy skutečně

$$EZ = 0, \quad \text{var } Z = 1.$$