


SPOJITÉ MODELY A STATISTIKA 2017  
Řešené příklady k 5. cvičení

**Příklad 11.** Spočítejte  $\iint_A x^3 y \, dx \, dy$ , kde  $A$  je plocha v 1. kvadrantu ohraničená grafy funkcí  $y = x$  a  $y = x^3$ .

*Řešení.* Nejprve si nakreslíme obrázek, abychom si uvědomili, který graf funkce je dole a který nahoře (případně vlevo vpravo pro integrování nejprve podle  $x$ ).




Vidíme tedy, že množinu můžeme zadat pro  $0 \leq x \leq 1$  funkcemi  $x^3 \leq y \leq x$ , případně pro  $0 \leq y \leq 1$  funkcemi  $y \leq x \leq \sqrt[3]{y}$ . Spočítáme tedy integrál oběma způsoby (popisu množiny  $A$ ).

$$\begin{aligned} \iint_A x^3 y \, dx \, dy &= \int_0^1 \left[ \int_{x^3}^x x^3 y \, dy \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[ x^3 \cdot \frac{y^2}{2} \right]_{x^3}^x dx = \int_0^1 \left( \frac{x^5}{2} - \frac{x^9}{2} \right) dx \\ &= \left[ \frac{x^6}{12} - \frac{x^{10}}{20} \right]_0^1 = \frac{1}{12} - \frac{1}{20} = \frac{5-3}{60} = \frac{1}{30} \\ \iint_A x^3 y \, dx \, dy &= \int_0^1 \left[ \int_y^{\sqrt[3]{y}} x^3 y \, dx \right] dy \\ &= \int_0^1 \left[ \frac{x^4}{4} \cdot y \right]_y^{\sqrt[3]{y}} dy = \int_0^1 \left( \frac{y^{\frac{7}{3}}}{4} - \frac{y^5}{4} \right) dy \\ &= \left[ \frac{y^{\frac{10}{3}}}{4 \cdot \frac{10}{3}} - \frac{y^6}{4 \cdot 6} \right]_0^1 = \frac{3}{40} - \frac{1}{24} = \frac{9-5}{120} = \frac{1}{30} \quad \triangle \end{aligned}$$

**Příklad.** Spočítejte  $\iint_B xy \, dx \, dy$ , kde  $B$  je zadaná nerovnostmi  $-1 \leq x \leq 1$  a  $|y| \leq |x|$ .

*Řešení.* Nakreslíme si obrázek.



Množina  $B$  je na obrázku oblast „tvaru motýlku“ ohraničený křivkami  $y = x$ ,  $y = -x$  pro  $x \in \langle -1, 1 \rangle$ . Na obrázku lze vidět, že přímka  $y = -x$  je nalevo nad  $y = x$ , ale napravo pod. Tudíž musíme integrál rozdělit na 2 integrály přes 2 množiny:

$$B_- = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, x \leq y \leq -x\}$$

$$B_+ = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -x \leq y \leq x\}.$$

Tedy počítejme

$$\iint_B xy \, dx \, dy = \iint_{B_-} xy \, dx \, dy + \iint_{B_+} xy \, dx \, dy$$

$$\begin{aligned} \iint_{B_-} xy^2 \, dx \, dy &= \int_{-1}^0 \left[ \int_x^{-x} xy^2 \, dy \right] dx \\ &= \int_{-1}^0 \left[ x \cdot \frac{y^3}{3} \right]_x^{-x} dx = \int_{-1}^0 \left( x \cdot \frac{(-x)^3}{3} - x \cdot \frac{x^3}{3} \right) dx \\ &= \int_{-1}^0 \left( -2 \cdot \frac{x^4}{3} \right) dx = \left[ \frac{-2}{3} \cdot \frac{x^5}{5} \right]_{-1}^0 = 0 - \frac{(-2) \cdot (-1)}{15} = \frac{-2}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iint_{B_+} xy^2 \, dx \, dy &= \int_0^1 \left[ \int_{-x}^x xy^2 \, dy \right] dx \\
&= \int_0^1 \left[ x \cdot \frac{y^3}{3} \right]_{-x}^x dx = \int_0^1 \left( x \cdot \frac{x^3}{3} - x \cdot \frac{(-x)^3}{3} \right) dx \\
&= \int_0^1 \left( 2 \cdot \frac{x^4}{3} \right) dx = \left[ \frac{2}{3} \cdot \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{2}{15}
\end{aligned}$$

Dohromady

$$\iint_B xy \, dx \, dy = \iint_{B_-} xy \, dx \, dy + \iint_{B_+} xy \, dx \, dy = \frac{-2}{15} + \frac{2}{15} = 0.$$

△