



**8.**

# **První pomoc**

*- INTOXIKACE*

**Kubíková, Zuchová a kol. 2008**

# Způsoby vzniku otrav a poleptání

- záměna lahví
- zvědavost dětí
- inhalační otravy (nátěry, výfukové plyny)
- houby
- sebevraždy
- zneužití léků

**!!! uchovat vzorek látky pro záchranou službu !!!**

# PREVENCE



Foto:Callan

# POLEPTÁNÍ KŮŽE

- neznámým prostředkem -> oplachovat dlouho studenou vodou, sterilní krytí
- proud směřovat mimo nezasažená místa

## **POZOR!!**


Vše s ohledem na vlastní bezpečnost

*- nedotknout se chemické látky*

# POLEPTÁNÍ OKA

- okamžité oplachování dlouho studenou vodou – min. 15 min.
- proud směřovat mimo nezasaženého oka
- neneutralizovat!!

**Otočit víčko - vápno !**



Obr: ISBN 80-85873-55-9

# POŽITÍ CHEMIKÁLIÍ

- bezprostředně po úraze vypít větší množství vody – min. 0,5 litru
- hospitalizace
- **nevyvolávat zvracení!!!**
- kontrola ZŽF



# OTRAVY

- **Fridex** – nemrznoucí směs do chladičů aut, smrtelná dávka 100ml, vstřebání i kůží!!

PP: tvrdý alkohol 40% a více – **rozumně!!!**

- **Houby** – bolesti břicha, poruchy vidění, slinění,...

PP: **vyvolat zvracení** (teplá slaná voda nebo mechanicky), zajistit žaludeční obsah

- **CO** – výfukové plyny, nedokonalé spalování (karma, kamna,...) -> zčervenání, bolesti hlavy, zvracení, .... až bezvědomí

PP: **technická PP, čerstvý vzduch**

- **Léky**

PP:

při pozření **vyvolat zvracení**; u bezvědomých zvracení nevyvolávat, sledovat vitální funkce  
transport do nemocnice vždy !

- **Alkohol**

PP:

**stabilizovaná poloha, zabránění vdechnutí zvratků,  
sledování vitálních funkcí**