



8. První pomoc

- INTOXIKACE

Mgr. Zdeňka Kubíková 4/2008
Použity pasáže z prezentace Bc. Barbory Zuchové 2007

Způsoby vzniku otrav a poleptání

- záměna lahví
- zvědavost dětí
- inhalační otravy (nátěry, výfukové plyny)
- houby
- sebevraždy
- zneužití léků

!!! uchovat vzorek látky pro záchrannou službu !!!

PREVENCE



Foto:Callan

POLEPTÁNÍ KŮŽE

- neznámým prostředkem -> oplachovat dlouho studenou vodou, sterilní krytí
- proud směřovat mimo nezasažená místa

POZOR!!


Vše s ohledem na vlastní bezpečnost

- nedotknout se chemické látky

POLEPTÁNÍ OKA

- okamžité oplachování dlouho studenou vodou – min. 15 min.
- proud směřovat mimo nezasaženého oka
- neneutralizovat!!

Otočit víčko - vápno !



Obr: ISBN 80-85873-55-9

POŽITÍ CHEMIKÁLIÍ

- bezprostředně po úraze vypít větší množství vody – min. 0,5 litru
- hospitalizace
- **nevyvolávat zvracení!!!**
- kontrola ZŽF



OTRAVY

- **Fridex** – nemrznoucí směs do chladičů aut, smrtelná dávka 100ml, vstřebání i kůží!!

PP: tvrdý alkohol 40% a více – **rozumně!!!**

- **Houby** – bolesti břicha, poruchy vidění, slinění,...

PP: **vyvolat zvracení** (teplá slaná voda nebo mechanicky), zajistit žaludeční obsah

- **CO** – výfukové plyny, nedokonalé spalování (karma, kamna,...) -> zčervenání, bolesti hlavy, zvracení, až bezvědomí

PP: **technická PP, čerstvý vzduch**

- **Léky**

PP:

při pozření **vyvolat zvracení**; u bezvědomých zvracení nevyvolávat, sledovat vitální funkce
transport do nemocnice vždy !

- **Alkohol**

PP:

**stabilizovaná poloha, zabránění vdechnutí zvratků,
sledování vitálních funkcí**