

První pomoc

poškození teplem

1. **Puchýře, které jsou typické pro druhý stupeň popálenin ošetříme**
 - a. překryjeme sterilním krytím
 - b. aplikací vhodné masti
 - c. propíchneme a dezinfikujeme

2. **Při rozsáhlé popálenině chladíme plochu maximálně**
 - a. do 5 % povrchu těla
 - b. do 20 % povrchu těla
 - c. okamžitě se snažíme chladit všechny popálené plochy

3. **Za velmi závažné u ročního dítěte považujeme popáleniny již na**
 - a. na 2 % povrchu těla
 - b. na 10 % povrchu těla
 - c. na 70 % povrchu těla

4. **První pomoc při úžehu**
 - a. ihned odešleme postiženého koupat
 - b. uložíme do stínu, ochlazujeme a podáváme vlažné nápoje
 - c. přeneseme do místnosti, tekutiny zásadně nepodáváme

5. **U dospělých postižených se považují za závažné popáleniny, kdy je vždy potřeba volat ZZS a ochlazovat pouze plochu do 5 % povrchu těla**
 - a. nad 50 % povrchu těla
 - b. nad 5 % povrchu těla
 - c. nad 20 % povrchu těla

Řešení: a), a), a), b), c)