

A) 1) Meatus nasi inferior:

- a) je uložen mezi concha nasalis inferior a media
- b) vyúsťuje zde sinus maxillaris
- c) je uložen pod concha nasalis inferior
- d) vyúsťuje zde sinus frontalis
- e) žádné z výše uvedených tvrzení není správné

2) Pro plexus lumbalis platí:

- a) N. femoralis vstupuje na stehno skrze lacuna vasorum
- b) Větvi z plexus lumbalis, která sestupuje k mediálnímu kotníku je n. saphenus
- c) N. iliohypogastricus probíhá kaudálně od n. ilioinguinalis
- d) N. cutaneus femoris lateralis je senzitivní větvi větvi n. femoralis
- e) žádná z předchozích odpovědí není správná

3) N. medianus zásobuje motoricky:

- a) Zadní svaly pažní
- b) Přední svaly pažní
- c) Zadní svaly předloketní
- d) Všechny přední svaly předloketní
- e) žádná z předchozích odpovědí není správná

4) Pro bronchus principalis dexter platí:

- a) je delší a užší než bronchus principalis sinister
- b) je uložen šikmo od trachey
- c) je uložen téměř v přímém pokračování trachey
- d) někdy nebývá vytvořený
- e) žádná z předchozích odpovědí není správná

5) Articulatio cubiti se skládá z:

- a) articulatio humeroradialis, articulatio humeroulnaris a articulatio radioulnaris distalis
- b) articulatio humeroradialis, articulatio humeroulnaris a membrana interossea antebrachii
- c) articulatio humeroradialis, articulatio humeroulnaris a articulatio radioulnaris proximalis

- d) articulatio humeroradialis, articulatio humeroulnaris a membrana interossea cruris
- e) žádná z předchozích odpovědí není správná

6) O hrtanu (larynx) platí:

- a) je vazivový orgán
- b) leží před hltanem
- c) patří mezi horní cesty dýchací
- d) sahá od C1 po C6 obratel
- e) kaudálně navazuje na bronchi principales

7) Platí, že:

- a) truncus intestinalis vzniká z eferentních větvi mízních uzlin uložených kolem nepárových větvi aorta abdominalis (nodi lymphatici coeliaci)
- b) za úhlem dolní čelisti leží uzlina (Woodova), která sbírá mízu z tonsilla palatina
- c) míza vzniká z tkáňového moku
- d) v. mesenterica inferior se vlévá do v. portae (nebo do v. mesenterica superior)
- e) všechna tvrzení jsou správná

8) Platí, že:

- a) Kompletní mléčný chrup má 24 zubů
- b) Kompletní permanentní chrup má v jednom kvadrantu 2 řezáky, 1 špičák a 3 stoličky
- c) Zubní cement pokrývá kořen zubu
- d) Z permanentního chrupu se prořezává nejdříve špičák nebo první stolička
- e) Žádné z předchozích tvrzení není správné

9) Neplatí, že:

- a) n. fibularis superficialis inervuje krátké extenzory na dorsum pedis
- b) n. fibularis profundus zásobuje kůži na přivrácených stranách palce a druhého prstu
- c) m. adductor hallucis je inervován z n. plantaris lateralis
- d) a. plantaris medialis je slabší než a. plantaris lateralis

e) pod retinaculum extensorum superius probíhá šlacha m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus a m. extensor digitorum longus

10) Platí, že:

- a) Do podkoží regio deltoidea dosahují nn. supraclaviculares z plexus cervicalis
- b) Kůže v regio brachialis anterior je slabší než v regio brachialis posterior
- c) n. intercostobrachiales jsou spojky mezi n. cutaneus brachii medialis a 2.-3. n. intercostalis
- d) přes spodinu fossa cubiti prochází úponová šlacha m. brachialis
- e) všechna tvrzení jsou správná

11) Platí, že:

- a) a. femoralis je pokračováním a. iliaca interna
- b) a. femoralis je pokračováním a. iliaca externa
- c) a. femoralis doprovází n. ischiadicus
- d) a. iliaca externa zásobuje orgány malé pánve
- e) žádné z předchozích tvrzení není správné

12) Platí, že:

- a) srdce je uloženo v předním mediastinu
- b) fossa ovalis se nachází na laterální stěně atrium dextrum
- c) nodus sinuatrialis se nachází na septum interatriale
- d) levá srdeční komora má m. papillaris anterior a posterior
- e) všechny odpovědi jsou správné

13) Neplatí, že:

- a) v. brachiocephalica vzniká soutokem v. jugularis interna a v. subclavia
- b) v. cava superior vzniká soutokem vv. brachiocephalicae
- c) v. cava superior se vlévá do atrium dextrum
- d) v. jugularis interna je pokračováním sinus sigmoideus

e) v. cava superior prochází skrze foramen jugulare

14) Platí, že:

- a) Fundus uteri vyčnívá zčásti do vaginy (portio vaginalis).
- b) Zadní plocha dělohy se obrací k močovému měchýři.
- c) U nullipary rozlišujeme na ostium uteri děložního krčku labium anterius a posterius.
- d) Cavitas uteri je štěrbinovitý prostor trojúhelníkovitého tvaru.
- e) Všechna tvrzení jsou správná.

15) Platí, že:

- a) na stavbě spodiny čtvrté mozkové komory se podílí pons Varoli a střední mozek
- b) bazální ganglia jsou typicky senzitivní jádra
- c) thalamus je součástí mezimozku (diencephalon)
- d) v thalamu se přepojují přímé a nepřímé motorické dráhy
- e) žádné z předešlých tvrzení není správné