

PŘÍJMENÍ, JMÉNO:

Zakroužkujte 1 správnou odpověď.

Úspěšně složený test = minimálně 20 správných odpovědí.

1.) Mezi pomocné vyšetřovací metody v oboru ortopedie patří:

- a) Ultrazvuk
- b) CT
- c) RTG
- d) MRI
- e) všechny odpovědi jsou správné

2.) Punkce kloubu:

- a) se provádí pouze u dětí
- b) je základní vyšetřovací metodou v oboru ortopedie
- c) lze využít pouze u endoprotéz velkých kloubů
- d) není v repertoáru ortopeda

3.) Noční klidové bolesti jsou podezřelé z:

- a) artrotické degenerace
- b) zánětu
- c) nádoru
- d) úrazu

4.) Infekce kloubu se léčí:

- a) punkcí kloubu, imobilizací a antibiotiky
- b) léky proti zánětu
- c) aplikací kortikoidu do kloubu
- d) pouze se sleduje

5.) Osteotomie:

- a) se v ortopedické praxi již nevyužívá
- b) se může použít pouze u rostoucího organismu
- c) je jednou z metod léčby korekce osy končetiny
- d) žádná odpověď není správná

6.) Artróza je:

- a) nezářlivé degenerativní kloubní onemocnění charakterizované nadměrným opotřebením kloubní chrupavky, subchondrální sklerózou, tvorbou osteofytů a změnami měkkých tkání, které zahrnují synoviální membránu, kloubní pouzdro, kloubní vazy i svaly
- b) Infekce v kloubu
- c) poškození pouze kloubní chrupavky
- d) prořídnutí kostí

7.) Totální endoprotéza kloubu může být:

- a) cementovaná
- b) necementovaná
- c) hybridní
- d) všechny odpovědi jsou správné

8.) Pacient po implantaci necementované TEP kloubu na dolní končetině zpravidla nesmí došlapovat na končetinu:

- a) 6-8 týdnů
- b) 14 dní
- c) 6 měsíců
- d) může došlapovat ihned po operaci

9.) Impigement syndrom v oblasti ramenního kloubu nejprve léčíme:

- a) artroskopií ramena
- b) opichem SA prostoru kortikoidem, aplikací protizánětlivých léků a rehabilitací
- c) odesíláme k neurologovi
- d) léčíme pouze v akutním stádiu

10.) Disekující osteochondróza je onemocnění:

- a) kloubní chrupavky a přilehlé kosti kloubu
- b) dětí i dospělých
- c) vznikající nejčastěji na podkladě sníženého prokrvení kostní tkáně pod chrupavkou
- d) všechny odpovědi jsou správné

11.) Probatorní excize je výkon prováděný při:

- a) náhradě předního zkříženého vazů kolena
- b) implantaci TEP
- c) artroskopii hlezna
- d) určení typu nádoru

12.) Morbus Perthes:

- a) je onemocnění kyčelního kloubů dětí mezi 2-10. rokem věku nejčastěji
- b) je nekróza v oblasti hlavičky femuru u dětí
- c) léčí se častokrát osteotomií femuru či acetabula
- d) všechny odpovědi jsou správné

13.) Úžinový syndrom:

- a) vzniká průchodem nervu anatomicky tuhými a úzkými průchody
- b) je v praxi nejčastěji syndrom karpálního tunelu
- c) je dovyšetřován za pomoci EMG
- d) všechny odpovědi jsou správné

14.) Při léčbě osteoporózy doporučujeme:

- a) dostatek pohybu, vitamínu D a vápníku
- b) pouze bisfosfonáty
- c) klidový režim
- d) analgetika

15.) Léčba skoliózy nad 40 stupňů Cobbova úhlu je:

- a) konzervativní ortézou
- b) konzervativní cvičením
- c) operační

d) neléčí se

16.) Ruptura rotátorové manžety ramena vzniká nejčastěji na podkladě:

- a) úrazového děje
- b) na podkladě degenerace a přetížení při opakovaných pohybech v ramenním kloubu
- c) infekčního onemocnění
- d) neuromuskulárního onemocnění

17.) Rhizarthrosis je:

- a) infekce základního kloubu palce ruky
- b) léčena vždy pouze konzervativně opichem kortikoidu
- c) bolestivost kořene nosu
- d) artróza v základním kloubu palce ruky léčena nejprve konzervativně s následnou možností operace

18.) Při poranění menisku se snažíme:

- a) vždy o jeho odstranění v celé šíři a délce
- b) o zachování co největší porce menisku
- c) sešít i tzv. white zóně
- d) všechny odpovědi jsou správné

19.) Artrodéza je výkon:

- a) již nevyužívaný
- b) použitelný pouze u mladých osob
- c) výkon využívaný častokrát po infekci TEP kolena
- d) žádná odpověď není správná

20.) Při implantaci TEP kyčelního kloubu je zásadní:

- a) délka končetiny
- b) stabilita kloubu

- c) rozsah pohybu v kloubu
- d) doba operace

Počet správných odpovědí: