


FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE


**disciplína zabývající se
vlivem tělesné zátěže na
stavbu a funkci lidského těla**




myofibrila

**svalové vlákno
= buňka**


svazek vláken




sarkomera
pruh H
pruh I
pruh A
linie Z




Spojení aktin-myozin



Klouzavý pohyb




Odpojení hlavic




Narovnání hlavic


**spojení
aktin-myozin**




**klouzavý
pohyb**




**odpojení
hlavic**



**narovnání
hlavic**







MOTORICKÁ PLOTÉNKA *(synapse)*

přenos vzruchu
motoneuronu na
svalové vlákno

MOTORICKÁ JEDNOTKA

počet vláken
inervovaných jedním
motoneuronem





Vlastnosti

EXCITABILITA - schopnost svalu odpovědět na stimulus vytvořením a vedením akčního potenciálu

KONTRAKTILITA - schopnost svalu se stahovat a vyvíjet napětí za současného výdeje energie

EXTENSIBILITA - schopnost svalu být natažen

ELASTICITA - schopnost svalu se vrátit do klidové délky bud' po natažení nebo zkrácení

METABOLISMUS

Souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu a které slouží k tvorbě látek potřebných pro činnost organismu

KATABOLISMUS

rozklad látek za současného uvolnění energie

ANABOLISMUS

tvorba látek za současné spotřeby energie

ENERGETICKÝ METABOLISMUS

VYSOKOENERGETICKÉ FOSFÁTOVÉ SLOUČENINY

7 300 kalorií
30,6 kJ

ATP: adenosin - PO₃ ~ PO₃ ~ PO₃⁻

10 300 kalorií
43 kJ

CrP: kreatin ↪ PO₃⁻

ATP-----ADP+P+energie pro svalový stah

ZÁKLADNÍ ŽIVINY

cukry
(glukoza)

tuky
*(glycerol,
volné mastné kyseliny)*

bílkoviny
(aminokyseliny)

DEPOTA ŽIVIN

glykogen → játra, svaly

neutrální lipidy → tuková tkáň

(bílkoviny → játra, svalovina, slezina)


GLUKONEOGENEZE

- laktát
- pyruvát
- aminokyseliny


METABOLISMUS SVALU

- restituce ATP

MYOKINÁZOVÁ REAKCE



LOHMANNOVA REAKCE




GLYKOLYTICKÁ FOSFORYLACE (anaerobní)

Při odbourávání glukózy bez spotřeby kyslíku je uvolněna energie
glukóza \longrightarrow laktát + 2 ATP

OXIDAČNÍ FOSFORYLACE (aerobní)

Při odbourávání látok (*glukóza, laktát, volné mastné kys., aminokyseliny*) za přítomnosti kyslíku je uvolněna energie
glukóza + 6 O₂ \longrightarrow 6 CO₂ + 6 H₂O + 38 ATP



Transportní systém

VENTILACE

$$V_T = V_A + V_D$$

$$F_{IO_2} - F_{EO_2}$$

$$\dot{V}_E = V_T \cdot f_B$$

$$\dot{V}_A : \dot{Q}_C$$

DIFUZE

$$\dot{V}_{O_2} = D_{LO_2} (P_{AO_2} - P_{vO_2})$$

CIRKULACE

$$\dot{V}_{O_2} = \dot{Q} (C_{AO_2} - C_{vO_2})$$

$$\dot{V}_{CO_2} = \dot{Q} (C_{vCO_2} - C_{AO_2})$$

KREV

$$S_{AO_2} \quad S_{vO_2}$$

$$S_{vCO_2} \quad S_{AO_2}$$


DIFUZE

$$\dot{V}_{O_2} = D_{tO_2} (P_{eO_2} - P_{tO_2})$$

$$\dot{V}_{CO_2} = D_{tCO_2} (P_{tCO_2} - P_{eCO_2})$$

METABOLIZMUS

$$\frac{\dot{Q}_{O_2}}{LA} \quad PY \quad \frac{\dot{Q}_{CO_2}}{E}$$



ENERGETICKÉ ZÁSOBY SVALU

			<i>Tvorba ATP</i>
Kosterní svaly	ATP	10 kJ	<i>4,5 mol/min</i>
	CrP	30 kJ	<i>3,0 mol/min</i>
	Glykogen	6 600 kJ	
	-anaerobně	600 kJ	<i>2,0 mol/min</i>
	-aerobně	6 000 kJ	<i>0,75 mol/min</i>
	TAG	11 000 kJ	<i>0,4 mol/min</i>
	proteiny	160 000 kJ	<i>0,01 mol/min</i>
Krev	glukóza	300 kJ	<i>0,75 mol/min</i>
	NEMK	15 kJ	<i>0,4 mol/min</i>
	TAG	150 kJ	<i>0,1 mol/min</i>
Játra	glykogen	1 500 kJ	<i>0,75 mol/min</i>
Tuková tkáň	lipidy	560 000 kJ	<i>0,40 mol/min</i>

TYPOLOGIE SVALOVÝCH VLÁKEN

rezistentní k
unavitelnosti

červené vlákno

typ I.

pomalé oxidativní
vlákno
(SO)

rezistentní k
unavitelnosti

červené vlákno

typ II. A

rychlé oxidativně-
glykolytické vlákno
(FOG)

unavitelné

bílé vlákno

typ II. B

rychlé glykolytické
vlákno
(FG)


TYPOLOGIE SVALOVÝCH VLÁKEN

rezistentní k
unavitelnosti

červené vlákno

typ I.

pomalé oxidativní
vlákno




- vysoký obsah myoglobinu
- bohatá na mitochondrie
- *obsahuje meně glycogenů*
- obsahují více triacylglycerolů
- bohatá kapilární síť
- trvání kontrakce po impulsu až 100 ms

VYTRVALOSTNÍ ZÁTĚŽ

TYPOLOGIE SVALOVÝCH VLÁKEN

unavitelné



bílé vlákno


typ II. B

rychlé glykolytické
vlákno

- *nízký obsah myoglobinu*
- *nižší počet mitochondrií*
- *bohatá na glycogen*
- *nízký obsah triacylglycerolů*
- *řidší kapilární síť*
- *trvaní kontrakce po impulsu 10 - 40 ms*

RYCHLOSTNÍ ZÁTĚŽ

rychlé silové kontrakce nedlouhého trvání



Anaerobní alaktátová kapacita.....trvání zátěže.....10-15 s

Anaerobní laktátová kapacita.....trvání zátěže.....60-90 s

Aerobní kapacita.....trvání zátěže teoreticky neomezeně

DRUHY SVALOVÉ ČINNOSTI

ČINNOST STATICKÁ

převažuje svalová síla ve výdrži s *minimální změnou* svalové délky

ČINNOST DYNAMICKÁ

rytmické *střídání* kontrakce a relaxace se změnou svalové délky, s různou účasti svalového působení

DRUHY DYNAMICKE SVALOVÉ ČINNOSTI

ČINNOST SILOVÁ

pohybová činnost se zdůrazněnými *silovými* nároky, kdy trvání kontrakce je delší než trvání relaxace

ČINNOST RYCHLOSTNÍ

pohybová činnost s velmi *rychlým střídáním* kontrakcí a relaxací

ČINNOST OBRAVNOSTNÍ

pohybová činnost, kde je důležitá *jemná koordinace* svalové činnosti

ČINNOST VYTRVALOSTNÍ

pohybová činnost, kde se klade důraz na *dlouhodobou* svalovou činnost

	<i>Trvání výkonu</i>	<i>Využití substrátu</i>	<i>Tvorba kys. mléčné</i>	<i>Typy sval. vláken</i>
Rychlostní (maximální)	do 15s	ATP, CrP	střední	Převážně II B
Rychlostně - vytrvalostní (submaximální)	15s - 50s	ATP, CrP, glykogen (glykolýza)	max.	II B a II A
Vytrvalostní - krátkodobá	do 120s	glykogen (glykolýza a oxidace)	velmi vysoká	II B a II A
- střední	do 11 min	glykogen (oxidace)	střední - malá	II A
- dlouhodobá	nad 1 hod	glykogen, lipidy (oxidace), extracelulární zdroje	velmi malá	I A

STATICKÁ SVALOVÁ ČINNOST

kontrakce malé síly
do 15% max. kontrakční síly

→ převážně
oxidační fosforylace

kontrakce střední síly
15% - 60% max. kontrakční síly

→ ↓ oxidační fosforylace
↑ glykolytická fosforylace

kontrakce velké síly
nad 60% max. kontrakční síly



→ pouze
glykolytická fosforylace


1-RM- (one repetition maximum) metoda „jednou opakovatelného maxima“



maximální zátěž v kg,
kterou je jedinec
schopen pouze
jedenkrát u každého
cviku bez dopomoci
překonat

30-60% 1-RM





ANAEROBNÍ PRÁH

krátký úsek v průběhu stupňující se dynamické zátěže, kdy se k převážně aerobnímu krytí energetických požadavků organismu přidává způsob anaerobní




METABOLICKÁ ACIDÓZA:



- Vzestup a kumulace krevního laktátu
- Pokles pH krve
- Hyperventilace
- Pokles bikarbonátu
- INVAZIVNÍ
URČENÍ
ANAEROBNÍHO
PRAHU
 - „laktátový“
 - „-BE práh“

Důsledky rozvoje kompenzačních mechanismů:

- Zvýšení **VE/ VO₂** -ventilačního ekvivalentu pro kyslík (množství vzduchu proventilované plícemi v litrech z něhož si organismus odebere 1 l O₂)
- Zvýšení **RER**-poměru respirační výměny (poměr výdeje CO₂ k příjmu O₂)
- Zvýšení **VCO₂**-objem vydýchaného CO₂
- Zvýšení **PETO₂** -parciální tlak O₂ na konci výdechu.



KFDR LF MU
FNU SV. Anný Brno

RQ- při buněčném dýchání je spotřeba O_2 provázena produkcí CO_2 v poměru daném zastoupením energetických substrátů (CO_2 / O_2)

glycidy.....	RQ= 1,0
tuky.....	RQ= 0,7
bílkoviny.....	RQ= 0,8

RER-(respiratory exchange ratio) v rovnovážném stavu při aerobním krytí energie odpovídá RQ. Při překročení anaerobního prahu (zvýšená produkce CO_2 při neutralizaci kyseliny mléčné bikarbonátovým systémem) je $>R$ a při intenzitě zátěže blízké individuálnímu maximu >1

únava

Fyzická

Místní

Akutní

Fyziologická

Psychická

Celková

Chronická

Komplex dějů,
při kterém nastává
snížená odpověď
tkání buď na podněty stejné
intenzity
nebo nutnosti užití větší intenzity
podnětu při získání
odpovědi stejné
(pokles výkonu)

Patologická

Pomalu vznikající únava

Pokles resyntézy makroergních fosfátů pro

- kritický pokles zásobního glykogenu (za aerobních podmínek)
- inhibice mobilizace tukových rezerv zvýšenou hladinou laktátu (anaerobní podmínky)

(za dostatečného přísunu kyslíku a při průběžné dodávce cukrů může být jedinec bez poklesu výkonu teoreticky nekonečně dlouho-zásoby tuků jsou jednorázově nevyčerpatelné)

Základní metabolické příčiny únavy

1. Kritický pokles energetických rezerv
2. Nahromadění kyselých metabolitů

Druhy fyzické únavy

1. Pomalu vznikající únava
2. Rychle vznikající únava

Rychle vznikající únava

Pokles resyntézy makroergních fosfátů

- zvýšená produkce laktátu (za anaerobních podmínek)- acidóza- inhibice glykolytických enzymů
- H^+ hyperpolarizují membránu, vytěsňují Ca z vazby na myozin

(při přerušované zátěži s průběžným odplavováním metabolitů je limitujícím faktorem kritický pokles glycogenu---při vyčerpání i jaterního glycogenu hypoglykemie s narušením metabolismu CNS)

Pomalu vznikající únava

Pokles resyntézy makroergních fosfátů pro

- kritický pokles zásobního glykogenu (za aerobních podmínek)
- inhibice mobilizace tukových rezerv zvýšenou hladinou laktátu (anaerobní podmínky)

(za dostatečného přísunu kyslíku a při průběžné dodávce cukrů může být jedinec bez poklesu výkonu teoreticky nekonečně dlouho-zásoby tuků jsou jednorázově nevyčerpatelné

zotavení

Pasivní
odpočinek

Spánek

Masáže
koupele

Biologický proces obnovy
přechodného poklesu funkčních
schopností organismu

Aktivní
odpočinek

Kompenzační
cvičení

Cvičení ve vodě

Sauna

Doplňkové sporty

Zotavení z pomalu vznikající únavy (aerobního typu)

Trvá déle, měl by převládat pasivní odpočinek.

Resyntéza svalového glykogenu může trvat až 2 dny,
jaterního až 3 dny.....žádoucí vysoce glycidová dieta

Zotavení z rychle vznikající únavy (anaerobního typu)

Měla by převládat aktivní forma odpočinku - rychlejší
odstranění laktátu


obnova makroergních fosfátů2 min.....3 min
(ATP,CP)

obnova svalového glykogenu

po kontinuální zátěži.....10 h.....46 h
po intermitentní zátěži.....5 h.....24 h

odstranění laktátu

při aktivním odpočinku.....30min.....1 hod
při pasivním odpočinku.....1h.....2 hod



10% úhrada zásob kyslíku v krvi
 5% úhrada zásob kyslíku v myoglobinu
 15-20% resyntéza ATP a CP
 40% glukoneogeneze v játrech z laktátu

REAKCE A ADAPTACE

Reakce - bezprostřední odpověď na zevní podnět, vždy stejná, geneticky zakotvená

Adaptace - schopnost živé hmoty přizpůsobovat se různým vlivům prostředí při opakování stejných stimulů

- biologicky výhodné funkční změny organismu směřující k udržení homeostatické rovnováhy v daných podmínkách
- po oslabení podnětů postupně mizí

ADAPTAČNÍ SYNDROM

- soubor adaptačních mechanismů


1. Etapa - *poplachová reakce* - bezprostřední reakce při prvním setkání se stresorem, organismus reaguje nepřiměřeně, většinou ve větším rozsahu, než je účelné

2. Etapa - *stadium adaptace* - při opakováném působení stejného stresoru se reakce omezuje na systémy významné pro účelnou odpověď na danou situaci

3. Etapa - *stadium destrukce* - intenzívní působení stresoru za nepříznivých podmínek, nestačí-li organismus působení stresoru potlačit, nastupuje selhání a organismus hyne

ADAPTACE NA ZÁTĚŽ

ČINNOST SILOVÁ



hypertrofie vláken II B, \uparrow aktivita myokinázy

ČINNOST RYCHLOSTNÍ

\uparrow obsahu a utilizace ATP a CP, hypertrofie vláken II B

ČINNOST RYCHLOSTNĚ–VYTRVALOSTNÍ (~2min)

\uparrow aktivita glykolytického systému, \uparrow utilizace glycogenu,
 \uparrow pufrovací kapacity

ČINNOST VYTRVALOSTNÍ

\uparrow mitochondrií, \uparrow aktivita enzymů dýchacího řetězce,
 \uparrow kapilarizace, hypertrofie I, možná konverze z II \rightarrow I(?),
 \uparrow hladiny svalového glycogenu o 100%, \uparrow aktivita lipázy