

Specifické deficiece

Endemická struma
Nutriční anémie

Endemická struma

- Struma = zvětšení štítné žlázy
- Endemická = postiženo > 10% obyvatel dané oblasti
- Endemická struma - důsledek nejen deficitu jodu, ale i nadměrného přívodu strumigenů v potravě
- Jód - esenciální prvek, obsažen v hormonech št. žlázy (thyroxin T4 a trijódtyronin T3)
- Výskyt endemické stramy:
 - Oblasti bez deficitu jódu 2-5%, poměr ženy: muži 4-5:1
 - Země s deficitem jódu až 100% (země Jižní Am., Asie, Stř. Afriky)
 - S věkem stoupá
- Lidské tělo obsahuje 20 - 50mg jodu (8 mg ve št. žl)

- Kritéria pro hodnocení velikosti strumy dle WHO:

- 0 nezvětšená štítná žláza
 - 1 žláza je hmatná, ale není patrná při normální poloze hlavy
 - 2 štítná žláza je viditelná již při normální poloze hlavy
 - 3 velká žláza, kterou je vidět až na vzdálenost 10 metrů
- Posouzení dostatečného zásobování jódem - **jodurie** - $100\mu\text{g}$ jodu v 1 l ranní moči

Jódový deficit dle jodurie

Stupeň závažnosti	Jodurie v μg jodu/l moči
normální zásobení	> 100
novorozenci	> 70
lehký deficit	50 - 99
střední deficit	20 - 49
těžký deficit	19

Příznaky

- Hypotyreóza - ↑ únavy, spavost, zimomřivost, bledá, suchá kůže, suché vlasy, ztluštělé nehty, zácpa
- Těhotná žena + deficit jodu => poruchy vývoje plodu, potraty
- Vývoj dětí - oligofrenie (kreténismus), opožděný somatický vývoj, hluchota, poruchy sluchu, hluchoněmota
- Vyšší perinatální úmrtnost a nemocnost

Prevence

- Informovat veřejnost s důrazem na nejrizikovější skupiny o významnosti jodu a zdůraznit přirozené zdroje jodu
- Zvýšit konzumaci mořských ryb 1 - 2 x týdně (400 - 600g)
- Rozšíření a využívání potravin obohacených jodem - minerální vody, ovocné přesnídávky..
- Jodidace soli - jodičnan draselný 27mg/kg soli
- Jodové tablety v dávce 100mg/den (jodid 100) - u rizik. skupin - těhotné, kojící, adolescenti
- Obohacení kojenecké výživy jodem
- Zařadit jód do potravního řetězce - krmiva

RDA pro jód

Kategorie	Věk	Příjem jódu (μg)	Kategorie	Věk	Příjem jódu (μg)
kojenci	0,0-0,5	40	ženy	11,0 - 14,0	150
	0,5-1,0	50		15 - 18	150
děti	1,0-3,0	70	těhotné	19 - 24	150
	4,0 - 6,0	90		25 - 50	150
	7,0 - 10,0	120		51+	150
muži	11,0 - 14,0	150	kojící	175	
	15 - 18	150		1. - 6. měsíc	
	19 - 24	150		7. - 12. měsíc	200
	25 - 50	150			200
	51+	150			

Obsah jodu ve vybraných potravinách

Potravina	Obsah jodu µg/100g)
treska	120-243
brokolice	15
zelí	12
vepřová játra	14
vejce slepičí	9,7
chléb žitný	8,5
chléb bílý	5,8
mléko kravské	5,3-8,9
sýr eidam	5
brambory	3,8
jablka	1,6
pivo	0,7

Obsah jódu v některých potravinách obohacených jódem

Dětské piškoty plus s jahodovou příchutí obohacené jódem, minerály a vitaminy	50 mg/100 g
Vitajus, nealkoholický nápoj - malina, jahoda - obohaceno vápníkem a jódem	37,5 mg/100 ml
Ovocné přesnídávky obohacené jódem s černým rybízem, jablečná, s meruňkami, broskvemi, s karotkou a pomerančem	37 mg/100 g
Rejovit, sirup obohacený jódem - nápoj připravený ředěním 1:15	43,8 mg/100 ml
Danone Vitamilk - sušenky obohacené jódem, vápníkem, vitamínem B	54 mg/100 g
Gravimilk - sušený nápoj pro těhotné a kojící ženy obohacený jódem	100 mg/100 g

Nutriční anémie

- Anémie z nedostatku železa
- Anémie z nedostatku kyseliny listové a kobalaminu (vit. B₁₂)

Anémie z nedostatku železa

- **Hemosiderická anémie** - erytrocyty mají nedostatek krev. barviva (Hb) => mikrocytóza, nestejné tvary a barvy =

hypochromní mikrocytární anémie

Železo - součástí Hb a Myoglobinu


- přenos kyslíku
- transport elektronů v dýchacím řetězci
- součástí enzymů (oxidace, redukce)

Příčina: nedostatek železa v potravě (vyspělé země)

+ paraziti => drobné krvácení

(rozvojové země)

krevní ztráty: menorhagie u žen, krvácení do GIT traktu.....



Příčiny nedostatku železa v organismu

- Jeho nízký obsah ve stravě
- Špatné vstřebávání v GIT
- Vysoké ztráty v organismu spolu se ztrátou krve
- Těhotenství
- Během růstu dítěte, dospívání
- Opakované dárcovství krve

- Příznaky:
 - únava, malátnost, dušnost při námaze a bušení srdce, bledost kůže a sliznic,
 - vypadávání vlasů, angulární stomatitis,
 - chronická atrofie papil jazyka, koilonychie, u žen ještě větší menstruační krvácení
- Výskyt:
 - častěji ženy
 - děti v období růstu
 - druhá polovina těhotenství
 - vegani, striktní diety
 - Nižší hladina Fe doprovází infekční a nádorové onemocnění

Prevence

- Konzumace potravin bohatých na železo
- Doporučovaný příjem železa:
 - Kojenci 6 - 10 mg
 - Děti 10 mg
 - Dospělý 15 mg
 - Těhotné a kojící 20 mg
 - Lidé nad 60 let 12 mg
- Železo
 - **Hemové** - železo z potravin živočišného původu, využitelnost 10 - 30%
 - **Nehemové** - obsaženo v rostlinné potravě, ale i v živočišné, využitelnost 1 - 5%

Faktory ovlivňující vstřebávání Fe

- Využitelnost snižuje:

- vysoký příjem fosforu (tvorba solí pevně vázajících železo)
- vysoký přívod šťavelanů (špenát, rebarbora, čaj, kakao)
- vysoký přívod celulózy (např. celozrnné výrobky)
- vysoký přívod kys. fytové (luštěniny, olejníny, cereálie)
- vysoký příjem kofeinu a silného čaje

- Využitelnost zvyšuje:

- vitamin C - silné redukční činidlo
- aminokyseliny a živočišné proteiny
- HCl
- cukry

Prevence

- Strava s nízkou využitelností železa
převaha obilovin, nedostatek masa, ryb a
potravin s vys. obsahem vit. C
- Strava s vysokou využitelností železa
dostatek masa, ryb, drůbeže a potravin s
vysokým obsahem vit. C

Obsah železa ve vybraných druzích potravin

Potraviny	mg/kg	Potraviny	mg/kg
Živočišné potraviny		Zelenina	
játrová paštika	110	špenát	30,9
telecí játra	87,9	rýže	29,2
hovězí játra	68,2	čočka	21
telecí kotleta	24	hrášek	14,7
svíčková	18,7	brambory	6
hovězí mleté maso	17,3	zelí	5,7
kuřecí maso tmavé	9,8	salát hlávkový	5,3
kuřecí maso bílé	7,9	rajčata	4,8
vejce	20,5	olivový olej	3,7
hovězí polévka	1,7		
Mléko a mléčné výrobky		Ryby a mořští živočichové	
mléko kravské	0,5	ústřice	67
jogurt	0,5	makrela	16,2
sýr - camembert	3,2	pstruh	14,9
čokoláda	10,7		

Anémie z nedostatku kys. listové a vitaminu B12

- Megaloblastická (perniciózní) anémie - dostatek Hb, větší a nezralé krvinky =


ortochromní makrocytární anémie

- Výskyt:
 - Méně častěji než z deficitu železa
 - Striktní vegetariáni
 - Těhotné a kojící ženy
 - Podvýživa
 - Alkoholici, resekce žaludku, malabsorpce

- Příčina:
 - Nedostatek kys. listové a vit. B12 ve stravě
 - Jejich narušené vstřebávání - např. po resekci ilea
 - Nedostatek vnitřního faktoru

Metabolismus kyseliny listové

- Kyselina listová => redukce na dihydrofolát => redukce na na účinnou formu tetrahydrofolát
- Kumulace v játrech (zásobní 5-metyl-tetrahydrofolátt-zásoby na 3 roky)
- Pokud chce tělo využít tyto zásoby - za pomoci vit. B12 odtržení jednouhlíkatého zbytku od 5-metyl-tetrahydrofolátu => uvolnění účinného tetrahydrofolátu



■ Příznaky:

- Bledost se subikterickým nádechem (zvýšený bilirubin)
- Glositis na špičce a po stranách jazyka
- Neuropatie z nedostatku vit. B12 - mrtvění, pocit chladu v končetinách, motorická slabost, nejistá chůze

■ Prevence:

- Strava bohatá na vit. B12 (2-4 μ g/d) a kyselinu listovou (200-400 μ g/d)
- Hlavní zdroje vit. B12 - pouze živočišné zdroje - játra, ryby, vejce, mléko
- Hlavní zdroje kys. listové - listová zelenina (hrášek, brokolice, chřest, růžičková kapusta, špenát, hlávkový salát, kapusta), maso a vnitřnosti (játra, ledviny), luštěniny, burské oříšky, vejce a celozrnné výrobky

Obsah vitaminu B12 v některých složkách potravy (orientační hodnoty):

Játra hovězí, vařená 100 g	70,55 µg
Hovězí maso, vařené 100 g	2,47 µg
Treska (vařená) 100 g	1,41 µg
Mléko, 1 hrnek	0,9 µg
Jogurt 150 ml	0,59 µg
Vejce, 1 velké	0,5 µg
Sýr čedar 100 mg	0,71 µg

Obsah kyseliny listové v některých složkách potravy

(orientační hodnoty):

Játra hovězí, vařená 100 g	217,5 µg
Špenát (vařený) 1/2 hrnku	131 µg
Chřest (vařený) 1/2 hrnku	131 µg
Pomerančová šťáva 100 ml	48,2 µg
Čočka (vařená) 1/2 hrnku	179 µg
Banán, středně velký	20 µg
Celozrnný chléb, 1 plátek	15 µg

$400\mu\text{g} = 10\text{g pšeničných klíčků} + 200\text{g celozrnného chleba} + 50\text{ g kuřecích jater} + 100\text{g pórku}$