

Respirační fyzioterapie:

Úvod

- dýchání se účastní (aktivně/pasivně): bránice a další vdechové a výdechové svaly (hlavní a pomocné), vlastní plicní tkáň, pohyby hrudníku (Th obratle, žebra, sternum)
- vdech je vždy aktivní děj (aktivita vdechových svalů), výdech převážně pasivní děj (dán elasticitou měkkých tkání hrudníku a plic)
- dýchání je řízeno autonomními nervovými centry v prodloužené míše, veget. nervstvem, současně je možné ovlivnit vlastní vůl (zrychlit dýchání, zadržet dech, prohloubit dech)
- pohybová soustava dýchání umožňuje a současně dýchání ovlivňuje pohybovou soustavu
- hlavní dýchací sval = bránice – kontrakce při vdechu - inspirace (posunuje se kaudálně), relaxace při výdechu (pohybuje se kranialně), pracuje v kokontrakci s břišní svalovinou, bránice rozšiřuje hrudník ve směru vertikálním
- dýchací svaly mají kromě jejich hlavní funkce = zajištění dýchacích pohybů, také funkce dynamické a posturální (= podílejí se na pohybech HKK, trupu a zajišťují posturu)

Respirační fyzioterapie (RFT)

- je systém dechové rehabilitace, při kterém mají specificky provedené postupy přímý léčebný význam a současně plní funkci sekundární prevence.
- terapeutické působení na dechové problémy nemocného formou modifikovaného dýchání s přihlédnutím k individuálním možnostem pacienta
- fyzioterapeut je zodpovědný za sestavení adekvátního plánu a cvičebních postup RFT
- účinné techniky modifikovaného dýchání pomáhají řešit dechovou symptomatologii, především dušnost, kašel, hyperprodukci bronchiální sekrece
- metody RFT zaměřeny na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, ventilačních parametrů, na prevenci zhoršování funkce plic, zvýšení fyzické zdatnosti, dosažení a udržení optimálního pocitu zdraví
- jednotlivé dechové techniky, jejichž účinnost je prověřena EBM, lze aplikovat u nemocných všech věkových kategorií, a to formou individuální fyzioterapie nebo i skupinovým cvičením
- metody RFT jsou účinné jak u aktivně spolupracujících pacientů, tak také u nemocných, kteří nemohou nebo nejsou schopni spolupracovat, např. z důvodu vyčerpání, dezorientace nebo bezvědomí
- RFT v kombinaci s pohybovými aktivitami a sportem tvoří základy léčebné rehabilitace jedinců s onemocněním dýchacího i oběhového systému
- trénink dobré fyzické kondice je podmínění volnou průchodností dýchacích cest (fyzická zdatnost významně přispívá k lepšímu společenskému a pracovnímu uplatnění nemocných, ke zvýšení jejich sebevědomí a především ke zlepšení kvality života)

Indikace

- onemocnění respiračního systému (bronchiálního stromu, plicního parenchymu)
- onemocnění, při kterých dochází ke snížené plicní ventilaci (pooperační stavy, imobilizace)
- využíváme ji i všude tam, kde potřebujeme navodit správné dýchání, při relaxaci, zklidnění
- široké využití v oborech: chirurgie, traumatologie (JIP, ARO), interna, gynekologie, pediatrie atd.

Před zahájením RFT se přesvědčit o průchodnosti dýchacích cest (vykašlání, smrkání), zaujmout správnou výchozí polohu (správné držení těla), cvičíme nádech i výdech nosem, pouze v indikovaných a spec. případech dýcháme ústy, při cvičení nezadržujeme dech, nevelíme striktně nádech-výdech, pacienta se nedotýkáme, není-li to přímo cílem cvičení.

Dechové techniky jsou náročné na koncentraci jak fyzioterapeuta, tak především samotného pacienta, proto je nutné vkládat a důsledně dodržovat pauzy mezi jednotlivými cviky

Již se nepoužívají poklerové hmaty (vedou k přehnané bronchiální reaktivitě)!

Dýchání je prostředkem pro ovlivňování:

1. vlastních respiračních funkcí
2. pohybových funkcí hrudníku
3. tonus svalstva (nejen respiračního)
4. jiných autonomních funkcí
5. psychických funkcí

1. Ovlivnění respiračních funkcí

A. Základní dechová gymnastika

Statické dýchání

- zaměření na: přirozený způsob a rytmus dýchání, frekvence, hloubka, délka inspiria a expiria
- nácvik správného stereotypu dýchání = průběh dechové vlny: při inspiriu i expiriu vždy postupuje kraniálně (od břicha k hrudníku)

►►► Příklady cviků statického dýchání:

1. prohloubený nádech (na 3, 4 a postupně i více dob)
 - a. pomalý, prohloubený výdech
 - b. rychlý, krátký výdech
 - c. v pol. výdechu zadržení dechu
2. rychlý, krátký nádech a pomalý, prodloužený výdech
3. pomalý a plynulý nádech i výdech se zadržením dechu v různých fázích dech. cyklu (uprostřed nádechu/výdechu, mezi nádechem a výdechem – a to v různých kombinacích)
4. pomalý, plynulý nádech a výdech nárazovitě na hlásku „s“, „š“, „f“ apod.

Dynamické dýchání

- zaměření na: správnou koordinaci dýchání a pohybu těla, zlepšení pohyblivosti hrudníku
- dýchání spojeno s pohybem končetin a trupu
- platí, že při pohybu HKK směrem od těla = nádech, zpět = výdech

►►► Příklady cviků dynamického dýchání (pacient zaujímá polohu v sedu na židli bez opěradla):

1. zapažení obou HKK současně
2. upažení s rotací hlavy a pohledem do strany, střídat LHK a PHK
3. zvednout ramena, povolit ramena dolů
4. obě ruce pokrčit v loktech, prsty na ramena a zpět
5. obě ruce na ramena, zvedat lokty od těla (obměna: lokty dopředu a dozadu, popř. kroužky)
6. obě HKK natažené upažit současně s mírným hrudním záklonem a zpět připažit
7. upažením obě ruce za hlavu a zpět
8. obě ruce pokrčené a složené v týlu, pohyb loktů dozadu se současným záklonem v Th páteři a zpět lokty dopředu se současným předklonem
9. obě ruce v týlu, rotace trupu doprava a doleva
10. ruce v týlu, úklony doprava a doleva

B. Speciální dechová gymnastika

- procvičuje jednotlivé typy dýchání, hloubku dechu, využíváme různé dechové polohy
- a. **lokализované dýchání** – snaha o rozvinutí jednotlivých částí hrudníku, dýchání proti tlaku ruky fyzioterapeuta
- *lokализované horní hrudní dýchání* – pacient v lehu na zádech/v sedu s HKK volně podél těla nebo „ruce v bok“ – fyzioterapeut klade odpór pod klíčními kostmi nebo na sternum
- *lokализované dolní hrudní postranní dýchání* – pacient v lehu na zádech/v sedu s HKK ve výši hlavy (ruce sepnuté v týlu, popř. ve svícnu), odpór klademe na poslední 3-4 žebra z obou stran
- *lokализované zadní hrudní dýchání* – pacient v lehu na bříše/v sedu s mírným předklonem a oporou o HKK, odpór klademe vzadu na střední/dolní část hrudníku
- *lokализované jednostranné dýchání* – obdobně jako předchozí, pouze odpór klademe pouze na jedné straně hrudníku, cílem je zvýšení dechových exkurzí na postižené straně hrudníku, polohy pacienta při cvičení jsou možné: v lehu na zádech, na bříše, na boku zdravé strany,

- v sedu – často se přidává mírný úklon trupu směrem od postižené strany popř. různé polohy HK na postižené straně hrudníku (upažení, vzpažení apod.)
- *lokalizované břišní dýchání* – pacient v lehu na zádech, DKK v semiflexi v kolenou (pro uvolnění břišní stěny), odpor klademe v oblasti epigastria
 - b. **izolované dýchání** – hrudní/břišní dýchání
 - *hrudní dýchání* – objem hrudníku se zvětšuje převážně pohybem hrudní stěny
 - *brániční (břišní) dýchání* – objem hrudníku se příliš nemění, vyklenuje se a klesá břišní stěna
 - *cvičení přední části bránice* – pacient v poloze v lehu na břiše (v podporu klečmo), nádech spojen s uvolněním břišní stěny, výdech s kontrakcí břišní stěny
 - *cvičení zadní části bránice* – pacient v poloze na zádech – střídání kontrakce a relaxace břišních svalů jako v předchozím případě
 - *cvičení postranní části bránice* – pacient v lehu na boku (více se zapojí strana, na které leží)
 - c. **kombinované dýchání** – kombinace hrudního i břišního dýchání
 - d. **asistovaný výdech** – stlačení hrudníku při současném výdechu pacienta
 - e. **resistovaný výdech** – výdech proti odporu (sešpulenými rty, do balónku, do vody)
 - f. **péče o hygienu dýchacích cest** – nácvik kaše, vykašlávání, smrkání, s fixací rány, flutter
 - g. **polohová drenáž** – zaujetím spec. poloh těla umožníme odtok sekretu z bronchů do průdušnice

2. Ovlivnění pohybu hrudníku

Polohy těla a jejich vliv na dýchání

- Stoj – nejvhodnější poloha, hrudník a páteř volná všemi směry
- Sed (se spuštěnými běrci) – omezeno brániční dýchání (tlakem břišních orgánů)
- Leh na zádech - omezeno dýchání do zadní strany hrudníku, částečně i do stran, hrudník v inspiračním postavení, bránice tlačena břišními orgány výše
- Leh na břiše – je omezeno dýchání přední hrudní a částečně i do stran, bránice uložena výše, ztížen a omezen nádech
- Šikmé polohy – v lehu na zádech, břiše, bocích, slouží k polohování a drenáži plicních laloků
- Ruce v bok – zvýší se pohyblivost horní části hrudníku
- Ruce v týl – zvýší se pohyblivost dolní části hrudníku

Pro hrudník jako celek platí: extenze trupu s nádechem a flexe trupu s výdechem

Pro hrudní páteř samotnou platí opak: s nádechem se Th páteř zakřivuje, s výdechem oplošťuje

3. Vztah respirace a svalového napětí

Nádech – má pro většinu svalů facilitační charakter, toho využíváme při nácviku svalové síly

Výdech – má na většinu svalů inhibiční vliv, využíváme při relaxaci svalů

Výjimky: krční a horní hrudní segmenty páteře, erector bederní části páteře, žvýkací svaly

4. Ovlivnění dalších vegetativních funkcí

Tepová frekvence – periodicky s dechovým cyklem kolísá TF (tzv. respirační arytmie)

Mechanické ovlivnění nitrobřišních orgánů – význam pro správnou peristaltickou funkci GITu

Podpora žilního návratu – v závislosti na nasávací funkci podtlaku hrudníku

5. Ovlivnění psychických funkcí

Dýchání souvisí se stavem vědomí: spánek, zívání, pohotovost k učení

Dýchání využíváme k: nácvik relaxace, protistresová opatření, jógová cvičení

Holotropní dýchání: cílená hyperventilace s řízeným metabolickým rozvratem, vyvolávající poruchu vědomí, používá se v psychiatrii k ovlivnění psychiky

Poznámky:

Pickwickovský syndrom: hypoventilace u osob s nadměrnou obezitou – mechanické omezení dýchání spojené se zvýšením hladiny CO₂, která je příčinou nadměrné únavy, může dosáhnout narkotické hladiny

Paradoxní dýchání: nastává v situaci, kdy se hrudník v době nádechu nevyklenuje a naopak se propadá (je to patologické, např. víceetážové zlomeniny žeber)

Valsalvův pokus: vdech a zadržený usilovný výdech proti uzavřené glotis (= marné výdechové úsilí), dochází k zvýšení nitroplicního a nitrobřišního tlaku (= břišní lis) – projeví se tak posturální činnost dýchacího svalstva: bránice zpevní hrudník a celý trup (např. při defekaci, zvedání těžkého břemene, silových sportovních výkonech apod.), pozor u kardiáků: nutno minimalizovat činnosti spojené s prováděním tohoto manévrů (dochází současně ke zvyšování krevního TK a nebezpečí vzniku náhlých cévních příhod)