
Sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference

MUDr. Helena Reguli

Sexuální normalita

- Statistická – nejvíce se vyskytující
 - Biologická – dosažení cílu – reprodukce
 - Kulturní – akceptovaná danou kulturou
-

Kriteria sexuální normality - biologické


- Správná pohlavní identifikace
 - Heterosexuality
 - Dospělý objekt
 - Vzájemná dobrovolnost
 - Adekvátní technika (nepoškozuje zdraví)
-

Sexuální motivace - komponenty

- Sexuální identifikace (role)
 - Sexuální orientace (preference)
 - Sexuální emoce (sexuální vzrušení, orgasmus, zamilovanost)
 - Sexuální chování
-

Sexuální dysfunkce

- Sexuální apetence
 - Sexuální vzrušení
 - Orgasmus
-



Poruchy fází sexuálního vzrušení

- Primární
 - Sekundární

 - Selektivní
 - Generalizovaná

 - Organická
 - Psychogenní
 - Smíšená
-

Sexuální poruchy

- Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy (F 52.0)
 - Nejčastější sexuální dysfunkce u žen
 - V posledních letech přibývající výskyt u mužů
 - Primární – zřídka
 - Sekundární
 - Psychogenní
 - Organická
-

Sexuální poruchy

- **Nedostatečné prožívání sexuální slasti F 52.1 (odpor k sexu)**
 - Nízká sexuální vzrušivost (frigidita)
 - Prožívání úzkosti před stykem až vyhýbání se souloži
 - Prožívání pohlavního styku i orgasmu bez sexuálního vzrušení
-

Sexuální poruchy

- Selhání genitální odpovědi (F 52.2)
 - **dysfunkce erekce , tj. obtížné dosažení a udržení erekce potřebné pro uspokojivou soulož**
 - Psychogenní – zachovalá dobrá erekce při masturbaci
 - Organická – pooperační, poléková, nemoci cév a nervů
 - **suchost vagíny nebo neschopnost lubrikace**
 - Psychogenní
 - Infekční
 - Nedostatek estrogenů

Dysfunkční orgasmus (F 52.3)

- **vůbec nevyskytne, nebo je značně zpožděný**
 - Zranitelnější u žen
 - Selektivní
 - Vaginální
 - Masturbační (s partnerem, bez partnera)
-

Předčasná ejakulace (F 52.4)

- Neschopost dostatečně oddálit ejakulaci, aby mohlo dojít k uspokojení z pohlavného styku
 - Ejaculatio ante portas
 - Není způsobeno dlouhou dobou abstinence
 - Primární – nejčastější
 - Sekundární
 - při změně partnerky
 - infekce
-

Vaginismus (F 52.5)

- Křeč svalů pánevního dna, které obklopují vagínu, která brání zavedení penisu
 - Nejčastěji psychogenní původ
 - Může být sekundární reakcí při některé lokální příčině bolesti, traumatické události
-

Neorganická dyspareunie (F 52.6)

- Koitální dyskomfort nebo bolest (algopareunie) při pohlavním styku (frikčních pohybech)
 - Somatizace konfliktů (partnerských)
-

Hypersexualita (F 52.7)

- Nadměrná sexuální apetence a aktivita
 - Zvýšená erotická fantazie a podnikavost
 - Nepříjemně prožívána
 - U mužů i žen (satyriasis a nymphomanie)
 - Onanismus
 - Reaktivní stavy – obrana proti depresi, snižování psychického napětí
 - Pojem „závislost na sexu“
-

Poruchy pohlavní identity F 64

- ❑ F64.0 Transsexualismus
 - ❑ F64.1 Transvestitismus dvojí role
 - ❑ F64.2 Porucha pohlavní identity v dětství
 - ❑ F64.8 Jiné poruchy pohlavní identity
 - ❑ F64.9 Poruchy pohlavní identity, NS
-

Poruchy sexuální identifikace

■ Transexualismus:

- transexualita je inverzní sexuální identifikace
 - touha po změně pohlaví, negativní vztah k vlastnímu genitálu
 - výskyt – promile
 - léčba:
 - psychoterapie
 - změna tělesného vzhledu hormonální léčbou
 - změna matričního pohlaví
 - chirurgické výkony
-

Poruchy sexuální preference

■ F65 Poruchy sexuální preference

- F65.0 Fetišismus
 - F65.1 Fetišistický transvestitismus
 - F65.2 Exhibicionismus
 - F65.3 Voyerismus
 - F65.4 Pedofilie
 - F65.5 Sadomasochismus
 - F65.6 Mnohočetné poruchy sexuální preference
 - F65.8 Jiné poruchy sexuální preference
 - F65.9 Porucha sexuální preference nespecifikovaná
-

Poruchy sexuální preference (parafilie)

■ Fetišismus:

- ❑ erotický zájem subjektu je zaměřen pouze na určitý zástupný symbol sexuálního partnera, nebo na některou dílčí vlastnost; jindy je fetiš zcela bez vztahu k případnému erotickému objektu; raritní – exkrementologie, urofilie, myzofilie, pyrofilie, nekrofilie
- ❑ léčba:
 - psychoterapie
 - podávání antiandrogenů
 - antidepresiva

■ Fetišistický transvestitismus:

- ❑ převlékání a masturbace
-

Poruchy sexuální preference (parafilie)

■ Exhibicionismus:

- obnažování genitálu na veřejnosti
- léčba: psychoterapie; antiandrogeny, antidepresiva, lithium (k útlumu)

■ Voyerismus:

- subjekt se vzrušuje a ukájí tajným sledováním apetovaného objektu při intimních erotických i neerotických aktivitách

■ Pedofilie:

- sexuální orientace na prepubertální dětské objekty
 - průkaz - falopletyzmografie
 - léčba: farmakoterapie (tlumení sex. aktivity)
-

Poruchy sexuální preference (parafilie)

■ Sadomasochismus:

□ sadismus (algolagnie)

- záliba v násilí

- sadismus fetišistický, pseudopedagogický, agresivní

- léčba: psychoterapie, u potencionálně nebezpečného sexuálního agresora vždy sexuální útlum biologickou léčbou (antiandrogeny, analoga LH-RH, kastrace)

□ patologická sexuální agresivita

□ masochismus

- erotická fascinace agresivitou vůči své osobě (plísňení, tupení, komandování, ponižování, šikanování, bití, trýznění)

- asfyxiofilie („repetitivní erotické škrcení“)

■ Mnohočetné poruchy sexuální preference:

- nejčastěji kombinace dvou deviantních zájmů
-