





Kineziologie páteře




Mgr. Klára Vomáčková

Fyziologické rozsahy


Část těla/klob	Pohyb	Rozsah pohybu
Hlava a krk	flexe	60°
	extenze	75°
	sunutí hlavy horizontálně	
	lateroflexe	45°
	rotace	80°
Trup	ventrální flexe	45–50°
	dorzální flexe (extenze)	25°
	lateroflexe	25–30°
	rotace	30–45°
Lopatka	retrakce	25°
	protrakce	25°
	elevace	55°
	deprese	55°
	zevní rotace (anteverze)	60°
	vnitřní rotace (retroverze)	60°




Hyperextension




Rotation to right



Zatíží





Sagitální zakřivení

- a) 0 dní – kyfotická páteř do oblouku
- b) 5 měsíců
- c) 13 měsíců
- d) 3 roky
- e) 8 let (cca v 6 letech křivka ještě není fixovaná)
- f) 10 let

Figure 7





Figure 8

Páteř

- Páteř (columna vertebralis) tvoří osovou strukturu lidského těla
- Skládá se z 33–34 obratlů, 40% délky těla


Funkce:

- Ochrana míchy
- Umožňuje značnou pohyblivost i dostatečně tuhou oporu pro manipulační a lokomoční pohyby
- Vzhledem k esovitému zakřivení je schopna absorbovat určité množství deformační energie do svých jednotlivých složek, např. při skocích, nárážech, lokomoci



Dvojitá esovitá zakřivení

- Lordoza - oblouk dopředu
 - Krční s vrcholem C4-C5
 - Bederní s vrcholem L3-L4
- Kyfoza – oblouk dozadu
 - Hrudní s vrcholem Th6-Th7
 - Křížová kost
- Zakřivení = pružnost a pevnost
- **Až 17x pevnější** než kdyby byla páteř jeden oblouk!



Obratle

Oblouk obratle


- ochranná - protektivní funkce, a je místem začátku páteřních vazů (ligg. interarcualia), které dotvářejí a uzavírají páteřní kanál s míchou

Obratlové výběžky

- mají dvojí funkční uplatnění: processus articulares jsou kloubními konci meziobratlových kloubů; processus transversi a proc. spinosi slouží jako místa začátku vazů fixujících obratle, a svalů zajišťujících pohyblivost páteře


Obratlová těla

- jsou nosnými prvky páteře





Cervical



Thoracic







Lumbar



Mechanická odolnost

- **Kompaktní část obratle přenáší 45 – 75 %** vertikálního zatížení působícího na obratel
- Hlavní zatížení nesou masivní L obratle a těla horních Th obratlů.
- Obecně platí, že pevnost těla obratle je **5 až 7x větší** na tlak působící **v osovém směru**, než při tlaku působícím v bočním nebo předozadním směru
- Mechanická odolnost obratle závislá na "hustotě" obratlového těla -> redukce a přestavba spongiózy (při osteoporóze) výrazně snižují mechanickou odolnost.
- **Nejzatíženějším segmentem páteře je segment L₅/S₁**, kde se na malé styčné ploše koncentruje zatížení - hmotnost celé horní poloviny těla. Segment snáší asi 15 % deformaci a pevnost v tlaku dosahuje až 7 kPa.



Pasivní stabilitu segmentu zajišťují

- Kostí
- Klouby
- Intervertebrální disky
- Vazy
- Svaly




Figure 27





Figure 28

Dlouhá ligamenta

- *Přední podélný vaz, **lig. longitudinale anterius*** běží po přední ploše obratlových těl - od předního oblouku atlasu až na přední plochu křížové kosti. Přední podélný vaz svazuje a zpevňuje prakticky celou páteř. Napíná se při retroflexi (záklonu) a brání ventrálnímu vysunutí meziobratlové destičky.
- *Zadní podélný vaz, **lig. longitudinale posterius*** jde po přední stěně páteřního kanálu - od týlní kosti až na křížovou kost.




Ligamentum longitudinale posterius

Funkce:

- podobně jako přední vaz, zpevňuje páteř. Napíná se při anteflexi (předklonu) a brání dorsálnímu vysunutí meziobratlové destičky do páteřního kanálu.

!Celkově užší než lig. Longitudunale anterius. V bederním úseku páteře redukován na několik vazivových proužků - > zde jsou destičky nejčastěji postiženy chorobnými změnami a právě 62 % výhřezů destiček je lokalizováno v bederních segmentech páteře!



Spondylolýza a fraktura


Spondylolistéza a skluz



Posteriovní lig.


x

Anteriovní lig.



Krátká ligamenta



- **ligg. Flava, žluté vazy**, (ligg. interarcualia) spojují oblouky sousedních obratlů, uzavírající páteřní kanál a doplňující meziobratlové otvory. Žluté vazy stabilizují pohybové segmenty páteře při anteflexi (předklonu), kdy se upínají a svoji pružností umožňují opětný návrat segmentu do vzpřímené polohy.
- **Ligg. interspinalia** spojují trnové výběžky obratlů, "posturální vazy"
- **Ligg. Intertransversalia** spojující transverzální výběžky



- • *lig. longitudinale anterius*
- • *lig. longitudinale posterius*
- • *ligg. flava*
- • *ligg. Interspinalia*
- • *Lig. supraspinale*



Spojení obratlů

- Meziobratlové klouby
- Meziobratlové disky




Articulationes intervertebrales – facetové klouby

- Zajišťují především pohyb sousedních obratlů, menší podíl mají na nosnosti páteře.
- Synoviální klouby, pouzdra jsou volná.
- Synoviální výstelka kloubů tvoří prakticky ve všech kloubech drobné řasy (meniskoidy) vyrovnávající tvarové rozdíly kloubních ploch
- Tvar a sklon ploch – specifická pohyblivost daného úseku
- Sklon kloubních plošek od horizontální roviny je v **Cp** **45°**, **Thp** **60°**, **Lp** **90°**




1 osa otáčení v meziobratlovém kloubu
2 pružná funkce ploténky
3 pružná funkce vazů





Cervical



Thoracic






Lumbar







Meziobratlové disky

- 23 disků (první mezi C2/C3, poslední L5/S1)
- Tvoří až 25 % délky páteře (v závislosti na věku)
- Jejich výška roste kраниokaudálně
- Umožňují vzájemný pohyb obratlů
- Anulus fibrosus, nucleus pulposus




- Zatížení → vytlačování tkáňové tekutiny
- V odlehčení → chrupavka nasává tekutinu (hydoskopické polysacharidy chrupavky)
- Statické zatížení: prstence se napínají, uvnitř nestlačitelné jádro, ploténka se rovnoměrně oploštuje
- Dynamické zatížení: obratle se náklanění → chrupavka zatěžována nerovnoměrně, Jádro se pohybuje od stlačované strany ke straně natahované



Meziobratlové disky

- Tlumí nárazy, ochraňuje meziobratlové klouby, podílí se na pohyblivosti v segmentu
- Výrazně **větší odolnost vůči tlaku** než posunu a rotaci – tato vlastnost se zvyrazňuje s věkem
- Meziobratlové destičky jsou uspořádáním své vnitřní struktury odolné hlavně vůči vertikálně působícím silám, velmi **málo odolávají torzní síle** (bez poškození do 5°). Celý systém je maximálně namáhán při kombinaci axiálního tlaku a rotace.



člověk o váze 70 kg:

- při ležení = 25 kg
- při stání = 70 kg
- při sezení = 100 kg
- ! při předklonu = 250 kg !
- !! při předklonu s 50 kg břemenem = 800 kg !!
- Již prostý předklon o 15% = o 50% více práce, než ve vzpřímeném stání !!!



Text Neck Syndrome

Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head.
An increase in forward head position increases the weight on the cervical spine.

0°	15°	30°	45°	60°
12lb	27lb	40lb	49lb	60lb

When the head is brought forward and the neck bends, the weight on the cervical spine increases.

Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head.
Harold P.K.


Forward Head Posture

Can cause permanent damage and result in:

- Headaches
- Back Pain
- Muscle Damage
- Nerve Damage
- Spinal Disc Herniation
- Spinal Disc Compression
- Decrease in Spinal Curve
- Gastrointestinal Problems
- Onset of Early Arthritis




normal




Healthy
Pain Free
Physically Fit
Stress Free

phase I




Headaches
Neck Pain
Strained Muscles
Shoulder Tension

phase II



Arthritis
Disc Disease
Degenerated Joints
Fatigue
Joint Pain

phase III



Chronic Pain
Irreversible Damage
Spine Disease

Texting Neck


aka Anterior Head Syndrome



Tension Headache →
Neck and shoulder pain →
Difficulty breathing, pain in →
middle of back, chest, and lower back



Kineziologie páteře



- Základní funkční jednotkou páteře je pohybový segment.

Pohybový segment

- skládá se ze sousedících polovin obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky, fixačního vaziva a svalů.

- z funkčního hlediska má pohybový segment páteře tři základní komponenty:


- **Nosná a pasivně fixační** = obratle a páteřní vazy.
- **Hydrodynamická** = meziobratlová destička a cévní systém páteře.
- **Kinetická a aktivně fixační** = klouby a svaly.


Pohyblivost páteře

- Z biomechanického hlediska je páteř elastický, článkovaný a zakřivený válec. Jedná se o biomechanický komplex složený z velmi rozdílných komponent
- Poddajnost páteře je různá v jednotlivých částech
- **Krční páteř má největší pohyblivost**
- Hrudní páteř je značně omezena hrudním košem
- Bederní páteř má danou tuhost v případě potřeby zajištěnou především **svalovou aktivitou**.
- Přechody jednotlivých úseků vymezují riziková místa pro vznik traumat (AO, CTh, ThL, LS)


Pohyby páteře

- Pohyblivost jednotlivých úseků páteře je dána součtem drobných posunů (tzv. sumační pohyb) kloubních ploch a mírou stlačitelnosti meziobratlových destiček
- „Spinal coupling“ (sdružené pohyby), pohyb v jedné rovině doprovázen současným pohybem v jiné rovině
- Rozsah pohybů v každém segmentu je určován tvarem a sklonem obratlových trnů, kloubních ploch a výškou meziobratlového disku
- Základní typy pohybů: předklony (anteflexe), záklony (retroflexe), úklony (lateroflexe), otáčení (rotace, torze)





2. krční až 1. hrudní obratel:
pohled z pravé strany



spojené bederní obratle:
pohled z laterální strany zleva

Rozsahy pohybu dle Kapandjiho

- Flexe: Cp: 40°; Th+Lp: 105°; Lp: 60°; celkem: 110°
- Extenze: Cp: 75°; Th+Lp: 60°; Lp: 35°; celkem: 140°;
- Rotace: Cp: 45°-50°, Thp: 35°, Lp: 5°, celkem: 90°-95°
- Lateroflexe: Cp: 35°; Thp: 20°, Lp: 20°; celkem 75°

Rozsahy pohybu dle Koláře

- Flexe: Cp: 30-35°; Thp: 35-40°; Lp: 55-60°
- Extenze: Cp: 80-90°; Thp: 20-25°; Lp: 30-35°
- Rotace: Cp: 45-50°, Thp: 25-35°, Lp: 5°
- Lateroflexe: Cp: 35-40°; Thp: 20-25°, Lp: 20-30°




Figure 75




Figure 72




Figure 73




Figure 74

Anteflexe, retroflexe

- Jsou největší v krčním úseku páteře
- V dolní krční páteři ta lze dosáhnout značné retroflexe.
- Při předklonu a záklonu po sobě kloubní plošky nejprve posunují a v krajních polohách na sebe nalehnou a ukončí pohyb, i obratlová těla se při předklonu sunou mírně dopředu.
- V hrudním úseku je předklon i záklon omezen žebry a trnovými výběžky, hrudní páteř je tedy flekčně rigidní.
- Dolní hrudní páteř již není omezena pohyby žeber, tvoří s bederními obratli funkční pohybovou jednotku
- Při záklonu jsou nejzranitelnější 3 oblasti: C6-Th3, Th11-L2, L4-S1.

- Tělo horního obratle se nakloní a sklouzne anteriorně ve směru flexe → snížení disku anteriorně a zvýšení posteriorně → klínovitý tvar (nukleus pulposus posteriorně, natahuje zadní vlákna anulus fibrosus)
- Spodní proc. articulares horního obratle kloužou nahoru a pohybují se od horních processi articulares spodního obratle → otevření zadní část meziobratlového prostoru
- Maximální natažení vazů mezi proc. articulares, lig. flavum, lig. interspinosum, lig. supraspinosum, lig. longitudinale post. → limitace flexe
- Lig. longitudinale ant. je volné



Testování flexe

- **Thomayerův test**

- Hodnotíme rozvíjení páteře při předklonu, symetrie paravertebrálních valů a hrudníku. Při úklonu sledujeme křivku páteře jestli tvoří plynulý oblouk. Trup nerotuje, opačná DK se nenadzvedává.

- **Shoberova vzdálenost**

- Hodnotí rozvíjení bederní části páteře
 - Ve stoji spojném označíme trn L5, od něj 10cm kraniálně u dospělých a 5 cm u dětí
 - Ve volném předklonu se body od sebe vzdálí nejméně 14cm u dospělých a u dětí 7,5 cm

- **Stiborova vzdálenost**

- Pohyblivost hrudní a bederní části páteře
 - Výchozí bod jako u Schoberovy vzdálenosti a trn C7
 - Změříme vzdálenost mezi oběma body
 - Při uvolněném předklonu se vzdálenost prodlouží nejméně o 7-10 cm

- **Čepojova vzdálenost**


- Rozsah krční páteře do flexe
 - Meříme kraniálně 8 cm od C7
 - Při maximálním předklonu se vzdálenost prodlouží nejméně o 3 cm

- **Ottova inkliniční vzdálenost**

- Měření pohyblivosti hrudní páteře při předklonu a záklonu
 - Od C7 naměříme 30 cm kaudálním směrem
 - Při předklonu se vzdálenost prodlouží nejméně o 3,5 cm

EXTENSE

- Tělo horního obratle se nakloní a sklouzne posteriorně ve směru extenze → klínovitý tvar disku - rozšířen anteriorně (nukleus pulpus se pohybuje anteriorně a natahuje přední vlákna anulus fibrosus)
- Proc. articulares spodního a horního obratle se uzamknou, až dojde k dotyku proc. spinosi navzájem
- Omezena dotykem kostních struktur a natažením lig. longitudinale ant.





Testování extenze

- **Ottova reklináční vzdálenost**



- Měření pohyblivosti hrudní páteře při předklonu a záklonu
- Od C7 naměříme 30 cm kaudálním směrem
- Při záklonu se vzdálenost se zmenší o 2,5 cm

Lateroflexe

- v Cp je úklon spojen s rotací.
- V Lp se trn vychyluje na stranu úklonu.
- V Thp je lateroflexe minimální, úklon je doprovázen rotací (1° úklonu = 1° rotace).





- Tělo horního obratle se nakloní ipsilaterálně → klínovitý tvar disku (nukleus pulposus je posunut kontralaterálně)
- Natažení kontralaterálního lig. intertransversaria, ipsilaterální je volné
- Proc. articulares po sobě kloužou tak, že ipsilaterální procesus horního obratle je zvednutý, zatímco kontralaterální procesus klesne níž → natažení ipsilaterál. lig. flava a kapsulárního lig. mezi proc. articulares, kontralat. lig. jsou volná
- Dojde k mírnému vytočení trnů





Rotace

- Odehrává se hlavně v Cp a Thp
- V Cp dosahují rotace 50° , z toho až 35° probíhá mezi C1-C2.
- V Th jsou rotace omezeny na $25-35^\circ$, thorakolumbální přechod $45-50^\circ$
- Rotace v Lp je minimální - $5-10^\circ$
- Celková rotace – složení pohybu v jednotlivých segmentech




Craniocervical axial rotation



A

Superior view




Atlanto-axial joint complex (C1-C2)



B



Intracervical region (C2-C7)

- Při pohybu do rotace horní obratel rotuje a sklouzne po dolním.
- Plošky dolních proc. artikulares směřují anteriorně a laterálně, plošky horních proc. artikulares směřují posteriorně a mediálně.
- Kloubní plošky nejsou rovné, ale mírně konkávní -> odpovídají tvarem válci se středem O, který leží blízko proc. spinosi (viz obr.)
- Ploténka se neúčastní pohybu, brání orientace kloubních plošek.



Chování Lp v zátěži

- Záleží na tlaku (axiální, boční)
- Zatížení plotének, síla vazů
- Práce s těžištěm
- Opora o chodidla
- Ochranná práce svalů – struktura
- Výhřez, akutní lumbago...



Dotazy

Děkuji za pozornost