

# **Dřeviny**

**HEN**


**2009**

**přehled dřevin ke zkoušce**

**Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D.**

# Abies alba



- Jedle bělokorá
- Strom do 50 m
- Vzpřímené rozpadavé šišky





# Picea abies

- Smrk ztepilý
- Strom do 55 m
- Převislé šišky





# Pinus sylvestris

- Borovice lesní
- Strom do 40 m
- Jehlice po 2





# Larix decidua


- Modřín opadavý
- Strom do 40m





# Juniperus communis

- Jalovec obecný
- Keř 2-5 m
- Plody – kořeni





# Taxus baccata



- Tis červený
- Keř až strom do 20m
- Vzácný a chráněný





# Acer campestre

- Javor babyka
- Strom 3-15 m
- Často korkové lišty





# Acer platanoides

- Javor mléč
- Strom 10-30 m





# Acer pseudoplatanus

- Javor klen
- Strom do 30 m





# Alnus glutinosa




- Olše lepkavá
- Strom do 20 m
- Nížiny
- podmáčené lesy





# Alnus incana




- Olše šedá
- Strom do 20 m
- Horské luhy



# Berberis vulgaris

- Dřišťál obecný
- Keř do 3 m
- Plody jedlé až po mrazech






# Betula pendula

- Bříza bělokorá
- Strom do 25 m
- Krátkověká, pionýrská



# Calluna vulgaris

- Vřes obecný
- Keřík do 80 cm
- Kvete VIII-X






# Carpinus betulus

- Habr obecný
- Strom do 20 m
- Výborná pařezová výmladnost



# Cornus mas

- Dřín jarní
- Chráněný keř 2-6 m
- Kvete III-IV před olistěním
- Jedlé plody (více vitamínu C než citrusy)






# Cornus sanguinea

- Svída krvavá
- Keř 2-5 m
- Plody nejedlé



# Corylus avellana



- Líska obecná
- Keř 2-6 m
- Plody –lískové oříšky



# Crataegus laevigata

- Hloh obecný
- Keř do 6 m
- Dvousemenné plody



# Euonymus europaeus



- Brslen evropský
- Keř 2-5 m
- Plody „biskupské čepičky“
- Bohaté půdy (spraše nebo sprašové hlíny)



# Fagus sylvatica

- Buk lesní
- Strom do 45 m
- Hladká šedá kůra
- Plod – jedlá bukvice



# Frangula alnus



- Krušina olšová
- Keř 1-4 m
- Jedovatá včetně plodů





# Fraxinus excelsior




- Jasan ztepilý
- Strom 20-40 m
- Plod křídlatá nažka



# Ligustrum vulgare


- Ptačí zob obecný
- Keř 1-5 m
- Nepoživatelné bobule





# Lonicera xylosteum

- Zimolez obecný
- Keř 1-2 m
- Jedovaté plody po dvou



# Populus alba

- Topol bílý (linda)
- Strom 15-35 m
- Lužní lesy (měkký luh)





# Populus nigra

- Topol černý
- Vzácný strom 15-30 m
- Není napadán jmelím
- Vytlačován kříženci s americkými topoly (*Populus canadensis*)



# Populus tremula

- Topol osika – Osika
- Strom 5-20 m
- Krátkověký pionýrský





# Prunus padus

- Střemcha obecná
- Keř nebo strom do 15 m
- Lužní lesy



# Prunus spinosa

- Trnka obecná
- Trnitý keř 2-4 m
- Plody trpké jedlé





# Quercus petraea

- Dub zimní
- Strom 20-40 m
- Plody žaludy (jedlé)
- Léčivá svíravá kůra



# Quercus robur

- Dub letní
- Strom 15-45 m
- Léčivá kůra
- Krmné (jedlé) žaludy





# Rhamnus cathartica



- Řešetlák počistivý
- Keř 1- 3 m
- Jedovatá / léčivá rostlina  
– silné projímadlo



# Robinia pseudoacacia



- Trnovník akát
- Nepůvodní strom z východu USA 15- 25 m
- Léčivé a medonosné květy






# Rosa canina

- Růže šípková
- Trnitý keř 1-3 m
- Jedlé léčivé plody - šípký



# Rubus fruticosus agg.



- Ostružiník křovitý souhrnný (agregovaný druh tvořený mnoha velmi podobnými mikrospeciemi)
- Trnitý plazivý keř do 1,5m
- Paseky a lesní světliny





# Rubus idaeus

- Maliník obecný (Ostružiník maliník)
- Plazivý keř 0,6-1,2 m
- Jemně trnité výhony a listy
- Jedlé plody



# Salix alba



- Vrba bílá
- Strom do 25 m
- Lužní lesy v nížinách
- Listy na rubu a letorosty hustě přitiskle chlupaté






# Salix caprea

- Vrba jíva
- Keř až stromek 3-9 m



# Salix fragilis

- Vrba křehká
- Strom do 20 m
- Lužní lesy vyšších poloh (pahorkatin a hor)
- Listy a letorosty lysé





# Salix purpurea

- Vrba nachová
- Keř 2-6 m
- Zdánlivě vstříčné listy
- Načervenalé větvičky
- žluté lýko
- Křoviny lužních lesů a šterky



# Salix viminalis

- Vrba košíkářská
- Keř 4-10 m
- Listy celokrajné, podvinuté, bílý rub






# Sambucus racemosa



- Bez hroznatý (bez červený)
- Keř 1-4 m
- Nejedlé olejnaté plody



# Sambucus nigra

- Bez černý
- Keř 3-7 m
- Léčivé květy
- Tmavofialové léčivé plody





# Syringa vulgaris

- Šeřík obecný
- Keř 2-8 m
- Původní v JV Evropě a Malé Asii



# Sorbus aria





- Jeřáb muk
- Strom 2-10 m
- Listy na rubu šedě nebo bíle plstnaté






# Sorbus aucuparia

- Jeřáb ptačí
- Strom 5-15 m



# Sorbus torminalis


- Jeřáb břek
- Strom 3-15 m





# Tilia cordata



- Lípa srdčitá
- Strom do 25 m






# Ulmus glabra

- Jilm drsný (jilm horský)
- Strom do 30 m
- Asymetrické báze listů






# Vaccinium myrtillus



- Borůvka černá (brusnice borůvka)
- Keřík do 50 cm



# Vaccinium vitis-idaea

- Brusinka obecná  
(brusnice brusinka)
- Keřík do 30 cm





# Viburnum opulus

- Kalina obecná
- Keř 1-4 m
- Plody za syrova slabě jedovaté

