

## Odpovědi

1. Teoreticky budou proměnnými (tj. budou ve vymezené skupině nabývat alespoň 2 hodnot). Pokud však některé z nich budeme kódovat hrubě (např. lateralita P n. L), může se stát, že budou ve vymezené skupině konstantami. Podobně lze uvažovat o povolání či členství v politické straně.

2. *d e i l m*, často i *n*. U *k* záleží na tom, zda se ptáme na to, členem  *které strany člověk je* (nom), či zda je členem nějaké, jakékoli strany, či ne (ord).

*Komentář*. Všimněte si formulace otázky. Úroveň měření není vnitřní, neměnnou charakteristikou toho, co měříme. Vyjadřuje naše přesvědčení o vztahu mezi hodnotami na škále, na které proměnnou měříme, a podobou (kvantitou) jevu, který měříme. Proto také v odpovědi na otázku, jako je tato, obvykle zahrnujeme i vysvětlení, proč považujeme škálu za nominální (či jinou).

3. *h* (letopočty mají nulu stanovenou arbitrárně)

4. *c j* (kdybychom *b* operacionalizovali jako počet známých slov, pak i *b*) Viz komentář u ot. 2.

5. *a b f g* (v závislosti na operacionalizaci někdy i *n*, viz. dotazník „na zkoušku“). Těto kategorii, kdy toužíme a usilujeme po intervalovosti, ale nejsme si jí jistí, je většina „psychologických“ proměnných.

6. ano

7. poměrová

8. poměrové (intervalovost zůstane zachována, přibude smysluplná 0 – nulový rozdíl)

9. ano, poměrová.

10.

id	gr_level	group	pretest	posttest
1	1	1	60	107
...				
5	1	1	115	122
31	1	2	60	90
...				
35	1	2	120	121
6	2	1	65	118
...				
10	2	1	110	122
36	2	2	80	99
...				
40	2	2	120	123
...				

11.1 Proměnné jsou všechny charakteristiky kromě oblíbené zmrzliny. Oblíbená zmrzlina je na této populaci konstantní, nazveme ji tedy konstantou. Ano, je to trochu překvapivé, ale je možné, že v dané oblasti je nějaký fenomenální lokální výrobce vanilkové zmrzliny. Proměnná musí ve vymezené populaci nabývat alespoň dvou hodnot. Velmi důležité je zde to „ve vymezené populaci“. Oblíbená zmrzlina by tedy v jiné populaci (lokaci, věku...) velmi pravděpodobně byla také proměnnou!

11.2 Smysl má samozřejmě pouze otázka a). Barvu očí je možné měřit pouze na nominální škále. U ordinální škály by mělo smysl klást si otázky a) i b), u intervalové přibude c) a u poměrové by měly smysl všechny otázky. (Zde lze namítnout, že by bylo možné měřit barvu pomocí její odpovídající vlnové délky světla. V tom případě by se mohlo jednat až o škálu poměrovou. V psychologické praxi se však s tímto měřením pravděpodobně nesetkáme. Navíc hnědá je nespektrální barva, nemá tedy příslušnou vlnovou délku.)

11.3 Věk budeme měřit na poměrové škále. Věk dvou dětí je možno porovnávat, je možné zjišťovat rozdíl v jejich věku a dokonce je možné se ptát, kolikrát je jedno starší než druhé. (Škály, u kterých se lze ptát na velikost rozdílů mezi hodnotami, nazýváme metrické. Patří mezi ně intervalové a poměrové.

11.4 Znamku z chování – na ordinální škále ji měřit můžeme (neboť lze porovnat, která známka je vyšší a

kteřá nižší), avšak na intervalové už ne (rozdíl mezi známkou 1 a 2 může být naprosto odlišný od rozdílu mezi známkami 2 a 3, zvláště pak u chování).

11.5 Váhu budeme měřit na poměrové škále. Měřit ji na ordinální škále je také možné – změnu na nižší úroveň měření lze provést.

11.6 Lateralita. Dichotomická (= alternativní) znamená, že nabývá ve vymezené populaci pouze dvou hodnot. Na nominální škále měříme ještě vesnici a barvu očí – ta by hypoteticky mohla být také dichotomickou, avšak je velice pravděpodobné, že v uvažované populaci (kteřá je širší než náš desetičlenný vzorek) se nachází i další barvy očí. Tedy barva očí může nabývat i další hodnoty, a proto není dichotomickou.

11.7 Vesnice a barva očí. Polytomická proměnná znamená, že nabývá více než dvou hodnot ve vymezené populaci, jde tedy o protiklad k dichotomické proměnné.

11.8 Spojitá je váha a věk, neboť nejsou omezeny jen na některé dovolené hodnoty, ale mohou nabývat libovolných desetinných hodnot.

*Komentář:* Pozor, nejde o to, jaké hodnoty se v datech vyskytly (těch je vždy konečně mnoho, což je technicky blízko definice diskretnosti). Ani nejde o to, zda se v datech vyskytují desetinná čísla. Jde o to, zda jsou definovány/smysluplné i hodnoty mezi hodnotami, které se v datech vyskytly. U diskretních proměnných (jako např. u četnosti výskytu, či hodnotících škál u dotazníkových položek) definovány nejsou.

11.9 Datová matice obsahuje v každém řádku údaje týkající se jednoho objektu a v každém sloupci obsahuje data pro jednu proměnnou. Za datovou matici ji tedy považovat můžeme. Dalšími úpravami by mohlo být vynechání sloupce s oblíbenou zmrzlinou (kteřý zde není proměnnou) a kódování nečíselných hodnot pomocí čísel, jak je častým zvykem. (Tedy například místo modré barvy očí psát 1 a místo hnědé psát 2. Samozřejmě, v tom případě je nezbytné si poznamenat, co které číslo znamená!)

## 12.1

cislo	pohlavi	auto	tele	dige
1	1	1	0	1
2	2	1	9	0
3	1	0	1	9
4	1	1	1	0
5	2	0	1	1
6	2	1	1	1

## 12.2

cislo	pohlavi	zarizeni
1	1	1
2	1	2
3	1	99
4	2	99
5	2	2
6	2	3

12.3 b(cd) f h j l (Ne všechny termíny použité v otázkách existují, či jsou součástí obsahu PSY117.)

*Komentář:* Používání něčeho kódované 0=nepoužívá, 1=používá je proměnnou *dichotomickou*. Ta je zajímavá tím, že o ní můžeme uvažovat jako ordinální, intervalové i poměrové, podle toho, kde se ve svém uvažování zastavíme. Hodnoty lze podle míry používání něčeho seřadit (bez ohledu na kódování, takže je splněná podmínka pro pořadovou. Interval mezi hodnotami je zde jen jeden. Díky tomu zde nemohou být intervaly různě široké, a tak intervalovosti nestojí nic v cestě. A pokud je nepoužívání kódováno jako 0, pak jde o smysluplnou absolutní nulu – umožňující uvažovat o škále jako poměrové. Takto je dichotomická škála proměnnou, kterou lze popsat jak slovem poměrová, tak kategoričká.

## 12.4 a f h

12.5 Při kódování M=muž a Z=žena: a f h l. Při kódování muž=0, žena=1 viz 12.3.

## 16.1

cislo	pohlavi	shlednut	minpokuta	maxpokuta
-------	---------	----------	-----------	-----------

1	1	0	5000	5000
1	1	1	5000	5000
2	1	0	-9	-9
2	1	1	1000	-9
3	2	0	500	1500
3	2	1	500	1500

alternativně (vhodné napří pro párové testy v SPSS, Statistica)

cislo	pohlavi	minpokpre	minpokpo	maxpokpre	maxpokpo
1	1	5000	5000	5000	5000
2	1	-9	1000	-9	-9
3	2	500	500	1500	1500

*Komentář:* Tento úkol již není tak triviální jako předchozí, protože zahrnuje opakované měření a navíc otevřené otázky, na něž různí respondenti odpovídají různě. Je tedy nutné se nad kódováním zamyslet, aby bylo zachováno co největší množství informace.

Je otázka, jak správně definovat a kódovat poslední proměnnou, protože jsme díky ne zcela vhodnému zadání získali rozporné odpovědi – jeden respondent uvedl jednoznačnou výši pokuty, druhý vymezil spodní hranici pokuty a třetí vymezil její spodní i horní hranici. Pokud bychom chtěli zachovat co nejvíce platných hodnot, pak by asi bylo nejlepším řešením zakódovat odpovědi do více proměnných – dolní mez (minpok), horní mez (maxpok). Problém tohoto řešení je však ten, že nevíme, co přesně myslel svou odpovědí první respondent – zda minimální výši pokuty (jak v tabulce předpokládáme), nebo její průměrnou výši, nebo ještě něco jiného. Jestliže bychom tedy chtěli být precizní, bylo by lepší chápat jeho odpovědi jako chybějící (i když jako jediný odpověděl tak, jak jsme pravděpodobně předpokládali – tedy uvedením jednoho konkrétního čísla). Poučení: při formulaci otázek v dotaznících je třeba být nanejvýš opatrný a přesný, protože jinak si nemůžeme být jisti, jak si je respondenti vyloží a na co vlastně odpovídají. Takto získaná data mohou být bezcenná, nebo nás přinejmenším připravit o informace od řady cenných respondentů.

16.2 d e g

16.3 b(cd) f h j l

18. poměrová

19. intervalová (porovnáváme dva intervaly pětibodový a šestibodový a jejich srovnání je podmíněno existencí jednotky, což je vlastností intervalové škály). Na poměrové škále bychom toto srovnání mohli učinit v jediné situaci, a to tehdy, kdyby výchozí hodnota Petra i Pavla v prvním měření byla stejná.

21. ano (nelze mít částečné partnery, snad jen s výjimkou Hannibala Lectera), poměrová