

- f) Zředěné roztoky žíravých a uhličitých alkálií a zejména mýdla mazavého (mýdla draslového) v poměru 1:1000 ruší vzrůst spór (výtrusů) a mají tudíž rovněž účinek desinfekční. Proti upotřebení jich k účelům desinfekčním lze tím méně něčeho namítati, jelikož zároveň jako prostředky čistící v mnohém ohledu spůsobilé jsou a tudíž i v té příčině plného povšimnutí zasluhují.
- g) Žíravé vápno v podobě prášku, však také jako mléko vápenné a ovšem slabší než voda vápenná, ničí dle konaných pokusů s bacilly tyfovými a choleryovými a s uměle napodobenými výměty choleryovými v několika hodinách zárodky tyfu a cholery, a bylo by hleděti k upotřebení jeho k účelům desinfekčním zejména v případech, ve kterých následkem stížných poměrů dopravních a místních rychlé opatření a upotřebení účinných prostředků desinfekčních v úvodu uvedených s obtížemi spojeno jest.

### III.

#### Jak se desinfekce provádí.

#### Co jest předmětem desinfekce.

8. Desinfekce budiž zavedena ihned, jakmile nade vši pochybnost jest jisto, že tu jest některá z výše uvedených nemocí nakažlivých a budiž v ní pokračováno i po skončení nemoci. Desinfekci buďtež podrobeny osoby a věci, které s nemocným ve styk přišly a následkem toho nositeli nákazy, výměty atd. pokáleny byly, aneb znečistěny býti mohly.

#### Osamocení nemocného.

9. K cíli zjednodušení desinfekce budiž především nemocný vhodným způsobem osamocen a budiž z okolí jeho odstraněno vše, čeho k ošetřování jeho třeba není. Zejmena buďtež z jizby nemocného odstraněny veškeren zbytečný nábytek a věci, které provedení desinfekce ztěžují aneb protahují. Toho třeba dbáti zejména v příčině jizeb nemocných, ve kterých umístěny jsou osoby nemocnělé choleryou, neštovicemi, tyfem osutinovým neb zvratným, mázdřivkou, spálou neb úplavicí. Není dovoleno, vynášeti nábytek nebo předměty, kterých nemocný užívá, v době nemoci z místnosti, v níž nemocný se nalezá; bylo-li by toho nutně potřebí, buďtež věci ty prve dle daných předpisů desinfikovány.