

Dále budiž pozorováno: zdali pavučnice i omozečnice jsou stloustlé; neníli mezi nimi rozlitá krev aneb vcezeniny a jakého jsou způsobu. V případnosti takové jest potřeba tyto blány od mozku odloupnouti, což se stane, proštípnouli se nehtami obě mázdry na některém místě, kde jest snadno je zachytiti, a stáhnuouli se s povrchu mozkového, při čemž si sluší všimnouti: zdali jest mezi nimi a zátočinami mozkovými syrovatina aneb jiná tekutina nahrnutá, jak jest jí mnoho a jaká jest; zdali se dají mázdry tyto snadno aneb s tíží odloupnouti, a zdali v druhém případě nelpějí částky mozku na omozečnici aneb zdali se na ní nalézají tuberkule anebo jiné chorobní zplodiny.

§. 65.

Při mozku budiž vyznačeno; zdali jest znamenitě velký anebo vkleslý (collapsus); zdali jest šedá hmota tmavé neb jasné barvy; kolik má zátočin a jsouli tlusté aneb jsouli neobyčejně ploché; jak hluboké a široké jsou brázdy mozeční aneb jsouli zašlé. Dále budiž udáno: zdali jsou na mozku rozlitiny krevní; jsouli tam místa zardělá, naběhlá, změkklá; lze-li na některých místech spatřiti uložený hnis či talov, aneb chorební útvary.

Vnikajíli rány až do mozku, pozorovati třeba: jsouli způsobeny nástrojem, od kterého rána pochází nebo kostmi lebnými dolů stlačenými, vmáčknutými, neb odštípnutými, aneb pouze otřesením; zdali v případnosti této rána mozečná jest na místě, do kterého bylo udeřeno aneb na jiném; zdali úraz záleží pouze v tom, že jest tkanina mozečná krví napita, aniž by byla souvislost patrně porušena, anebo i v tom, že má pukliny krví naplněné, anebo zdali celý mozek rozmačkán jest na kaši, ježto rozličně barvená jest a sice z bleďa až do tmavě červena podlé množství rozlité krve; konečně třeba udati, na kterém místě se rány nalézají, a jak jsou rozsáhlé; jak hlukoké jsou, lze teprvé dalším vyšetřením ukázati.

§. 66.

Abý se vyšetřily částky mozku hloub ležící, porozhrnou se rukama obě mozečné polokoule od sebe; na místech, jichž se srp nedotýká, přeruší se prstami útlá spojivá sklípkovatina, ježto se zde nalézá; cevky ležící na trámu mozečném uchopí a přeloží se do zadu. Na to pojme se prostou rukou pravá polokoule za vnitřní povrch, odřízne se podlé směru trámu mozečného, a sice o něco výše nad ním, při čemž se řezá sice rovně, do zadu ale o něco dolů kloníc. Podobným způsobem odřízne se i levá polokoule, podporujíc jí na zevnitřní straně prostou rukou. Jestliže by se podlé patrnější zploštilosti zátočin mozečných bylo domnívati, že