

pěť a odřízne se celá vrstva svalů od násadce mečovitého až na chrustavky nejdolejších žeber. Neníli na hrudi žádných úrazů a neníli pro to také žádného důkladnějšího vyšetřování svalů hrudních zapotřebí, mohou se svaly ty se všeobecnými obaly až ku kostem klickovým zároveň odřezati.

K tomu konci se laloky na způsob již povědomý dobře napnou, pak se položí nůž do hotového již nářezu pod nejspodnější vrstvu svalovou a ta se odřeže od míst, na něž jsou svaly připevněny, vydatnými, zdola na horu vedenými řezy takovým způsobem, aby všechny chrustavky žeberní i přední konce žeber byly odkryty, anižby značnější zbytky svalů na nich zůstaly. Jestli na hrudi úraz, odřezává se kůže od svrchu do hloubky tak, jak se to dělá při pitevních demonstracích.

### §. 70.

Na to počne se vyšetřovati krk, při čemž odřeže se kůže až k zadnímu uhlu dolejší čelisti a k tomu místu, k němuž jest upevněn sval kývací, takovým způsobem, že se obnaží přední i obě postranní plochy krku. Aby se však i veliké cevy i kmeny nervů na krku ležících, vyšetřiti mohly, potřebí odloupnouti dolejší konec nadřčeného svalu od míst, k nimž se připevňuje a jej stranou položití.

Potom budiž poznamenáno, mnoholi a jaká krev jest v zevnitřních a vnitřních hrdelnících; buďtež podlitiny krevné na vnitřním povrchu kůže snad nalezené porovnány se stopami násilných úrazů zevnitř nalezenými; i přihlíženo buď k tomu: zdali sklípkovatina a povrchní svaly jsou zaschlé, krví podlité, roztržené aneb zdali jsou jiným způsobem porušeny. V příčině té buďte zvláště ohledány obě vnitřní hrdelnice, obě krkavice i jejich větší větve, pak nerv bloudivý, soucitný, braniční a jazykopožerákový, ježto se nalezne, když se odstraní opatrně sklípkovatina, kterážto je kryje a k sobě váže.

Na to odkryje se žláza štítná, popíše se: jak jest velká, jaký má tvar, jakou barvu; a naříznutím jí, vyšetří se, v jakém stavu se nalézá její tkanina; pak se ohmatá kost jazyční, chrťán a průdušnice, aby se vidělo, zdali jsou zohýbány, zlomeny aneb jinak pochroumány. Za tím rozpoltí se chrťán a průdušnice až k rukověti kosti krudní, a udá se: zdali blána slizná jest bledá, jasně neb tmavě červená, břídlicovitě šedá; zdali jest zkyprěna, změkčena, hlenem, hnisem, vředy pokrytá; neb zdali jakkoliv jinak vyhlíží, a jakého rozšíření tyto proměny dosáhly; poznamená se: jaké moky a jak mnoho se jich v průduchu průdušnice nalézá, a zkusí se, zdali by lehkým stisknutím hrudi se jich nevyhrnulo ještě více aneb že by se