

snad teprve tím objevily. Zvláště náleží přihlédnouti: v jakém stavu se nalézá štěrbina hlasní, její svazy a příklopek chřtánový; sluší zřetel i míti, zdali do těchto aneb jiných částek průdušnice snad vnikla nějaká cizí tělesa; taktéž náleží jiné chorobní změny poznamenati a úrazy podle známých pravidel popsati. Konečně má se spojivá sklípkovitina od požeráku odříznouti, požerák po levé zevnitřní straně rozpárati a prohlédnouti: co v něm obsaženo, jak vyhlíží jeho blána slizná a zdali není poraněn.

§. 71.

Byli při vyšetřování jícnu něco podezřelého nalezeno, ukázalali se zevnitřním prohlížením dutiny ústní i hltanové aneb za jinou příčinou toho potřeba, aby se částky tyto blíže vyšetřily, tedy se mají všechny svaly, ježto na vnitřní povrch sánky připevněny jsou, i s blánou ústní odřezati, požerák, kde jest přirostlý, odloupnouti, potom vytáhnouti a přeložiti jazyk i s požerákem a tento pak rozříznouti až k hotovému rozparku jícnovému. Jestliže by nestačilo místa, buďtež všeobecné pokrovy rozpoltěny až k zadnímu úhlu dolejší čelisti.

Nyní prohlídnou se plachticky patrové, mandle, kořen jazykový a vnitřní povrch požeráku: jsouli oteklé neb červené; jsouli na nich vředy a jakého druhu, máli blána slizná pravidelnou tuhost neb chorobní změklost a v jaké rozsáhlosti; jsouli v nich cizí tělesa, patvorky, a zdali snad až tam nevnikly úrazy a jaké povahy úrazy tyto jsou.

§. 72.

Nebylyli svaly hrudní hned se všeobecnými pokrovy odstraněny, proto že byl nalezen úraz, budiž popsáno, jakého jest úraz druhu, budiž odřezán velký sval hrudní od kosti hrudní, od chrustavek žeberných a od kosti klíčkové, pak malý sval hrudní od třetího, čtvrtého a pátého žebra z jedné i druhé strany a takto buď hrudní koš obnažen.

Když i zde se bylo o zjevném poranění měkkých částek udalo: na kterém jest místě, jak jest rozsáhlé a jaký má tvar; ohledají se i obnažené kosti a chrustavky: zdali jest na nich prohnal, mrtí; jsouli nárostky neb mozoly kostné; zdali jsou prasklé, zlomené, zakleslé, vymknuté; pak se hledí: zdali nejsou konce zlomených kostí do vnitř vmáčknuty; zdali nevnikají do dutiny hrudní a konečně, jak vyhlíží chrustavka mečovitá.

Hrudní dutina otvírá se nožem chrustavcím, jímžto se chrustavky žeberné opatrně přeřeží na blízku, kde se spojují se žebry; a jsouli chrustavky již zkosnatěny, přeříznou se pilkou. V této případnosti však potřebí pozor dáti, aby se ohledatel při delším vyšetřování útrob hrudních neporanil o kraje ostré, pilkou způsobené. Po tom zdvihne se kost hrudní na horu k tváři mrtvolky, když se byla dříve hranice