

mrtvoly; a zdali jsou na vratnaji anebo jinde místa zatvrdlá, jizvami neb patvorky posetá atd.

Jestli žaludek porušen, potřebí obzvláště pozor dát: které místo jest poraněno; jak veliká jest rána; jsouli větší cevy poraněny; zdali to, co bylo v žaludku obsaženo, vyteklo, a jak toho bylo mnoho; jak silně rána krvácela. Bylli žaludek poraněn aneb od vředu provrtán, budiž hleděno: jestli žaludek následkem toho přilepený nebo přirostlý; jestli proděn otvor do dužiny sousedních ústrojů, do dutin těla aneb na povrch jeho, a zdali tam snad jsou jiné píštělní dráhy.

Jak se má žaludek vyšetřovat, bylli někdo otráven a po čem se zvláště pátrati má, o tom bude zvláště jednáno.

§. 85.

Střeva se nejprve zevnitřně prohlédávají. Tenké střivo rozmotává se prsty od počátku až tam, kde padá do střeva slepého, a tlusté střivo odtud až k pastelínu, a to v tom pořádku, jak střeva přirozeně jdou; při tom hleděti sluší na to: zdali střivo nepravidelně leží, jako to bývá, když se střivo vyklopí, když se zakroutí, když s jinými částkami sroste, když se jedna částka střeva do druhé všoupne (volvulus), a co z toho pošlo; i na to: jak dlouhá jsou střeva a jestli v délce této jaké nepravidelnosti; jak jest střivo široké; zdali jest příliš rozšířeno neb súženo, a to bud celé aneb jenom některá jeho částka a která, jaké jest to rozšíření neb súžení, a v této případnosti budiž hleděno: zdali jest světlota střeva všudy stejně anebo jenom na obmezených místech rozšířena neb súžena, k. př. jakožto choboty neb jizevnaté sevření atd. Zaroveň budiž vyšetřeno, co jest toho příčinou zdali stěsnlosti jizvy, hmotnaté patvorky aneb cizí tělesa, ježto by dutinu střeva vyplňovaly atd.

Pobřišnice, ježto střeva povléká, vyšetří se také zde opět dle návodu obecného vícekráte již udaného; při čemž zvláště zřetel míti sluší k tomu: zdali jest výpotkami slepena aneb pevněji srostlá, na jaký spůsob, v jaké podobě, a co z toho pošlo; neboť působí jmenovitě taková srostlost, že střivo mění i svou polohu i světlota i průchodnost.

Naleznouli se výpotky a patvorky, popsány buďte dle jich povahy, tvaru, rozsáhlosti a dle jich následků, jako jest: zánět pobřišnice odhraněný a vakovitě zavřený, zrušení tkanin, z pobřišnice vybíhající píštěle, protržení atd.

Aby se mohlo to, co jest ve střevě, vyšetřili, budiž střivo kyčelní nůžkami střevními rozpáráno, a to na spodní ploše bliže místa, na kteréž se usazují listy okruží, počínajíc od chlopné slepého střeva; po tom otevře se tlusté střivo, počínajíc od slepého podlé pásma svalového po celé délce. Dvanáctník ohledá se hned po otevření žaludku, a na to se udá: co jest ve střevě, jsouli tam plyny, strávenina, látky lejnovité, tělesa cizorodá, z venku do střeva vniklá, hlísty, krev, hlen, syro-