

Nenili zvláštní příčiny, bude dosti na tom, když se děloha pozdvihne a rozpoltí stejným rovnoměrným řezem ode středu dna až k zevnitřním ústům děložním, čímž bude možno prohlédnouti její tkaninu, dutinu a blánu sliznou. Při důležitějších proměnách ale jest potřeba vypitvatí dělohu i s jejími přívěsky, totiž s měchyřem, pastelínem a vyjmouti ji pro důkladnější vyšetření z dutiny pánvice, a sice dle potřeby buď i se zevnitřními rodidly, s hrází a řití, anebo bez nich.

Zvláště budiž na to hleděno: jestli syrovatečný povlak dělohy stloustlý, zdali, jak se často stává, srostl pomocí sklípkovatiny s vedlejšími útvary; jsouli jaké sledy novějšího vypocování, ježto se, jako na pobřišnici vůbec, též i zde místně usídliti může, a budtež popsány komplikace další odtud pocházející. O hmotě dělohy budiž kromě tloušťky stěn uvedeno: jak pevná jest, jakou má barvu, jak jest krevnatá; jsouli v ní patvorky, na kterém místě, jaké jsou povahy, jak jsou veliké, zdali jimi přibylo neb ubylo masy hmoty děložní, a jak působily na obsažnost dutiny děložní i zdali překazily spojení této dutiny s vejcevodou. Též dlužno hleděti, nejsouli tepny děložní stloustlé, což se vždy udává po přestálém těhotenství a což se dá na řezové ploše přeříznuté dělohy pozorovati. Na krku dělohy nemá býti přehlídnuto: jsouli oboje ústí i průtok stěsnělé aneb zarostlé; a jsouli zvláště v poševní částce rakovité výpotky.

Potom náleží naznačiti: jaké jsou poměry prostorní v dutině děložní a jak působí na povahu stěn; a zároveň budiž, když toho příčina žádá, dodáno, ne jenom proč se dutina neobyčejně rozšířila, jak se to k. p. stává při starobné děloze, při neprůchodnosti i zatvoření krku, o čemž již na hoře zmínka učiněna byla, při fibroidech do dutiny se pnoucích atd., ale i proč se zmenšila k. p. že srostly stěny; konečně potřebí popsati: co v děloze obsaženo, buď si to krev, syrovatina, hlen rozličného způsobu, výpotky; i jaká jest sama blána slizná.

Při vejcevodách budiž, krom toho, že bývají, jak již udáno, zarostlé a kromě výpotků, hleděno na jejich blánu syrovatečnou, na jejich délku, tloušťku, průchodnost, na to, co v jejich průduchu jest; a budiž jmenovitě na to hleděno: stalyli se neprůchodnými od tuberkulí, rakovitých výpotků, od toho, že k sobě srostla blána slizná, ježto jejich dutinu povléká, od zaklesnutí, od křivolakého běhu anebo konečně od toho, že jest zavřen jejich volný trapečnatý kraj; i budiž při tom, zvláště v poslední případnosti popsáno, jak velice i v jaké podobě jsou rozšířeny, a co v nich obsaženo.

Při ohledávání vaječníků, sluší zření míti kromě jejich zevnitřního povlaku, jak jsou veliké, tuhé aneb ocháblé. Náleží udati: jsouli zde rakovité vcezeniny a útvary boubelkovité; jak jsou veliké a jak vyhlížejí puchýřky Grafovy, jsouli