

nabubřelé, jestli to, co v nich obsaženo, vodnaté, krvavé, jsouli puklé, a teklali z nich následkem toho krev, zdali zakrněly tak, že se z nich stala tílka žlutá; zároveň budiž vždy udáno, jak vyhlížejí spojidla svazovitá a zdali jsou též chorobně změněna.

### §. 90.

Při těhotenství, aneb možnáli se ho domnívati, budiž děloha na přední ploše ode dna opatrně rozpoltěna, aby ani koláč ani vaječné obaly porušeny nebyly; na to budtež, káželi to potřeba, vaječné obaly otevřeny, a vody plodní popsány, jak jest jich mnoho a jaké jsou; pak budiž důkladně vyšetřováno a v protokolu o sekci uvedeno: jak leží plod, a když byl vyňat, jak jest veliký, mnoholi váží, jaké jsou na něm známky, větší neb menší zralosti, jak velice jest shnilý a jaké jsou toho známky, a zdali vůbec jakkoliv se uchyluje od pravidelného způsobu. Jestli tu již koláč, sluší podotknouti: na kterém místě jest; dáli se snadně neb nesnadně odloupnouti; jestli nepravidelně srostlý aneb částečně odloupený; zdali krvácel; jaké jest barvy a velikosti, jak jest těžký; jsouli ve tkanině koláčové aneb zvláště na místech, kde jest koláč připevněn, houbelky a výpotky, jmenovitě vláknité; konečně, jaké proměny se jeví na místech, kde koláč jest přilepen, a jaké nepravidelnosti v obalech vaječných.

### §. 91.

Jestli že ale předcházelo těhotenství, potřebí popsati: jak dalece se děloha navrátila k pravidelnému způsobu nebo zdali se ještě ani nepočala navracovati; jaké jsou její stěny i jaká její slizná blána, při čemž se má obraceti zvláštní zřetel na místa, na která koláč byl přilepen, pak na ostatky koláče, ježto se dosud neodlepily i na krvácení; a konečně sluší obzvláště náležitě si všimnouti všech chorobních známek, ježto, společně uváženy, svědčí o nemocech omladních, i také proměn pocházejících od porodu samého. Pročež by se mělo v první příčině udati: jestli hmota děložní zřejmě spukřelá; jsouli v miznicích a vénách děložních hnisovité, talovité výpotky, a ty-li se vztahují do dutiny pánvice i jak daleko, zdali z toho vznikly hlízy, výpotky pobřišničné, jak rozšířené a jak silné; jsouli podobné změny na slizné bláně děložní a poševní, aneb zdali se tato již proměnila v talov a mř. V druhé pak příčině dlužno zaznamenati: nejsouli snad rodidla potrhána, kde a jak velice; jestli při tom podlitá aneb vylitá krev; zdali se děloha na ruby obrátila aneb vyklopila. Také se má uvést, jak se dotýkají vejcovodů a širokých děložních svazů tyto rozličné neduhy jako jsou: naběhliny, syrovátečně hnisovité vcezeniny, hlízy atd. Naskytneli se kroměděložné těhotenství, náleží míti nejen tentýž zřetel na vnitřní rodidla, nýbrž má se i udati, na kterém místě a jak dalece se vejce vyvinulo, a pak i zdali se tam spolu přihodilo krvácení neb vyvinuly výpotky atd. Jestli těhotenství ve vejcovodech, budiž kromě toho i na to zřetel brán: zdaliž