

# Určitý integrál

Robert Mařík

27. června 2006


## Obsah

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Konstrukce (definice) Riemannova integrálu. | 2  |
| 2 | Výpočet — Newtonova–Leibnizova věta.        | 18 |
| 3 | Numerický odhad — Lichoběžníkové pravidlo   | 19 |
| 4 | Aplikace – výpočet objemů a obsahů          | 30 |

# 1 Konstrukce (definice) Riemannova integrálu.


Na následujících stranách si vysvětlíme geometricky hlavní myšlenky definice Riemannova integrálu.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .



Křivka na obrázku je grafem funkce  $y = x^2 - 2x + 2$   
Rozdělíme interval. Norma dělení je 2.


Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .



Křivka na obrázku je grafem funkce  $y = x^2 - 2x + 2$


Rozdělíme interval. Norma dělení je 2.

Zvolíme reprezentanty v každém podintervalu.




Křivka na obrázku je grafem funkce  $y = x^2 - 2x + 2$   
Rozdělíme interval. Norma dělení je 2.  
Zvolíme reprezentanty v každém podintervalu.  
Nakreslíme integrální součet – plocha červeného obrazce.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .




Zjermíme dělení. Norma tohoto dělení je 1.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .



Zjermníme dělení. Norma tohoto dělení je 1.  
Zvolíme reprezentanty v každém podintervalu.




Zjemníme dělení. Norma tohoto dělení je 1.

Zvolíme reprezentanty v každém podintervalu.

Nakreslíme integrální součet – plocha červeného obrazce.



Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .




Ponecháme dělení. Norma dělení je pořád 1.

Zvolíme reprezentanty v každém podintervalu, ale jinak, než v předchozím kroku.

Nakreslíme integrální součet – plocha červeného obrazce.


Integrální součet závisí na výběru reprezentantů.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .




Zjemníme dělení. Norma tohoto dělení je **0.6** (nejdelší interval je ten poslední).  
Zvolíme reprezentanty a určíme integrální součet – plocha červeného obrazce.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .




Opět zjenníme dělení. Norma tohoto dělení je 0.2  
Zvolíme reprezentanty a určíme integrální součet.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .



Pokračujeme ve zjemňování dělení. Nyní je norma 0.1.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .



Pokračujeme ve zjemňování dělení ad infimum. Nyní je norma **0.05**.

Pokud se hodnota integrálních součtů ustálí (integrální součty mají limitu při normě dělení jdoucí k nule) a pokud tato limita nezávisí ani na konkrétním výběru reprezentantů ani na způsobu, jak dělení zjemňujeme, říkáme, že funkce je Riemannovsky integrovatelná a její Riemannův (= určitý) integrál je ona limita integrálních součtů.

**Definice (dělení intervalu).** Buď  $[a, b]$  uzavřený interval  $-\infty < a < b < \infty$ . **Dělením intervalu**  $[a, b]$  rozumíme konečnou posloupnost  $D = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  bodů z intervalu  $[a, b]$  s vlastností

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Čísla  $x_i$  nazýváme **dělicí body**. **Normou dělení**  $D$  rozumíme maximální číslo, které udává vzdálenost sousedních dělicích bodů. Normu dělení  $D$  označujeme  $\nu(D)$ . Je tedy  $\nu(D) = \max\{x_i - x_{i-1}, 1 \leq i \leq n\}$ .

**Definice (integrální součet).** Buď  $[a, b]$  uzavřený interval a  $f$  funkce definovaná a ohraničená na  $[a, b]$ . Buď  $D$  dělení intervalu  $[a, b]$ . Buď  $R = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$  posloupnost čísel z intervalu  $[a, b]$  splňující  $x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$  pro  $i = 1..n$ . Potom součet

$$\sigma(f, D, R) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

nazýváme **integrálním součtem funkce**  $f$  příslušným dělení  $D$  a **výběru reprezentantů**  $R$ .

**Definice (Riemannův integrál).** Buď  $[a, b]$  uzavřený interval a  $f$  funkce definovaná a ohraničená na  $[a, b]$ . Buď  $D_n$  posloupnost dělení intervalu  $[a, b]$  a  $R_n$  posloupnost reprezentantů. Řekneme, že funkce  $f$  je **Riemannovsky integrovatelná** na intervalu  $[a, b]$ , jestliže existuje číslo  $I \in \mathbb{R}$  s vlastností

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, D_n, R_n) = I$$

pro libovolnou posloupnost dělení  $D_n$ , splňující  $\lim_{n \rightarrow \infty} v(D_n) = 0$  při libovolné volbě reprezentantů  $R_n$ . Číslo  $I$  nazýváme **Riemannův integrál funkce  $f$  na intervalu  $[a, b]$**  a označujeme

$$\int_a^b f(x) dx.$$

**Definice (horní a dolní mez).** Číslo  $a$  v definici Riemannova integrálu se nazývá **dolní mez** a číslo  $b$  **horní mez** Riemannova integrálu.

### Věta 1 (postačující podmínky pro integrovatelnost funkce).

1. Funkce **spojitá** na intervalu  $[a, b]$  je na tomto intervalu Riemannovsky integrovatelná.
2. Funkce **ohraničená** na  $[a, b]$ , která má na tomto intervalu **konečný počet bodů nespojitosti** je Riemannovsky integrovatelná.
3. Funkce **monotonní** na  $[a, b]$  je na tomto intervalu Riemannovsky integrovatelná.

**Věta 2 (linearita určitého integrálu vzhledem k funkci).** Necht'  $f, g$  jsou funkce integrovatelné na  $[a, b]$ ,  $c$  necht' je reálné číslo. Pak platí

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$
$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx.$$

**Věta 3 (aditivita určitého integrálu vzhledem k mezím).** Necht'  $f$  je funkce integrovatelná na  $[a, b]$ . Buď  $c \in (a, b)$  libovolné. Pak je  $f$  integrovatelná na intervalech  $[a, c]$  a  $[c, b]$  a platí

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$





**Věta 4** (monotonie vzhledem k funkci). Buďte  $f$  a  $g$  funkce integrovatelné na  $[a, b]$  takové, že  $f(x) \leq g(x)$  pro  $x \in (a, b)$ . Pak platí  $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ .

**Definice** (střední hodnota). Buď  $f$  funkce (Riemannovsky) integrovatelná na intervalu  $[a, b]$ . Číslo

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

se nazývá *střední hodnota funkce  $f$  na intervalu  $[a, b]$* .



## 2 Výpočet — Newtonova–Leibnizova věta.

**Věta 5** (Newtonova–Leibnizova věta). Nechť funkce  $f(x)$  je Riemannovsky integrovatelná na  $[a, b]$ . Nechť  $F(x)$  je funkce spojitá na  $[a, b]$ , která je intervalu  $(a, b)$  primitivní k funkci  $f(x)$ . Pak platí

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$


**Příklad.**

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx &= \left[ \frac{x^3}{3} - x^2 + 2x \right]_0^3 \\ &= \frac{3^3}{3} - 3^2 + 2 \cdot 3 - \left[ \frac{0^3}{3} - 0^2 + 2 \cdot 0 \right] \\ &= 3^2 - 3^2 + 6 - 0 \\ &= 6\end{aligned}$$

### 3 Numerický odhad — Lichoběžníkové pravidlo

- Vrátime se k definici Riemannova integrálu a k integrálním součtům.
- Budeme se snažit co nejlépe aproximovat plochu pod křivkou.
- Pro větší početní komfort budeme interval dělit na stejně dlouhé dílky.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .




Dělení a integrální součet

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .

$$I \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + f(x_3))$$

$h = 1$  je délka mezi sousedními značkami na ose  $x$




Nahradíme každý obdélník lichoběžníkem. Aproximace je lepší a výpočet se moc nezhorší.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .

$$I \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + 2f(x_4) + f(x_5))$$

$h = 0.6$  je délka mezi sousedními značkami na ose  $x$




Volíme kratší výšku lichoběžníků a aproximace je ještě lepší, počítání je však delší.

Integrál  $\int_0^3 (x^2 - 2x + 2) dx$ .

$$I \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_5) + f(x_6))$$

$h = 0.5$  je délka mezi sousedními značkami na ose  $x$



Pro jemnější dělení je aproximace ještě lepší.

Chyba, které se dopustíme, je malá jestliže

- použijeme “dostatečně jemné” dělení,
- funkce se “příliš neliší” od lineární funkce (to ale neovlivníme).

**Příklad.** Hledejme  $\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx$ .



**Příklad.** Hledejme  $\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx$ .  $n = 10$ ,  $h = 0.1$ .

$i$	$x_i = a + hi$	$y_i = \frac{\sin x_i}{x_i}$	$m$	$my_i$
0	1			
1	1.1			
2	1.2			
3	1.3			
4	1.4			
5	1.5			
6	1.6			
7	1.7			
8	1.8			

- Rozdělíme interval na 10 dílků,  $n = 10$ . Délka jednoho dílku bude  $h = \frac{b - a}{n} = \frac{2 - 1}{10} = 0.1$ .
- Výpočet zaznamenáme v následující tabulce (budeme zaokrouhlovat na 6 desetinných míst).

**Příklad.** Hledejme  $\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx$ .  $n = 10$ ,  $h = 0.1$ .

$i$	$x_i = a + hi$	$y_i = \frac{\sin x_i}{x_i}$	$m$	$my_i$
0	1	0.841471		
1	1.1	0.810189		
2	1.2	0.776699		
3	1.3	0.741199		
4	1.4	0.703893		
5	1.5	0.664997		
6	1.6	0.624734		
7	1.7	0.583332		
8	1.8	0.541026		
9	1.9	0.498053		
10	2	0.454649		

**Příklad.** Hledejme  $\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx$ .  $n = 10$ ,  $h = 0.1$ .

$i$	$x_i = a + hi$	$y_i = \frac{\sin x_i}{x_i}$	$m$	$my_i$
0	1	0.841471	1	0.841471
1	1.1	0.810189	2	1.620377
2	1.2	0.776699	2	1.553398
3	1.3	0.741199	2	1.482397
4	1.4	0.703893	2	1.407785
5	1.5	0.664997	2	1.329993
6	1.6	0.624734	2	1.249467
7	1.7	0.583332	2	1.166664
8	1.8	0.541026	2	1.082053
9	1.9	0.498053	2	0.996105
10	2	0.454649	1	0.454649

**Příklad.** Hledejme  $\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx$ .  $n = 10$ ,  $h = 0.1$ .

$i$	$x_i = a + hi$	$y_i = \frac{\sin x_i}{x_i}$	$m$	$my_i$
0	1	0.841471	1	0.841471
1	1.1	0.810189	2	1.620377
2	1.2	0.776699	2	1.553398
3	1.3	0.741199	2	1.482397
4	1.4	0.703893	2	1.407785
5	1.5	0.664997	2	1.329993
6	1.6	0.624734	2	1.249467
7	1.7	0.583332	2	1.166664
8	1.8	0.541026	2	1.082053
9	1.9	0.498053	2	0.996105
10	2	0.454649	1	0.454649

Součet v posledním sloupci je  $S = 13.184361$  a proto

$$\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{hS}{2} = \frac{S}{20} = 0.659218.$$

**Příklad.** Hledejme  $\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx$ .  $n = 10$ ,  $h = 0.1$ .

$i$	$x_i = a + hi$	$y_i = \frac{\sin x_i}{x_i}$	$m$	$my_i$
0	1	0.841471	1	0.841471
1	1.1	0.810189	2	1.620377
2	1.2	0.776699	2	1.553398
3	1.3	0.741199	2	1.482397
4	1.4	0.703893	2	1.407785
5	1.5	0.664997	2	1.329993
6	1.6	0.624734	2	1.249467
7	1.7	0.583332	2	1.166664
8	1.8	0.541026	2	1.082053
9	1.9	0.498053	2	0.996105
10	2	0.454649	1	0.454649


Součet v posledním sloupci je  $S = 13.184361$  a proto

$$\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{hS}{2} = \frac{S}{20} = 0.659218.$$


Použití přesnějších metod vede k přesnější hodnotě  $I \doteq 0.659329906435512$ , od které jsme se odchýlili na čtvrtém desetinném místě.

## 4 Aplikace – výpočet objemů a obsahů

Obsah křivočarého lichoběžníku a objem rotačního tělesa





$$S = \int_a^b f(x) dx$$



$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

## Obsah množiny mezi křivkami a objem tělesa, vzniklého rotací této množiny



$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

$$V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .



Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .

$$1 - (x - 1)^2 = -x$$

- První z křivek je parabola, druhá z křivek je přímka  $y = -x$ .
- Křivky se protínají v bodě, jehož  $x$ -ová splňuje rovnici

$$1 - (x - 1)^2 = -x$$

Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .

$$1 - (x - 1)^2 = -x$$

$$1 - (x^2 - 2x + 1) = -x$$

$$1 - x^2 + 2x - 1 = -x$$

$$3x - x^2 = 0$$

$$(3 - x)x = 0$$

Průsečíky křivek jsou body  $[0, 0]$  a  $[3, -3]$ .

Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .


$$1 - (x - 1)^2 = -x$$

$$1 - (x^2 - 2x + 1) = -x$$

$$1 - x^2 + 2x - 1 = -x$$


$$3x - x^2 = 0$$

$$(3 - x)x = 0$$



$$y = 1 - (x - 1)^2 = 1 - (x^2 - 2x + 1) = 2x - x^2 = x(2 - x)$$


Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .



$$S = \int_0^3 1 - (x - 1)^2 - (-x) dx$$

$$x + y = 0 \iff y = -x$$


Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .



$$S = \int_0^3 1 - (x - 1)^2 - (-x) dx = \int_0^3 1 - (x^2 - 2x + 1) + x dx$$

Umocníme.


Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .



$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 1 - (x - 1)^2 - (-x) \, dx = \int_0^3 1 - (x^2 - 2x + 1) + x \, dx \\ &= \int_0^3 -x^2 + 3x \, dx \end{aligned}$$

Upravíme integrand.


Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .



$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 1 - (x - 1)^2 - (-x) \, dx = \int_0^3 1 - (x^2 - 2x + 1) + x \, dx \\ &= \int_0^3 -x^2 + 3x \, dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2} \right]_0^3 \end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .




$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 1 - (x - 1)^2 - (-x) dx = \int_0^3 1 - (x^2 - 2x + 1) + x dx \\ &= \int_0^3 -x^2 + 3x dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2} \right]_0^3 = \left[ -\frac{3^3}{3} + 3\frac{3^2}{2} \right] - \left[ -\frac{0^3}{3} + 3\frac{0^2}{2} \right] \end{aligned}$$

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$



Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = 1 - (x - 1)^2$  a  $x + y = 0$ .




$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 1 - (x - 1)^2 - (-x) \, dx = \int_0^3 1 - (x^2 - 2x + 1) + x \, dx \\ &= \int_0^3 -x^2 + 3x \, dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2} \right]_0^3 = \left[ -\frac{3^3}{3} + 3\frac{3^2}{2} \right] - \left[ -\frac{0^3}{3} + 3\frac{0^2}{2} \right] \\ &= -9 + \frac{27}{2} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Dopočítáme obsah množiny.

Určete obsah množiny mezi křivkami  $y = e^x$  a  $y = e^{-x}$  pro  $x \in [0, 1]$  a objem tělesa, které vznikne rotací této množiny okolo osy  $x$ .

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$




$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

Zakreslíme křivky.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$


$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx$$

Two yellow arrows point from the x-axis labels '0' and '1' in the graph above to the limits of integration in the equation below.

Vyjádříme obsah plochy jako určitý integrál.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$




$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1$$

Vypočteme neurčitý integrál.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$




$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = e^1 + e^{-1} - [e^0 + e^0]$$

Vypočítáme určitý integrál pomocí Newtonovy–Leignizovy formule. Dosadíme tedy meze.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$




$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = e^1 + e^{-1} - [e^0 + e^0] = e + \frac{1}{e} - 2$$

Dopočítáme numericky.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$


$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = e^1 + e^{-1} - [e^0 + e^0] = e + \frac{1}{e} - 2$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 - (e^{-x})^2 dx$$

Vyjádríme objem tělesa jako určitý integrál.



$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$


$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = e^1 + e^{-1} - [e^0 + e^0] = e + \frac{1}{e} - 2$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 - (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} - e^{-2x} dx$$

Upravíme, abychom mohli použiť vzorec.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$


$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = e^1 + e^{-1} - [e^0 + e^0] = e + \frac{1}{e} - 2$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 - (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} - e^{-2x} dx = \pi \left[ \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^1$$

Vypočteme neurčitý integrál.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$


$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = e^1 + e^{-1} - [e^0 + e^0] = e + \frac{1}{e} - 2$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 - (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} - e^{-2x} dx = \pi \left[ \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^1$$
$$= \pi \left[ \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} e^{-2} - \left( \frac{1}{2} e^0 + \frac{1}{2} e^0 \right) \right]$$

Použijeme Newtonovu–Leibnizovu formuli. Dosadíme tedy meze.

$$y = e^x, y = e^{-x}, x \in [0, 1], S = ?, V = ?.$$



$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x)) dx$$

$$S = \int_0^1 e^x - e^{-x} dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = e^1 + e^{-1} - [e^0 + e^0] = e + \frac{1}{e} - 2$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 - (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} - e^{-2x} dx = \pi \left[ \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^1$$
$$= \pi \left[ \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} e^{-2} - \left( \frac{1}{2} e^0 + \frac{1}{2} e^0 \right) \right] = \pi \left[ \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2e^2} - 1 \right]$$

Upravíme.

Určete objem tělesa, vzniklého rotací množiny pod grafem funkce  $y = e^{\sqrt{x}}$  pro  $x \in [0, 1]$  okolo osy  $x$ .


$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$y(0) = e^{\sqrt{0}} = e^0 = 1$$

$$y(1) = e^{\sqrt{1}} = e^1 \approx 2.72$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \geq 0$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}} \sqrt{x} - e^{\sqrt{x}} \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} \\ &= \frac{1}{2} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x} - 1}{x\sqrt{x}} \end{aligned}$$



- Odhadneme průběh funkce  $y = e^{\sqrt{x}}$ .
- Doma si spočítejte obsah tohoto obrazce (postup je podobný jako postup uvedený níže, výsledek je  $S = 2$ ).

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

Užijeme vzorec pro objem.

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

Vypočítáme bokem neurčitý integrál.



$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \int e^{2\sqrt{x}} dx$$

Upravíme funkci.

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \int e^{2\sqrt{x}} dx$$

$$2\sqrt{x} = t$$

$$4x = t^2$$

$$4 dx = 2t dt$$

$$dx = \frac{1}{2} t dt$$

Použijeme substituci.

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \int e^{2\sqrt{x}} dx$$

$$\begin{aligned} 2\sqrt{x} &= t \\ 4x &= t^2 \\ 4 dx &= 2t dt \\ dx &= \frac{1}{2} t dt \end{aligned} = \frac{1}{2} \int t \cdot e^t dt$$

Použijeme substituci.

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \int e^{2\sqrt{x}} dx$$

$2\sqrt{x} = t$
$4x = t^2$
$4 dx = 2t dt$
$dx = \frac{1}{2} t dt$

$$= \frac{1}{2} \int t \cdot e^t dt$$

$u = t$	$u' = 1$
$v' = e^t$	$v = e^t$

$$= \frac{1}{2} (t \cdot e^t - \int 1 \cdot e^t dt)$$

Použijeme metodu per-partés

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \int e^{2\sqrt{x}} dx$$

$2\sqrt{x} = t$
$4x = t^2$
$4 dx = 2t dt$
$dx = \frac{1}{2} t dt$

$$= \frac{1}{2} \int t \cdot e^t dt$$

$u = t$	$u' = 1$
$v' = e^t$	$v = e^t$

$$= \frac{1}{2} (t \cdot e^t - \int 1 \cdot e^t dt) = \frac{1}{2} (te^t - e^t)$$

Dokončíme integraci.

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \int e^{2\sqrt{x}} dx$$

$2\sqrt{x} = t$
$4x = t^2$
$4 dx = 2t dt$
$dx = \frac{1}{2} t dt$

$$= \frac{1}{2} \int t \cdot e^t dt$$

$u = t$	$u' = 1$
$v' = e^t$	$v = e^t$

$$= \frac{1}{2} (t \cdot e^t - \int 1 \cdot e^t dt) = \frac{1}{2} (te^t - e^t)$$
$$= \frac{1}{2} \cdot e^t \cdot (t - 1)$$

Vytkneme

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \int e^{2\sqrt{x}} dx$$

$2\sqrt{x} = t$
$4x = t^2$
$4 dx = 2t dt$
$dx = \frac{1}{2} t dt$

$$= \frac{1}{2} \int t \cdot e^t dt$$

$u = t$	$u' = 1$
$v' = e^t$	$v = e^t$

$$= \frac{1}{2} (t \cdot e^t - \int 1 \cdot e^t dt) = \frac{1}{2} (te^t - e^t)$$
$$= \frac{1}{2} \cdot e^t \cdot (t - 1) = \frac{1}{2} \cdot e^{2\sqrt{x}} \cdot (2\sqrt{x} - 1)$$

Použijeme zpětnou substituci pro návrat k proměnné  $x$ . Integrační konstanta může být libovolná, volíme ji například nulovou.

$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \frac{1}{2} \cdot e^{2\sqrt{x}} \cdot (2\sqrt{x} - 1)$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \left[ \frac{1}{2} e^{2\sqrt{x}} (2\sqrt{x} - 1) \right]_0^1 \\ &= \pi \left[ \frac{1}{2} e^2 (2 - 1) - \frac{1}{2} e^0 (0 - 1) \right] \end{aligned}$$

Použijeme Newtonovu–Leibnizovu větu.



$$V = ?, x \in [0, 1], y = e^{\sqrt{x}}$$

$$V = \pi \int_0^1 (e^{\sqrt{x}})^2 dx$$

$$\int (e^{\sqrt{x}})^2 dx = \frac{1}{2} \cdot e^{2\sqrt{x}} \cdot (2\sqrt{x} - 1)$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \left[ \frac{1}{2} e^{2\sqrt{x}} (2\sqrt{x} - 1) \right]_0^1 \\ &= \pi \left[ \frac{1}{2} e^2 (2 - 1) - \frac{1}{2} e^0 (0 - 1) \right] \\ &= \pi \left[ \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2} \right] \\ &= \pi \frac{e^2 + 1}{2} \end{aligned}$$

KONEC