

# Rozšířená neodkladná resuscitace ACLS – doporučení ERC 2005

---



Resuscitation (2005) 67S1, S39–S86



RESUSCITATION



[www.elsevier.com/locate/resuscitation](http://www.elsevier.com/locate/resuscitation)

# Zapamatovat si!!!

---

Léky užívané v resuscitaci


- O<sub>2</sub>
- Adrenalin
- Atropin
- Amiodaron

intratracheální podání


- Adrenalin
- Atropin
- Mesocain=lidokain
- Naloxon


Nejlépe by bylo pacientovi, pokud by k zástavě oběhu nedošlo

# In Hospital Resuscitation



Adult ALS  
Algorithm





# Nejdůležitější část resuscitace

---


## Srdeční rytmus

- defibrilací léčitelný
- defibrilací neléčitelný

# Asystolie

---

- isoelektrická linie




# Bezpulzová el. aktivita

---

Pulseless Electrical Activity  
(elektromechanická disociácia)

- komplex, isoel.linie, komplex




# VF/ VT


Medscape®

[www.medscape.com](http://www.medscape.com)

A




B



Source: South Med J © 2004 Lippincott Williams & Wilkins

# VF

---




# Co je to?

---



# Co je to?

---




# Co je to?

---



# Co je to?

---




# Co je to?

---



# Co je to?


---



# Asystolie ?? jemnovlná fibrilace??

---

- Při pochybách léčit jako asystolii,
- toto je fibrilace!!



# Elektroterapie



---

- Časná defibrilace je kritická pro přežití:
  - Nejčastější úvodní rytmus u náhlé zástavy oběhu je VF.
  - Léčba VF je elektrická defibrilace.
  - Pravděpodobnost úspěšné defibrilace s časem rapidně klesá.
  - VF má tendenci přejít do asystolie během pár minut.
- Nejdřív výboj vs. nejdřív KPR
  - Pokud jsme svědky kolapsu, tak nejdřív výboj AED.
  - Jinak 5 cyklů KPR, pak výboj. (2000: co nejdřív)
- 1 výboj a hned masáž
  - > 90% úspěšnost u bifazických výbojů
  - po úspěšné defibrilaci krátká asystolie a neúčiné stahy
  - kontrola rytmu až po 2 minutách

# Defibrilace

- je metodou volby u KT a KF – má přednost před dalšími postupy (adrenalin, OTI)
- KF je zrušena průtokem el.proudu přes myokard.
- čím dříve, tím účinější

Alternativou defibrilace = prekordiální úder jen prvních 30s



# Energie

---

$$\text{Joule (Watt sec.)} = \text{kV} * \text{A} * \text{ms}$$

srdcem projdou 4%

monofázický výboj 360 J




Figure 3.1 Monophasic damped sinusoidal waveform (MDS).

bifázický výboj 200 J

interní defibrilace 25 - 35 J

děti: VF u 5 - 15% SCA, iniciálně 2 J/kg, pak 4 J/kg




Figure 3.3 Biphasic truncated exponential waveform (BTE).

# Zajištění dýchacích cest a ventilace

---

*Během prvních minut VF SCA nejsou umělé vdechy pravděpodobně tak důležité jako komprese hrudníku.*

- **Ventilace maskou a ambuvakem**
  - akceptovatelná u KPR; zvláště přínosná v prvních minutách KPR nebo když je pokročilé zajištění DC opožděné či neúspěšné
- **Pokročilé zajištění DC**

*dříve OTI metodou volby, ale komplikace, zpoždění*

  - kombirourka
  - LMA
  - OTI
    - u zachránců s odpovídajícím výcvikem a příležitostmi k provádění či nácviku OTI
    - ověření polohy klinicky a detekcí expirovaného CO<sub>2</sub>

# Po zajištění dýchacích cest

---

- 2 zachránci již neposkytují cykly KPR (komprese přerušené pauzou pro ventilaci)
  - 1. zachránce: kontinuální komprese hrudníku, 100/min, bez pauzy pro ventilaci,
  - 2. zachránce: 8 – 10 dechů/min, 500 - 600 ml, 6 – 7 ml/kg;  
Excesivní ventilace je škodlivá a neměla by být prováděna!
  - Oba zachránci by si měli měnit role cca po 2 minutách: prevence únavy a zhoršení kvality a frekvence kompresí hrudníku. Je-li zachránců více, měli by se střídat v kompresích hrudníku po 2 minutách.
- 
- Komprese hrudníku jsou doporučeny u kojence či dítěte, kde HR < 60/min se známkami špatné perfuze přes adekvátní oxygenaci a ventilaci.

# Žilní přístup

---

- zajištění periferního přístupu (i.v., i.o.)
- intratracheálně
  - lidokain, adrenalin, atropin, naloxon, vasopresin
  - dávka 2 – 3 x vyšší, do 5 – 10 ml
  - **i.v./i.o. je lepší**
- CŽ není nutná

# Léky

---

- adrenalin
  - 1 mg i.v. každé 3 – 5 min, (2 – 3 mg i.t.)
  - vysoké dávky rutinně ne (předávkování beta-, Ca blokátory)
- vasopresin
  - není statistický rozdíl oproti A
  - 1 x 40 U i.v./i.o. jako náhrada 1. nebo 2. dávky A
- atropin
  - 1 mg i.v. každé 3 – 5 min (max 3 mg) při asystolii
- amiodaron
  - zlepšuje krátkodobé přežití do přijetí, lepší než lidokain
  - při VF/VT 300 mg i.v./i.o., možnost dalších 150 mg
- lidokain
  - jako alternativa, nezlepšuje přežití
  - 1 – 1,5 mg/kg i.v.
- magnesium
  - při torsades de pointes (nepravidelná polymorfní VT s prodlouženým QT)
  - 1 – 2 g/10 ml i.v.

# Tekutiny během CPR

---

- Bolus tekutin (20ml) po každé dávce léku
- Pacient s akutní krevní ztrátou – prasklé AAA, EUG; hemoragický šok

Roztoky:

- Krystaloidy – Ringerův, Hartmanův, FR
- Koloidy – želatina, hydroxyethylškrob
- Glc – vůbec neužívat – horší neurol. výsledek
- Nepodávat volum při zástavě bez deplece tekutin!

# Intervence dle ECR 2005

---

- potenciálně prospěšné
  - trombolýza (tPA)
- bez přínosu
  - stimulace u asystolie (nedoporučuje se), jen u symptomatické bradykardie (nebo vidíš P vlnu)
  - prokainamid u VF/VT
  - noradrenalin
  - prekordiální úder (ne u BLS, ? u ACLS)

# Poresuscitační péče

---

- indukovaná hypotermie
  - Dospělí pacienti po zástavě oběhu mimo nemocnici by měli být chlazení na 32 C to 34 C na 12 až 24 hodin, pokud byl úvodní rytmus VF. Podobná terapie může být přínosná pro pacienty s jiným úvodním rytmem, nebo při zástavě oběhu v nemocnici.
- kontrola glykemie
  - hyperglykemie spojena se špatnými neurologickými výsledky
  - Je rozumné striktně kontrolovat glykémii v poresuscitačním období.
- normokapnie, udržování CPP
- kontrola křečí, antikonvulzivní léčba

# VF

---

- Please Shock-Shock-Shock,  
EVerybody Shock,
- And Let's Make Patients Better

# VF

---

- (Please = precordial thrump)
  - Shock 200J nebo 360J
  - EVerybody = Epinephrine/Vasopressin
- 
- And = Amiodarone
  - Let's = Lidocaine
  - Make = Magnesium
  - Patients = Procainamide
  - Better = Bicarbonate

Asystole .....

Check me in another lead,  
then let's have a cup of TEA.

---

- (T = Transcutaneous Pacing)  
dnes již nedoporučeno
- E = Epinephrine
- A = Atropine

# PEA

---

- Problem (4H, 4T)
  - hypovolemie
  - hypoxie
  - hypotermie
  - H<sup>+</sup>
  - hypo/hyperkalemie
  - oTrava
  - tenzní PNO, tamponáda perikardu
  - tromboza a.cor.; PE
- Epinephrine
- Atropine

# Zapamatovat si!!!

---

Léky užívané v resuscitaci

- O<sub>2</sub>
- Adrenalin
- (Atropin)
- ((Amiodaron))

intratracheální podání

- Adrenalin
- Atropin
- Mesocain=lidokain
- Naloxon

Nejlépe by bylo pacientovi, pokud by k zástavě oběhu nedošlo

# CPR ve FNUSA - rok 2005

---

- 67 CPR
  - 30% na ARK
  - 70% oddělení
  - 1-4 ambulanti, chodník
- 80 hospitalizovaných CRP na ARK
  - 45% dobrý neurologický výsledek
  - 5% špatný neurologický výsledek
  - 50 % zmírá časně