

9th week: PROGRESS TEST 2. Pharmacy (L14). Grammar: Conditional clauses with **aby** I.

Přehrada – na přehradě (dam)

Hra o trůny

Jezdil jsem na kole

BYCH

- | | |
|---|--|
| 1. Chceš, abych byl/ a tady. (já) | You want me to be here. |
| 2. Chci, abys odešel/odešla. (ty) | I want you to leave. |
| 3. Chci, aby odešel/odešla/odešlo. (on/ona/ono). | I want him / her / it to leave. |
| 4. Chci, abychom odešli. (my) | I want us to leave. |
| 5. Chci, abyste odešli. (vy) | I want you to leave. |
| 6. Chci, aby odešli. (oni/ony/ona) | I want them to leave. |

Chci, abys – I want you **to**

Jdu do školy, abych studoval – I go to school **to** study.

Pracuju, abych měl peníze.

Pracuješ, abys měl peníze. You work to have money.

(housewife to husband): Pracuješ, abych měla peníze. You work so that I have money.

Spím, abych nebyl unavený.

Spíme, abychom nebyli unavený.

Byl jsem u doktora, abych se zeptal na výsledky. I was there **to ask** about my results.

Říkám ti, abys šel domů. I tell you to go home.

Lékárna

- Pharmacy
- je obchod, kde můžeš koupit léky, kondomy, speciální šampony, vitamíny, kapky (drops), krémy, pleny, náplasti, obvazy
- je obchod s léky

V lékárně: use „aby“ structures

1. Šel jsem do lékárny — **abych se nezeptal** na něco proti kašli.
2. Petr byl v lékárně — aby nekoupil kapky do očí. (koupit kapky do očí.)
3. Užívám ty léky – abych se necítila lépe. (cítit se lépe.)
4. Lékárník mi řekl — abych nebral ... (brát ten lék dvakrát denně.)
5. V lékárně chtěli – aby nezaplatila hotově. (ona) zaplatit hotově.

6. Lékárník jí řekl – aby nezvýšila dávky. (zvýšit dávky)
 - a. Vysoký > vyšší: zvýšit
 - b. Nízký > nižší > snížit
7. Řekli mu – aby nepočkal na recept (počkat na recept.)
8. Doporučujeme vám — abyste více necvičili (více cvičit).

Abyste

Chci, abyste seděl.

Sed'te!

Můžete prosím sedět?

Chci, abyste **šel** domů. × Chci, abyste **nechodil** domů.

Chci, abyste jel do školy.

Chci, abyste **si** sundal brýle.

Chci, abyste **používal** brýle. Abyste si vzal brýle.

Chci, abyste pil vodu.

Chci, abyste si lehnul.

Chci, abyste ležel celý týden v posteli.

Chci, abyste vstával.

Chci, abyste zavřel oči. (zavřít)

Chci, abyste otevřel ústa.

Chci, abyste **nedýchal**. I want you not to breathe.

nadýchat

Chci, abyste se nadechl. (to take the breath)

Chci, abyste vydechl.

Chci, abyste řekl ááá.

Chci, abyste se nehýbal.

Chci, abyste nekouřil.

Chci, abyste nepil alkohol a pivo.

Dialog: V lékárně. Listen and fill in.

- **Lékárník:** Dobrý den. Přejete si?
- **Pacient:** Mám rýmu a kašel. Chtěl bych nějaké **kapky** do nosu nebo sprej. Co mi můžete doporučit? (*recommend*)
- **Lékárník:** Máme nové **kapky**. Jsou velmi dobré a nejsou drahé.
- **Pacient:** **Jak často** je mám brát? How often

- **Lékárník:** Dvakrát denně dvě **kapky** do každé nosní dírky. Neužívejte je déle než pět dní. **Kapky by neměly mít žádné** vedlejší účinky (*any side effects*). Kromě **kapek** můžete dostat ještě sirup, ale ten je jen na **předpis**.
- **Pacient:** A co na ten kašel? Hodně mě trápí.
- **Lékárník:** Je to **suchý** dráždivý kašel, nebo **vlhký** kašel?
- **Pacient:** Je spíše suchý a dráždivý.
- **Lékárník:** Dobře. Máme sirup za osmdesát korun, je bez lékařského **předpisu**.
- **Pacient:** Děkuji moc, ještě bych potřeboval Paralen pro tříletou dceru.
- **Lékárník:** Ano, prosím. Tady jsou **tablety** za dvacet čtyři korun. Přečtěte si pozorně instrukce.

dvě **kapky** do každé nosní dírky (genitive of singular)

dvě **kapky** do **obou** nosních dírek (genitiv of plural)

PARALEN 125: Odpovězte na otázky

Složení: Účinná látka: paracetamol 125 mg v 1 tabletě

Indikační skupina: Antipyretikum, analgetikum (**ke snížení** horečky a bolesti) charakteristika: Tablety 125 se podávají dětem od batolecího věku (9 měsíců) ke snížení zvýšené tělesné teploty **při** chřipkových a jiných horečnatých onemocněních, **při** bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů a **pohybového** ústrojí. (nehýbejte se = do not move)

- **Používá se** paralen ke zvýšení teploty? **Is it used** to increase the temperature?
- Paralen mohou **užívat** i novorozenci?
- Paralen se používá při bolestech? Pokud ano, při jakých?

Kontraindikace: Tablety 125 se nesmějí podávat při přecitlivělosti na některou složku přípravku, při těžším onemocnění ledvin a jater nebo při akutní žloutence. Přípravek se nedává dětem mladším než 9 měsíců nebo s tělesnou hmotností menší než 9 kg.

- Kdo nesmí užívat paralen?

Nežádoucí účinky: Tablety Paralen 125 v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. U citlivějších jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí u dítěte se o dalším podávání přípravku dítěti poraďte s lékařem.

- Jaké nežádoucí účinky má paralen?
- Co dělat v případě nežádoucích účinků?

Interakce: Účinky tablet Paralen 125 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Současné užívání tablet Paralen 125 a některých léků na spaní, léků proti epilepsii a některých antibiotik může způsobit poškození jater. V případě, že dítě užívá jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání tablet Paralen 125 s lékařem. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá Paralen 125 tablety.

- S jakými léky není možné paralen kombinovat?

Dávkování a způsob použití: Tablety Paralen 125 se podávají podle potřeby 3× denně v časových odstupech nejméně 6 hodin v následujících dávkách: Dětem o hmotnosti:

9–12 kg

1 tableta

| | |
|----------|---------------|
| 13–16 kg | 1 a ½ tablety |
| 17–20 kg | 2 tablety |

Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí.

- Kolik tablet může užívat dospělý člověk denně a jak často?