

# Organizace skladování a výdeje transfuzních přípravků Sekundární výroba

SIMONA HOHLOVÁ

TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ



# Osnova

- ▶ Definice + obecné poznámky
- ▶ Příjem TP na sklad
- ▶ Skladování TP
- ▶ Monitorování TP
- ▶ Výdej TP
- ▶ Transport TP
- ▶ Sekundární úprava TP

# Organizace skladování a výdeje TP

- ▶ Vyhláška MZ ČR 143/2008 (vyhláška o lidské krvi)
- ▶ Skladovací podmínky musí zajistit optimální životnost a funkčnost skladovaných TP po celou dobu jejich skladování
- ▶ Uložení TP nesmí vést k jejich mechanickému poškození či bakteriální kontaminaci (produktu i vaku)
- ▶ Nutno zajistit celistvost balení, ochrana před znečištěním, poškozením a záměnou
- ▶ Dodržení doby použitelnosti TP a suroviny pro další výrobu
- ▶ Nutná:
  - ▶ validace postupů skladování a distribuce
  - ▶ písemné postupy a záznamy
- ▶ Systém kvality ZTS - správná výrobní praxe


# Organizace skladování a výdeje TP

- ▶ Zařízení transfuzní služby (ZTS) = výrobci transfuzních přípravků
- ▶ **Transfuzní přípravky:**
  - ▶ individuálně vyráběné léčivé přípravky (IVLP), které plní výhradně substituční funkci
  - ▶ vyráběny z krve dobrovolných bezplatných dárců, vždy z krve jednoho dárce, z jednotlivého odběru nebo aferézy
  - ▶ výjimka: směsné trombocyty, kryoprotein (obvykle směs krevních složek od 4-6 různých osob-dárců krve)
  - ▶ expedovány nativní nebo zmrazené
  - ▶ baleny ve vacích(PVC-DEHP-ftaláty)
  - ▶ v ČR t.č. nejsou povinně ošetřeny metodami inaktivace patogenů

# Organizace skladování a výdeje krevních derivátů

## ► Krevní deriváty

- ▶ hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP)
- ▶ vyráběny komerčně ve frakcionačních centrech
- ▶ ze směsí plazmy od tisíců osob nebo rekombinanbními technikami (koagulační faktory VII, VIII a IX)
- ▶ jsou povinně ošetřeny metodami inaktivace patogenů minimálně dvěma způsoby (eliminace obalených a neobalených virů)
- ▶ baleny ve skle nebo PVC vacích (FLEXBUMIN)
- ▶ expedovány nativní nebo lyofilizované s nutnou rekonstitucí
- ▶ jsou považovány za mnohem bezpečnější z hlediska možného přenosu krvi přenosných chorob než transfuzní přípravky
- ▶ Skladování: většina 2-6°C, při pokojové teplotě do 25°C (Willfact), při -18°C a nižší (Octaplas)



Kontrolujeme:

- ▶ vzhled a neporušenost obalu
- ▶ správnost a úplnost dokumentace
- ▶ úplnost údajů na štítku přípravku a jejich shodu s dodanou dokumentací včetně zajistění podmínek skladování během přepravy



- ▶ bezpečné a oddělené skladování TP
- ▶ autologní TP oddělené od alogenních
- ▶ **doporučené vlastnosti skladovacího zařízení:**
  - ▶ dostatečná kapacita
  - ▶ vhodné osvětlení
  - ▶ snadný přístup
  - ▶ požadavky na bezpečnost práce a snadnou údržbu
    - ▶ sanace (desinfekční prostředky - silné detergenty)
  - ▶ musí splňovat bezpečnostní a technické předpisy ČR
  - ▶ v případě selhání zařízení pro skladování nebo selhání dodání el.energie
    - ▶ zaveden náhradní režim - postupy stěhování, náhradní skladovací prostory
  - ▶ napojení na náhradní zdroj



## ► teplota

- ▶ teplota rovnoměrná (homogenní) v celém skladovacím prostoru
- ▶ pravidelně kontrolovaná nepřetržitým monitorováním
  - ▶ teplota se zaznamenává v intervalu nejméně 15 minut
- ▶ oznámení odchylky teploty - alarm - akustický, optický
- ▶ pravidelné testování alarmu - min. 1x týdně
- ▶ centrální monitorovací jednotka, na kterou jsou napojena teplotní čidla všech skladovacích prostor ZTS (TTO - Falcon)
- ▶ u komorových zařízení - snímače registrující otevření dveří
- ▶ v zařízení na skladování trombocytů - snímač pohybu třepačky

# Erytrocytové TP

## **Teplota:**

Od +2°C do +6°C, komorová lednice

## **Doba skladování:**

21-49 dnů ode dne odběru v závislosti na použitém konzervačním roztoku

- ery z PK do CPD                  21 dnů
- ery z PK do CPD-A1              35 dnů
- ery v SAGM                        42 dnů

## **Transport:**

+1°C do +10°C, max 24 hod

Odděleně TP pro:

- aktuální zásobu
- konkrétní pacienty (s platným testem kompatibility)
- autologní TP

Přípravky nevyšetřené, určené k likvidaci a proexpirované TP - musí být skladovány odděleně.

Hemolýza na konci doby skladování méně než 0,8%.

Při poklesu teploty pod 0°C jsou ery TP likvidovány

# Trombocytové TP

**Teplo:**

Od +20°C do +24°C, inkubátor s agitátory

**Doba skladování:**

5-7 dnů, v závislosti na použitých roztocích a provedení vyšetření sterility přípravku

**Transport:**

Od +20°C do +24°C, při přepravě kratší než 10 hod není třeba zajišťovat třepání

**Agitace:** zajišťuje výměnu plynů přes stěny vaků

# Plazmové TP

**Teplo:**

-25°C a nižší, mrazící skříně, pulty, komory

**Doba skladování:**

-25°C a nižší	36 měsíců
-18 až -25°C	3 měsíce

**Transport:**

Teplota shodná s teplotou skladování

Zachování funkce koagulačních faktorů (zejm. f.VIII) a přirozených inhibitorů koagulace - zajištěno šokovým zmrazením během 1 hodiny v jádře vaku na teplotu -30°C.

**Před použitím:**

rozmražení při teplotě 37°C v kontrolovaném prostředí, po rozmražení nesmí být v plazmě sraženiny.

# Plazmové TP

## **FFP = fresh frozen plazma**

- ▶ **z odběru PK**
  - oddělí se do 6-ti hod po odběru PK, nejdéle do 18-ti hod.
  - pokud zchlazení na 20-24°C, lze před centrifugací skladovat až 24 hod.
- ▶ **aferetická**
  - do 6-ti hod. šokové zmražení

## **KP = kryoprotein**

plazma se rozmrazuje při teplotě 2-6°C, při následné centrifugaci se oddělí kryoprotein od supernatantní plazmy, která se odstraňuje do satelitního vaku

**Objem:** 30-40ml - šokově se zmrazuje

**Obsah:** fVIII, vWF, fbg, f.XIII, fibronectin

# Granulocyty

**Teplo:**

Od +20°C do +24°C

**Doba skladování:**

krátkodobě, určeny k okamžitému podání, max 24 hod bez třepání

**Transport:**

Od +20°C do +24°C

- připravují se aferézou od dárce po předchozí stimulaci kostikoidy nebo G-CSF
- granulocyty resuspendovány v plazmě (TP <500ml,  $0.9-1.2 \times 10^{10}$ /jednotka)
- přípravek obsahuje příměs erytrocytů=>nutný test kompatibility
- vždy ozářit!

# Kryokonzervace

**Erytrocyty** - kryokonzervace možná 7 dnů po odběru přidáním glycerolu a následným zmražením

**Teplosta skladování:**

-60°C až -80°C, elektrický mrazicí box, při přidání glycerolu o vysoké koncentraci  
-140°C až -150°C, v parách kapalného dusíku, při přidání glycerolu o nízké koncentraci

**Doba skladování:**

30let

**Před použitím:**

rozmrážení a odstranění kryoprotektiva promýváním, přidání resuspenzního roztoku, podat co nejdříve po přípravě, krátkodobé skladování (do 24 hod) a transport při teplotě 2-6°C

# Kryokonzervace

**Trombocyty** - kryokonzervace zahrnuje přidání kryoprotektivního roztoku k původnímu přípravku trombocytů do 24 hod a následné zmražení.

**Teplota skladování:**

-80°C v elektrickém mrazicím boxu, kryoprotektivum dimetyl sulfoxid (DMSO 6%)  
-150°C v parách kapalného dusíku

**Doba skladování:**

24 měsíců

**Před použitím:**

rozmražení a odstranění kryoprotektiva promýváním, přidání resuspenzního roztoku, podat co nejdříve po přípravě, krátkodobé skladování (do 12-ti hod) a transport při teplotě 20-24°C

Po rozmražení trombocytů není přítomen „swirling“ fenomén



- ▶ provádí pracovník, který je oprávněn provádět výdej na základě písemného pověření
- ▶ TP je vydán na základě žádanky (Žádanka o výdej TP)
- ▶ vydaný TP je provázen dokumentací, která umožňuje ověřit název a adresu vydávajícího ZTS, identifikační údaje ZZ, které je odběratelem TP, identifikační číslo a název TP, příp. požadavky na přepravu
- ▶ příbalový leták
- ▶ dále umožňuje ověřit datum provedení a výsledek předtransfuzního imunohematologického vyšetření (pokud se provádí) a podpis zaměstnance, který vyšetření provedl
- ▶ pokud TP pro konkrétního pacienta - jméno, příjmení, rodné číslo
- ▶ ZTS
  - ▶ vydávají TP pro hemoterapii pro daného pacienta
  - ▶ prodávají jiným ZTS



- ▶ během transportu musí být dodrženy skladovací podmínky pro jednotlivé typy TP
- ▶ dobu přepravy omezit na minimum
- ▶ přepravní boxy vytemperované dle typu TP před vložením TP, označené, chrání TP před poškozením během přepravy
- ▶ skladovací podmínky během transportu jsou monitorovány, pravidelně kontrolovány a validovány
- ▶ přeprava odebrané krve (meziproduktu), krevních vzorků a TP při teplotě 20-24°C
  - ▶ ve validovaných termoboxech/validovaném prostoru přepravního vozlu s řízeným tepelným režimem
- ▶ skladování a přeprava mimo teplotní limit - havarijní mimořádné situace - o dalším použití TP/meziproduktů rozhoduje kvalifikovaná osoba ZTS

# Sekundární výroba

Deleukotizace

Ozařování

Dělení TP

Promývání TP

## Deleukotizace

### Definice

- ▶ **deleukotizace** = leukodeplece
- ▶ odstranění leukocytů z transfuzního přípravku na hodnotu  $<1 \times 10^6$  leukocytů na jednotku
- ▶ **prestorage** - v procesu výroby TP
- ▶ **poststorage** - před podáním pacientovi (výhradně filtrace) - laboratorní, výběr TP do 10-ti dnů po odběru, exspirace se nezkracuje
- ▶ **deleukotizace u lůžka pacienta** (tzv. bed-side filtrace) - méně bezpečná, uvolnění bradykininu z filtru - riziko těžké hypotenze s rozvojem šokového stavu

## Deleukotizace

### Indikace

- ▶ opakované febrilní nehemolytické potransfuzní reakce v anamnéze
- ▶ při průkazu cytotoxických HLA protilátek
- ▶ při průkazu antigranulocytárních protilátek
- ▶ chronická léčba transfuzními přípravky (pacienti v dialyzačních programech, hematoonkologičtí pacienti)
- ▶ před a po orgánových transplantacích (kostní dřeň, srdce, ledviny, játra)
- ▶ imunosuprimovaní pacienti
- ▶ nedonošené děti a novorozenci
- ▶ intrauterinní transfuze
- ▶ těhotné ženy
- ▶ u dětí po operacích srdce a velkých cév

- ▶ představuje účinnou prevenci proti TA-GvHD (*transfusion associated graft versus host disease* = s transfuzí spojená reakce štěpu proti hostiteli), může vznikat po aplikaci transfuzních přípravků jedincům s nevyvinutým nebo poškozeným imunitním systémem
- ▶ ozařuje se paprsky gamma v dávce 25-50Gy, zdroj radionuklid Cs
- ▶ **princip:**
  - ▶ zničení viability T lymfocytů, zablokováním jejich proliferační aktivity
  - ▶ destrukce buněčné membrány ery (akceptovatelná hemolýza)
    - ▶ ozařujeme TP 14 dnů po odběru, doba exspirace se zkracuje na 28 dní
- ▶ ozáření TP nenahrazuje deleukotizaci a neníčí žádná krví přenosná agens

## Ozařování TP

## Indikace

- ▶ primární nebo sekundární imunologický defekt
- ▶ orgánové transplantace a transplantace krvetvorných buněk
- ▶ vysokodávkovaná chemoterapie
- ▶ Hodgkinova choroba
- ▶ celotělové ozáření
- ▶ intrauterinní transfuze
- ▶ transfuze novorozencům
- ▶ transfuzní přípravky získané od pokrevních příbuzných
- ▶ transfuze HLA kompatibilních transfuzních přípravků

## Dělení TP

- ▶ v situacích, kdy je nutné pro pacienta zajistit menší objem transfuzního přípravku (pediatrický pacient)
- ▶ TP můžeme rozdělit (nebo oddělit jeho část) - pomocí sterilní svářečky (zabezpečení uzavřeného systému výroby)
- ▶ nový TP ➔ nové číslo TP

## Dělení TP

### Erytrocyty

- ▶ tzv. pediatrická jednotka = erytrocyty pro podání novorozencům a kojencům
  - ▶ objem 25-150ml (15ml/kg)
  - ▶ čerstvé, do 5 dnů

(při delším skladování erytrocytů vzrůstá extracelulární koncentrace K-riziko pro dítě s nízkou tělesnou hmotností)
- ▶ deleukotizované (prevence přenosu CMV transfuzí)
- ▶ ozářené (prevence TA-GvHD), 25-50Gy, podat do 48hod
- ▶ náhradní roztok v TP (ve FN Brno se nelisí od TP pro dospělé pacienty)

## Dělení TP

### Trombocyty

- ▶ pediatrická jednotka trombocytů – trombocyty z aferézy  
deleukotizované resuspendované v náhradním roztoku SSP+
- ▶ indikace u dětí:
  - ▶ ŽOK, těžké trombocytopenie (zvýšená utilizace nebo nižší produkce v KD)
  - ▶ při hodnotách méně než  $50 \times 10^9/l$  (hematoonkologie méně než  $10 \times 10^9/l$ , pokud nejsou krvácivé projevy)
- ▶ dodržování ABO RhD kompatibility - standard
- ▶ 5-10 ml/kg

## Promývání TP

- ▶ erytrocytů, trombocytů fyziologickým roztokem = odstranění plazmatických bílkovin obsažených v původním přípravku
- ▶ po centrifugaci se odstraní supernatant a přidá se resuspenzní roztok, postup se opakuje 2-3x
- ▶ při použití FR je nutné zkrátit exspiraci i při práci v uzavřeném systému (5 dní)
- ▶ „ERYTROCYTY PROMYTÉ“ 40gHb, htk 0,65-0,75, obsah bílkoviny ve finálním supernatantu je nižší než 0,5g na jednotku
- ▶ indikace:
  - ▶ závažné alergické reakce na příměs plazmatických proteinů v TP
  - ▶ prevence potransfuzní reakce u pacientů s IgA deficitem a současně přítomnou protilátkou anti-IgA
  - ▶ není náhrada deleukotizace