

## Casuistry III. PSYCHIATRY

(<http://mluvtecesky.net/en/courses/medical3/9/1>). SURGERY

<http://mluvtecesky.net/en/courses/medical3/1/1-13>). Grammar:

Declension of numbers 2, 3, 4 etc. (L 18).

Pád	dva / dvě	Tři	čtyři	pět	(pacienti / pacientky)
<b>nominativ</b>	dva/dvě	Tři	čtyři	pět	(pacienti / pacientky)
<b>genitiv</b>	dvou	<b>Tří/třech</b>	<b>Čtyř/čtyřech</b>	pěti	(pacientů / pacientek)
<b>dativ</b>	dvěma	třem	čtyřem	pěti	(pacientům / pacientkám)
<b>akuzativ</b>	dva	tři	čtyři	pět	(pacienty / pacientky)
<b>lokativ</b>	dvou	třech	čtyřech	pěti	(pacientech / pacientkách)
<b>instrumentál</b>	dvěma	třemi	čtyřmi	pěti	(pacienty / pacientkami)

— Oba/obě = declension like dva/dvě

— Number 6+ = declension like 5 (exception: devět – devíti, deset – desíti)

— Number 100 = declension like „pivo“

— 25 = dvacet pět = od dvaceti pěti; pětadvacet = od pětadvaceti

**Dejte výrazy v závorce do správného tvaru (dva, dvě; oba, obě; tři; čtyři):**

1. Bojím se těch (2) \_\_\_\_\_ psů.
2. Bydlí spolu se (3) \_\_\_\_\_ kočkami.
3. Mluvíme o těch (4) \_\_\_\_\_ holkách.
4. Nemůžu žít bez (2) \_\_\_\_\_ věcí: čaje a mobilu.
5. Řekni to těm (2) \_\_\_\_\_ pánům.
6. Četla jsem o (3) \_\_\_\_\_ modelkách.
7. Byl jsem tam se (3) \_\_\_\_\_ kamarády.
8. Vidíš tu zahradu se (4) \_\_\_\_\_ stromy?
9. Uděláme to i bez (2) \_\_\_\_\_ kolegů.
10. Dám to svým (3) \_\_\_\_\_ dětem.
11. Četla jsem o (4) \_\_\_\_\_ filmech.
12. Mluvil jsem se (2) \_\_\_\_\_ doktory.
13. Chodil do školky od (3) \_\_\_\_\_ let.
14. Ve (4) \_\_\_\_\_ letech onemocněl.
15. To je dárek od (2) \_\_\_\_\_ sester.
16. Řekl to (3) \_\_\_\_\_ lidem.
17. Zúčastním se (2) \_\_\_\_\_ setkání.
18. Snědl guláš se (4) \_\_\_\_\_ knedlíky.

**Dělejte správné formy**

1. Mluvili jsme o \_\_\_\_\_ (oba dva problémy).
2. Musíme prodat \_\_\_\_\_ (obě dvě auta).
3. Půjdu do kina s \_\_\_\_\_ (obě dvě kamarádky).
4. Zatelefonoval jsem \_\_\_\_\_ (oba dva bratři).
5. Napsala jsem ti o \_\_\_\_\_ (obě dvě věci).

6. Povídal jsem si s \_\_\_\_\_ (obě dvě kolegyně).
7. Zúčastním se \_\_\_\_\_ (obě dvě konference).
8. Zabýváme se \_\_\_\_\_ (obě dvě aféry).
9. Zeptám se \_\_\_\_\_ (oba dva učitelé).
10. 1Mám strach z \_\_\_\_\_ (oba dva psi).

### Dělejte správné formy

Narodila jsem se v roce 1950. Ve (2) \_\_\_\_\_ letech mě maminka dala do jeslí, protože musela jít do práce. Ve (3) \_\_\_\_\_ letech jsem šla do školky, kam jsem chodila do (6) \_\_\_\_\_ let. V (6) \_\_\_\_\_ letech jsem šla do první třídy. Do (15) \_\_\_\_\_ let jsem chodila na základní školu a od (15) \_\_\_\_\_ do (19) \_\_\_\_\_ let jsem chodila na ekonomickou střední školu. V (19) \_\_\_\_\_ jsem začala pracovat jako sekretářka v továrně, ale po (2) \_\_\_\_\_ letech jsem odešla do jiné firmy. Ve (23) \_\_\_\_\_ letech jsem se vdala a ve (25) \_\_\_\_\_, (28) \_\_\_\_\_ a (30) \_\_\_\_\_ letech se mi narodily děti. Ve (40) \_\_\_\_\_ jsem se rozvedla, protože manžel se zamiloval do mladší odešel od nás. Myslela jsem, že už zůstanu se (3) \_\_\_\_\_ dětmi sama, ale ve (47) \_\_\_\_\_ jsem se seznámila s mužem, kterého jsem si po (3) \_\_\_\_\_ letech vzala. V (50) \_\_\_\_\_ letech jsem se vdala podruhé. V (52) \_\_\_\_\_ letech jsem onemocněla, ale po (2) \_\_\_\_\_ letech se moje nemoc trochu zlepšila. V (55) \_\_\_\_\_ letech jsem přesto musela jít do invalidního důchodu. Od (59) \_\_\_\_\_ let bydlím na vesnici, kde jsme koupili dům se zahradou, a byt ve městě jsem nechala svým (3) \_\_\_\_\_ dětem. Do města už teď jezdíme jenom proto, abychom koupili jídlo našim (4) \_\_\_\_\_ kočkám a (2) \_\_\_\_\_ psům. Můj manžel je o pár let starší než já, ale i v (65) \_\_\_\_\_ letech je zdravý a veselý. Často si říkáme, že bychom takhle chtěli žít aspoň do (100) \_\_\_\_\_ let!

### Je to pravda? (<http://mluvtecesky.net/en/courses/medical3/9/3>)

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Pan Horák kontroluje vše po návratu domů.              | ANO × NE |
| 2. Potíže pana Horáku jsou horší než dřív.                | ANO × NE |
| 3. Potíže pana Horáka se projevují pouze v rodině a doma. | ANO × NE |
| 4. Potíže pana Horáka mu překáží v běžném životě.         | ANO × NE |
| 5. Pan Horák má také fyzické problémy.                    | ANO × NE |

### Spojujte

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. problémy s chováním      | A. |
| 2. vztah se sourozenci      | B. |
| 3. pokus o sebevraždu       | C. |
| 4. strach z smrti           | D. |
| 5. potíže v práci           | E. |
| 6. komplikace v těhotenství | F. |
| 7. strach o život           | G. |

## Chirurgie

### Spojíte

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jak se vám to stalo?                      | A. Nevím, probudila jsem se až v nemocnici.       |
| 2. Pamatujete se, jak se vám to stalo?       | B. Před dvěma hodinami.                           |
| 3. Kdy k tomu úrazu došlo?                   | C. Zakopla jsem ve tmě o koberec.                 |
| 4. Kde jste upadla?                          | D. Jen jsem si ji vypláchl vodou.                 |
| 5. Jak jste upadla?                          | E. Ne, nejde to.                                  |
| 6. Kde vás to nejvíc bolí?                   | F. Když jsem vystupovala z autobusu.              |
| 7. Dával jste si na ránu nějakou dezinfekci? | G. Krájela jsem maso a uřízla jsem si část palce. |
| 8. Můžete pohnout nohou?                     | H. Tady kolem zápěstí.                            |

### Doplňujte slova z nabídky.

Slezina, zlomenina, Transfuze, anestezie, zákrok, krvácení, ložisko (centre, focus), chirurg, odstranění, náhrada, kýla

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. utržená      | 7. ohraničené |
| 2. komplikovaná | 8. plastický  |
| 3. krevní       | 9. částečné   |
| 4. celková      | 10. urgentní  |
| 5. chirurgický  | 11. umělá     |
| 6. masivní      | 12. břišní    |

### Jaké je sloveso?

Model: operace – operovat

1. náhrada
2. léčba
3. hojení
4. příprava
5. odstranění
6. návrat
7. očkování
8. náraz
9. pád
10. pohyb

## Kazuistika: dělejte otázky (čísla); odpovězte na otázky

Pacientka, **1) 79 let**, vdova, **2) ve starobním důchodu**, **3) dříve pracovala jako švadlena**. Od r. 2008 žila v domově pro seniory, **4) byla plně soběstačná**. V době sebevraždy měla v anamnéze stp. TEP coxae l. sin. (2007), DM II. na dietě a PAD od r. 1994, hypertenzní chorobu od r. 1993, chronickou pankreatitis, ICHS, stp. IM (1986), stp. CHCE (1975), **5) stp. hysterektomii, stp. polypektomii adenomu rekta (2001)**, praktickou hluchotu.

**6) V rodině pacientky se nikdo na psychiatrii neléčil. 7) Alkohol nepila, nekouřila. 8) U psychiatra byla vyšetřena pouze jednou** v prosinci 2009. Dlouhodobě užívala zolpidem, jen 1 tbl. denně, v podstatě si jen přišla pro předpis, dosud jí léky psal praktický lékař.

Popírala, že by jí **9) kolísala nálada, 10) hmotnost se jí neměnila**, zvláštní zážitky nikdy neměla. Popírala **11) myšlenky na sebevraždu**. Pacientce byla nabídnuta alternativní léčba antidepresivy (trazodon nebo mirtazapin), což odmítla, protože údajně nepotřebovala více zolpidemu než 1 tbl. denně, a to považovala za postačující. Byla objednána na kontrolu za 3 měsíce.

V dokumentaci pacientky je uvedeno, že začátkem dubna 2010 navštívila svého praktického lékaře na pravidelnou kontrolu tlaku, cestou upadla na zem, byla v bezvědomí, udávala bolesti za sternem a říkala, „že asi umře a chtěla by, aby už nedělala potíže“. Byla odvezena RZP do nemocnice na vyšetření.

Následně byla necelý týden hospitalizována ve FNKV, v laboratorním vyšetření byly kardi specifické enzymy opakovaně negativní, negativní D dimery, EKG bez známek akutní ischemie, echokardiograficky normální funkce levé komory, bez významné chlopenní vady, částečně organizovaný perikardiální výpotek bez známek tamponády. V močovém sedimentu přítomna bakteriurie a leukocyturie, byla nasazena ATB terapie.

V neurologickém konziliu zaznamenány opakované úzkostné stavy. Propuštěna oběhově stabilní. Doporučená medikace: Prestarium, Furon, Glimepirid, Ranisan, Degan, Siofor, Isochol, Neuro 0,5 mg tbl. 1-0-1.

Po propuštění vyhledala praktického lékaře na kontrolu tlaku, opět byla bez obtíží a den poté spáchala sebevraždu – suicidovala skokem z okna v domě, kde žila její dcera.

1. Pacientka žila v domě své dcery. ANO × NE
2. Pacientka slyší bez problémů. ANO × NE
3. Pacientka hubnula. ANO × NE
4. Při návštěvě praktického lékaře se pacientka pokusila o sebevraždu. ANO × NE
5. Pacientka trpěla úzkostmi. ANO × NE