

MALIGNÍ NÁDORY KOSTÍ

Janíček, P., Pazourek L.,
Ondrůšek Š.

Výukový specialista: Doc. MUDr. P. Janíček, CSc.

Garant kurzu: doc. MUDr. Z. Rozkydal, Ph.D.

Konkrétní výuka: Ortopedie a rehabilitace VLOR7X1

Rozsah a typ výuky: cvičení 45 minut

Význam VJ: cílem je podat základní znalosti o nádorech muskuloskeletálního systému

Anotace VJ:

VJ seznamuje s dělením, klasifikací, diagnostikou, léčbou benigních a maligních nádorů kostí a kloubů, dále nádorům podobných afekcí a benigních a maligních nádorů měkkých tkání pohybového aparátu. Uvádí rozvahu o diferenciální diagnóze a zahrnuje poznámky o prognóze těchto stavů.

Klíčová slova: nádory, nádory kostí a kloubů

Seznam významných pojmu ve VJ:

Benigní nádory kostí a měkkých tkání

Maligní nádory kostí a měkkých tkání

Nádorům podobné afekce pohybového aparátu

Learning outcomes:

Student má mít na konci kurzu základní teoretické znalosti o klasifikaci, diagnostice a léčbě benigních a maligních muskuloskeletálních nádorů.

Z praktických dovedností má mít teoretické znalosti o klasifikaci, diagnostických metodách u kostních nádorů, o jejich léčbě a diferenciální diagnóze.

Má mít základní informace o prognóze těchto stavů.

Doporučené studijní zdroje:

Ortopedie: Pavel Janíček, CSc. a kol.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Brno, 2007.
ISBN 978-80-210-4429-6 (2. vyd.)

1. KOSTNÍ SARKOMY

KOSTNÍ SARKOMY

• KOSTNÍ SARKOMY

• KOSTNÍ SARKOMY

• KOSTNÍ SARKOMY

• KOSTNÍ SARKOMY

OSTEOSARKOM

Nejčastější primární maligní kostní nádor
po mnohočetném myelomu

Je charakterizovaný tvorbou
nádorového osteoidu

Epidemiologie

- 2 nové případy za rok na 1 mil. obyv.
- nejčastěji v 2. dekádě věku
- nejčastěji v metafýzách dlouhých kostí

Nejčastěji: oblast kolena

1. dist.femur
2. proxim.tibiae
3. proxim.humerus

Etiologie

- růstový spurt
- genetické abnormality
 - germ. mutace RB1 genu
 - germ. mutace p53 genu
- ozáření
- m. Paget
- další kostní choroby

Klasifikace

Primární

Centrální

- High-Grade
 - **Konvenční (80 – 90%)**
 - Osteoblastický
 - Chondroblastický
 - Fibroblastický
 - **Telangiektatický**
 - **Malobuněčný**
- Low-Grade

Periferní

- Low-Grade
 - **Parostální**
 - **Periostální**
- High-grade

Sekundární (postradiační, při M.Paget, ...)

Symptomy

- bolest
 - typicky klidová a noční
 - často anamnesticky spojována s traumatem nebo fyzickou aktivitou
- zduření (nemusí být palp. bolestivé)
- patologická fraktura
- metastázy v době stanovení dg. v 10-25% pac.

Diagnostika

- RTG
- CT / MRI
- Scintigrafie skeletu
- RTG a CT plic
- Sono břicha
- Biopsie

Typický RTG obraz konvenčního OSA

- ložisko změněné struktury kosti
 - sklerotické
 - lytické
 - smíšené
- neohraničenost
- periostální reakce
 - Codmannův trojúhelník
 - spikuly
 - hořící prérie (sunburst)
- lokalizace – metafýzy dlouhých kostí

RTG obraz konvenčního high-grade osteosarkomu – distální femur



RTG obraz konvenčního high-grade osteosarkomu – proximální tibie



Typický RTG obraz parostálního OSA

- Osifikovaný laločnatý útvar vycházející z povrchu kosti
- Bez souvislosti se dřeňovou dutinou
- Centrum léze je nejvíce osifikované
- Lokalizace – dorzální strana distálního femoru a proximální tibie

RTG obraz parostálního osteosarkomu distálního femoru



Terapie

- neodjuvantní chemoterapie
- operace - radikální resekce / amputace
- adjuvantní chemoterapie
- event. + plicní metastazektomie

- chemoterapie podle protokolu EURAMOS
 - užívaná cytostatika: (metotrexat, doxorubicin, adriamycin, cisplatina, ifosfamid, etoposid)
- u low-grade OSA většinou pouze chirurgická terapie

- radiorezistentní nádor


Prognostické faktory

- přítomnost metastáz
 - velikost nádoru
 - axiální lokalizace
 - histolog. typy (lepší prognózu má parostální a periostální OSA)
-
- radikalita chir. výkonu
 - odpověď na chemoterapii
 - genetické markery

Prognóza (5-leté přežití)

- 60- 70% - konvenční high-grade OSA
 - bez makroskop. zn. disseminace
 - dobrá odpověď na CHT
 - do 10% vitálních nádorových buněk
 - Špatná prognóza:
 - pac. s metastázami
 - špatnou odpovědí na CHT a kde není možné kompletní chir. odstranění
- 90% - u low-grade typů OSA po adekvátní op.

Kasuistika – muž 25 r.



**Základem je včasná
diagnostika**

tj. mít onkologický reflex

- Sportovec, fotbalista
- Bolesti L kolena
- Léčen více než $\frac{1}{2}$ roku u PL lok. NSA
- Nebylo ani RTG ani ortopedické vyšetření
- Nakonec při stanovení dg. již disseminace do skeletu a plic
- Prognóza infaustrní, jen palliativní terapie

CHONDROSARKOM

Primární maligní kostní nádor vycházející
z chrupavky

Epidemiologie

- Tvoří asi 10% primárních malig. kostních nádorů
- Nejčastěji ve věku:
 - u primárních CHoSA: 40 – 60 let
 - u sekundárních CHoSA: 25 – 45 let
- Lokalizace – nejčastěji pánev, proximální femur, lopatka, proximální humerus

Etiologie

- Primární – neznámá
- Sekundární – malignizace preexistujících benigních chrupavčitých lézí:
 - Mnohočetné enchondromy- M.Ollier, Maffucci sy, event. i solitární enchondromy
 - Exostózová choroba, event. u solit. osteochondromů (chrupavčitá čepička nad 2 cm)
 - Další (chondroblastom, chondromyxoid-fibrom)

Klasifikace

- Konvenční (80%)
 - Primární
 - Sekundární
- Další histologické subtypy (20%)
 - Dediferencovaný (high-grade)
 - Mesenchymální (high-grade)
 - Světlobuněčný (low-grade, typicky v epifýzách)
- Důležitý je Grading (G1-GIII)

Symptomy

- Zduření
- Narůstající bolest
- Typický pomalý růst u konvenčních low-grade CHoSA, příznaky se rozvíjí pomalu
- Bolest bez patolog.fr. je důležitýn diff.dg. znakem mezi enchondromem a low-grade CHoSA
- Metatazuje relativně později (hlavně do plic)

Diagnostika

- RTG
- Sono (chrupavčitá čepička osteochondromů nad 2cm)
- CT / MRI
- Scintigrafie skeletu
- RTG a CT plic
- Sono břicha
- Biopsie - obtížné odlišení konvenčního low-grade CHoSA a enchondromu – velký vzorek, radiolog. obraz (kostní destrukce, eroze kortiky, periostální reakce, bolesti, lokalizace)

Typický RTG obraz CHoSA

- Obecné známky agresivity nádoru (destrukce kosti, eroze kortiky, periost. reakce, měkkotkáňová složka)
- Nepravidelné kalcifikace
- Subperiostální kostní novotvorba
- Velká cystická expanze s vroubkovaným endostem a destrukcí kortikalis
- Známky preexistující chrupavčité léze
 - (osteochondrom, enchondrom)
- Lokalizace (proximálně)
 - ploché kosti (pánev, lopatka)
 - proximální femur a humerus

4






75.0 kV

320.0 mA

Pixel size: 0.192 mm

W: 2905 L: 5190









Terapie

- Operace - radikální resekce / amputace
 - Neotevřít nádor (schopnost tvorby implantačních metastáz !)
 - Plicní metastazektomie
- Chemorezistentní nádor (jen u high-grade CHoSA – tj. konvenčních G3, dediferencovaných a mezenchymálních CHoSA)
- Radiorezistentní nádor (jen paliativně)

Prognóza

- Prognostické faktory:
 - možnost široké resekce (tj. lokalizace a velikost)
 - histologický grade
- Pokud je výkon intratumorózní, je riziko lokální recidivy až 90% - recidivy mají často vyšší grade a riziko plicních meta
- Prognóza:
 - Konvenční low-grade CHoSA 90% 10 let
 - Konvenční High-grade CHoSA 20- 40% 10 let
 - Dediferenciovaný CHoSA 15% 5let

EWINGŮV SARKOM

Skupina vysoce maligních kulatobuněčných sarkomů s neuroektodermální diferenciací a specifickou genovou translokací, do které patří:

- Ewingův sarkom
- PNET (periferní neuroektodermální nádor)
- Askinův nádor hrudní stěny
- Neuroblastom dospělých

Epidemiologie

- Nejčastější prim. malig. kostní tumor do 10 let
- 1 nový případ na 1 mil. obyv. / 1 rok
- Nejčastěji ve věku 5 -25 let
- Nejčastěji v oblasti metaphýz dlouhých kostí (často s extenzí do diafýzy) a dále v plochých kostech (pánev a lopatka)
- Etiologie neznámá

Symptomy a diagnostika

- Bolest
- Zduření
- Horečka, zarudnutí, otok
- Lab.: zvýšení Leu, FW a CRP
- Diagnostika:
 - RTG, MRI, CT
 - Scinti skeletu, RTG a CT plic, sono břicha
vyšetření kostní dřeně
 - Biopsie v.č. identifikce specifické genové translokace t(11,22)q(24,12)

Typický RTG obraz EwingSA

- „klasicky“: destruktivní léze v meta-diafýze dlouhé kosti s cibulovitou (onion-like) periostální reakcí
- V plochých kostech necharakteristický obraz destruktivní léze
- Velká měkkotkáňová složka



KNEE/11_02_007/R
APPLIED

2006/6/15
16:07:17

R

L

ET: 1
TR: 720.0
TE: 26.0

Velikost pixelu: 0.352 mm

Pozice: 35.8 mm

W: 2248 L: 1085


F



DFOV: 18.00 x 18.00 cm

VOJENSKA NEMOCNICE, BRNO
M 18 May 11, 2006









Terapie

Výrazně chemo- i radiosenzitivní nádor

1. Neoadjuvantní chemoterapie

2. Lokální terapie:

- Operace t.j. radikální či široká resekce / vyjímečně amputace
- Radioterapie u radikálně inoperabilních nádorů

3. adjuvantní chemoterapie

U rizikových pac. myeloablase

s autologní transplantací kostní dřeně

+ event. plicní metastazektomie

Prognóza- faktory

- Pokročilost onemocnění, tj. velikost primárního nádoru, přítomnost metastáz event. postižení kostní dřeně
- Onemocnění považováno za systémové
 - zásadní chemoterapie a odpověď na ni
- 5-tiletého přežití je dosaženo u 60-70% pac.
- Špatná prognóza:
 - meta postižení (horší u kostních meta než u plicních)
 - velký primární nádor (nad 100cm³)
 - inoperabilního nádor
 - axiální lokalizace
 - špatná odpověď na chemoterapii
 - lokální recidiva
 - některé genetické varianty



OSTATNÍ KOSTNÍ SARKOMY

Fibrosarkom

- **Maligní nádor tvořený nádorovými fibroblasty a proplétajícími se kolagenními vlákny**, nesmí být přítomny známky MFH, tvorba osteoidu či chrupavky (obtížná histol.diff.dg.)
- Typy: **primární** (centrální a periostální) a **sekundární** (postiradiačně či malignizace M.Paget, fibrózní dysplázie, OBN, ..)
- Cca **2%** prim.malig.kost.TU
- Max. mezi **20-45 roky**
- Lokalizace – **metafýzy dlouhých kostí** (50%)
- Symptomy- **bolest, později zduření, poměrně často patol. fraktura**
- RTG obraz- **osteolytická léze podobná osteolytickým formám OSA**
- Terapie: **především operační** (široká resekce či amputace), radiorezistence, chemoterapie?
- Prognóza: **5-leté přežití 35-45 %, s výrazně lepším přežitím u low-grade**


Kostní MFH (maligní fibrózní hystiocytom)

- **MFH je nejčastější sarkom měkkých tkání**, pod tuto dg. je řazena většina nediferencovných pleomorfních sarkomů
nejisté etiologie
- Primární kostní MFH je vzácný (méně než 1% malig.kost.TU)
- Nejčastější výskyt v **5.dekádě, v dlouhých kostech, nejčastěji v blízkosti kolenního kloubu**
- **Symptomy – bolest, otok trvající delší dobu (i 6 a více měs.), časté patol.frakturny**
- **RTG obraz – čistě osteolytická agresivní léze s destrukcí kortikalis a často měkkotkáňovou extraosseální složkou**
- **Terapie: neoadjuvantní chemoterapie + široká resekce/amputace + adjuvantní chemoterapie**
- **Radiorezistentní nádor**
- **Prognóza:** pětileté přežití 35-65% v závislosti na radikalitě op. výkonu a chemoterapii



Adamantinom dlouhých kostí

- **Maligní nádor charakterizovaný ložisky epiteliálních buněk obklopených vretenobuněčnou tkání** který získal název na základě histol. podobnosti se stejnojmenným nádorem postihujícím čelisti
- **Vzácný nádor** (méně než 0,5% všech malig.kost. TU)
- **Lokalizace v 90% v diafýze tibie**
- **Nejčastěji ve 2. – 3. dekádě**
- **Dlouhodobá anam. neurčitých obtíží, plošné zduření, s progresí velikosti – bolesti**
- **Terapie – radikální resekce s náhradou homo- či autoštěpem, event. amputace/exartikulace (rozsáhlý TU, recidiva)**
- **Chemoradiorezistentní nádor**
- **Prognóza nejistá**, sklon k lokálním recidivám, v 30% meta (plíce, kosti, uzliny)



RTG obraz: multikamerální ostře ohrazená osteolytická léze, připomínající osteofibrózní dysplazii, místy i rozrušující kortikalis

Chordom


L

- **Nádor vznikající ze zbytků embryonální notochordy v axiální lokalizaci** (z chorda dorsalis vznikají norm. nuclei pulposi)
- **Méně častý nádor** (méně než 5% malig.kost.TU)
- **Lokalizace:** cca **50% v oblasti sakrokokcygeální, cca 40% oblast sfenookcipitální**, zbylých 10% zbytek páteře (často více než jeden obratel)
- **Většinou po 30. roce věku** – mladší pacienti mívají spíše chordomy ve sfenookcipitální oblasti
- Symptomy se rozvíjí pozvolna roky až měsíce
 - **Sakrálně** – až při velké velikosti, bolesti, zácpa a jiné projevy útlaku orgánů malé pánve
 - **Kraniálně** – dřívější dg., bolesti hlavy, komprese mozkových nervů, zrakové poruchy, nitrolební hypertenze
- RTG obraz (sakrálně): **osteolýza s bublinovitou expanzí měkkých tkání na ventrální str. sakra** (lépe na bočním snímku, CT a MRI)
- **Terapie: co nejradikálnější odstranění, pokud neradik.op. či inop.TU tak radioterapie**
- **Prognóza: velmi pomalá progrese, pozdní meta, na druhé straně obtížná op. terap.**



Maligní vaskulární nádory

- Velmi vzácné nádory tvořící méně než 1% všech maligních kostních nádorů
- Klasifikace:
 - Semimaligní / Low-grade:
 - Hemangioendoteliom
 - Hmeangiopericytom
 - Maligní high-grade
 - Angiosarkom
- Klinika: bolest, poměrně často patologická frakturna
- RTG obraz – čistě osteolytická léze, jejíž ohrazení odpovídá malignitě nádoru (gradingu), často multicentrický výskyt (většinou v rámci jedné kosti či v rámci jedné končetiny)
- Terapie:
 - Operační (široká resekce či amputace)
 - Chemoterapie (u high grade)
 - Radioterapie (u inoperabilních nádorů)
- Prognóza: závisí na gradingu





2. HEMOBLASTÓZY VE SKELETU

- Primární kostní nádory
 - Mnohočetný myelom (plasmocytom)
 - Solitární plasmocytom (myelom)
 - Primární kostní lymfom

- Sekundární postižení skeletu u systémových hemoblastóz
 - Hodgkinův lymfom
 - Non-Hodgkinský lymfom (NHL)
 - Leukémie

Jak primární tak sekundární hemoblastózy ve skeletu spadají do **kompetence hematoonkologie, základem jejich terapie je chemo- a radioterapie.**

Ortoped se podílí jen na řešení komplikací (již přítomná, či hrozící patologická fraktura) a na diagnostice

Mnohočetný myelom (plasmocytom)

- Nejčastější primární maligní kostní nádor (cca 40%), cca 1% všech malignit
- **Definice:** Maligní prolyferace B-lymfocytu na úrovni jeho diferenciace v plazmatickou buňku, vzniká tak klon buněk produkujících imunoglobulin stejných fyz., chem. a imun. vlastností tzv. monoklonální protein (M-komponenta, paraprotein)
- **Výskyt:** převážně ve vyšším věku (max. 5.-6. dekáda), více u mužů
- **Klinická symptomatologie:**
 - **bolest** (v zádech, žebrech, event. v jiných lokalitách dle skeltálního postižení, typicky po zátěži, navození progresivní osteoporózy hl. při imobilizaci)
 - **patologická fraktura** (v případě fraktury v obl. pateře event. neurologický deficit)
 - **malátnost, dušnost** (při anémii)
 - **deprese, letargie, slabost** (při hyperkalcémii)
 - **vysoká incidence infekcí, často závažných** (při nedostatku funkčních Ig)
 - **postiž. ledvin až urémie** (nefrotox. λ řetězce, hyperkalcémie, hyperurikémie)
 - **bolesti hlavy, poruchy vidění** (hyperviskózní syndrom)

■ RTG diagnostika:

- klasicky **osteolytická ložiska vzhledu vyražených defektů v kosti**, které mohou postupně splývat
- častá je i **difuzní myelomatóza s infiltrací dřeně budící dojem celkové osteoporózy postihující hl. axiální skelet**
- Nejvíce je postižena **pateř, lebka, žebra, pánev a lopatka**
- Scintigraficky často **negativní**

■ Laboratorní diagnostika:

- **vysoká FW**
- **normochromní anémie a mírná leukopenie evet. trombocytopenie**
- **více než 10% atypických plasmocytů ve sternální punkci**
- **imunoelfo séra a moči** (průkaz a kvant. stanovení paraproteinu)
- **Bence Jonesova bílkovina v moči**
- **hyperkalcémie, hyperurikémie, porucha renálních funkcí**

■ Prognóza:

- **průměrná doba přežití 2 – 3 roky**
- **asi 20% pac. přežívá 5 a více let**
- **vlastní příčinou úmrtí bývá progrese nemoci či infekce**
- **mnohem lepší prog. má vzácná varianta – solitární plasmocytom**



Solitární plasmocytom

- **Vzácná solitární varianta myelomu**
- **Projevy spíše jako u klasických kostních nádorů** (bolest, zduření, omezení fce, patologická fr.)
- **Laboratorní markery často negat.**, ke stanovení dg. nutná histologie
- **RTG obraz – solitární osteolytické ložisko**
- **Terapie – operační** (resekce s náhradou či bez ní)
+ chemoterapie
- **Prognóza – mnohem lepší než u mnohočetného myelomu**
 - část pac. se plně vyléčí
 - část dosáhne dlouhodobé remise, ale časem přejde do klasického mnohočetného myelomu

Primární kostní lymfom

- Cca 4% všech primárních kostních nádorů
- Vzácně do 20 let věku, poději poměrně rovnoměrně s mírnou převahou v 6. a 7. dekádě života, častěji u mužů
- Nejčastěji postihuje femur, následuje pánev, pateř a žebra
- Klinická symptomatologie:
 - lokální bolestivost a zduření, častěji i patologická frakturna
 - dobrý celkový stav pacientů, bez celkových příznaků (na rozdíl od myelomu a sekundárních hemoblastóz generalizovaných do skeletu)
 - někteří pacienti mohou mít anamnézu i několik let před stanovením dg.
- RTG obraz:
 - Smíšené osteolytcko-produktivní změny zpočátku ve dřeni (ložiska osteolýzy mezi nimiž mohou být kondenzace trabekulárního charakteru)
 - Kortikalis ztenčená až destruovaná, bez periostální reakce
 - Často velká měkkotkáňová složka
 - RTG obraz může být často větší než klin. Obtíže
 - RTG obraz bývá na druhé straně podstatně decentnější než nález na MRI
- Diagnostika: KO+diff. (+ event. i nátěr), scintigrafie skeletu, CT hrudníu, břicha a pánve, vyšetření kostní dřeně
- Prognóza: lepší (55% přežíva 5 let) než u systémových hemoblastóz (25%)

P



R

3. Skeletální metastázy

Nádory nejčatěji metastazující do skeletu a možnosti jejich záchytu při onkoscreeningu

- Ca prsu (klinické vyšetření prsů, USG, mamografie)
- Ca prostaty (vyšetření per rectum, PSA)
- Ca plic (RTG S+P)
- Ca ledviny (sono břicha)
- Ca štítnice (sono štítnice)

Lokalizace kostních metastáz

- Nejčastěji oblasti skeletu s hojnou krvetvornou dření
 - t.j. axiální skelet (páteř, pánev, žebra, sternum a lebka)
- Z končetinového skeletu je nejčastěji postižen proximální femur a humerus

RTG obraz kostních metastáz

- Osteolýza, osteoskleróza, periostální reakce , skvrnitá struktura kosti
- Typy metastáz: osteolytické x osteosklerotické x smíšené
- 30% kostních metastáz je RTG němých



L

0 mm
9

A grayscale X-ray photograph of a human pelvis. The image shows the iliac wings, sacrum, and coccyx. A metal ruler is positioned horizontally across the bottom of the image, with markings visible from approximately 10 to 25 centimeters.

0 kV

0.0 mA


šířka pixelu: 0.194 mm

3009 L: 4560

DX/94056/1

kycle


HIP



R



L



Specifika kostních metastáz některých nádorů

- Osteosklerotické meta (ca prostaty)
- Výrazně vaskularizované meta (ca ledviny a štítnice)
- Akrální lokalizace meta (ca plic)

Diagnostika - obecně

- U pacientů středního a staršího věku s ložiskovým postižením skeletu je vždy třeba myslet na možnost skeletálních metastáz
- Metastáza může mít prakticky jakýkoliv RTG obraz
- Kostní metastáza event. její komplikace (patol. fr.) může být prvním projevem nádorového onemocnění

Diagnostika - konkrétně

- Anamnéza: věk a onkologická anamnéza
- Vyšetření vlastní kostní léze (RTG, CT, MRI)
- Celotělová Tc scintigrafie skeletu (posouzení lokální akumulace radiofarmaka, rozlišení solitární meta a mnohočetné disseminace)
- Onkoscreening (RTG S+P, sono břicha, vyšetření prsů u žen, (klinicky, mamografie, sono), odběr PSA u mužů, sono štítnice)
- Pokud je i tak etiologie nejistá (origo), tak:
 - Další pátrání po origu zdlouhavé a nákladné
 - Přímé bioptické ověření s výhodou

Komplikace

- Patologická fraktura
- Hyperkalcémie
- Míšní komprese
- Anémie





75.0 kV
320.0 mA
Velikost pixelu: 0.191 mm
W: 3230 L: 4964



Stanovení rizika patologické fraktury- Mirelsovo skóre

Body	1	2	3
Lokalizace	HK	DK	Petrochanterická oblast
Bolest	Mírná	Střední	Velká
Typ	Osteoplastická	Smíšená	Osteolytická
Velikost	<1/3 šířky kosti	1/3 – 2/3 šířky kosti	>2/3 šířky kosti
≤ 7 bodů	Riziko 4%	Preventivní OS není indikována	
8 bodů	Riziko 15%	Hraniční indikace	
≥ 9 bodů	Riziko 33% a více	Indikace preventivní OS	

R



R



Posouzení prognózy pacienta

- Rozsah onemocnění
 - Primární nádor
 - Postižení uzlin
 - Vzdálené metastázy
- Rychlosť progrese nádorového onemocnění
- Možnosti terapie nádorového onemocnění a odpověď na ni
- Velikost metastázy, riziko patologické fraktury event. její přítomnost
- Subjektivní obtíže, věk, individuální stav (Karnoffsky index), interní stav

Přehled možností terapie

- Systémová terapie základního onemocnění
 - Chemoterapie
 - Hormonální terapie
 - Imunoterapie, biologická terapie, ...
- Terapie kostních metastáz
 - Bisfosfonáty
 - Radioterapie
 - Ortopedická léčba
 - Chirurgická
 - Radikální
 - Paliativní
 - Konzervativní
 - Další invazivní postupy (RFA, angiografie s embolizací,..)
- Paliativní a podpůrná léčba

Typy operačních výkonů při řešení kostních metastáz

ODSTRANĚNÍ NÁDORU	NÁHRADA / STABILIZACE
žádné	nitrodřeňové hřebování
exkochleace	cementoplastika + event. OS
resekce	CKP, TEP, TU-TEP, interkalární spacer, náhrada celé kosti
Amputace/exartikulace	Žádná
Laminektomie a dekomprese míchy	ventrální, dorzální či kombinovaná fúze

Chirurgická terapie kostních metastáz

Radikalita

X

Co nejjednodušší
výkon s časnou
mobilizací



- Solitární metastáza

Dobrá prognóza

- Mnohočetné metastázy

Horší prognóza

