

# Patofyziologie centrálního a periferního nervového systému – I. část – motorický systém

Organizace nervového systému

Neurony, synapse, neurotransmitery

Míšní reflexy

Řídící systémy motoriky


Obrny

Poruchy extrapyramidového systému

Parkinsonova nemoc


Nervosvalová ploténka

Svalové poruchy



HOW THE BRAIN WORKS



## Anatomie a fyziologie NS



- **centrální nervový systém**
  - **mícha**
    - ojedinělá a zpracovává sensorické informace z kůže, kloubů a svalů (zadní rohy)
    - převádí motorické příkazy pro svaly na přední rohy (spinální reflexy)
  - **mozek**
    - mozkový kmen
      - prodloužená mícha (medulla oblongata)
        - trávení, dýchání, srdeční rytmus
      - most (pons)
        - převádí informace o pohybu mezi mozkem a mozečkem
      - stř. mozek (mesencefalon)
        - kontroluje celou řadu sensorických a motorických funkcí, např. pohyb očí, a koordinuje vizuální a akustické reflexy
      - retikulární formace
        - probíhá podél celého kmene a soustředí veškerou přicházející informaci
    - **mozeček (cerebellum)**
      - kontroluje sílu a orientaci pohybu, účastní se procesu motorického učení
    - **přední mozek (telencefalon)**
      - diencefalon
        - thalamus – zpracovává většinu přicházející (sensorické) informace
        - hypothalamus – reguluje autonomní systém, kontroluje endokrin. žlázy
      - mozková kůra
        - primární kortexv. asociace, paměť, učení, intelekt, ...
  - **periferní nervový systém**


## Funkce nervového systému

- regulace homeostázy a jednotl. funkcí organizmu
  - spolu s endokrinním a imunitním systémem
  - komunikace s prostředím
  - mentální aktivita
- **přímá regulace**
  - kosterních svalů (somatický NS)
  - myokardu (autonomní NS)
  - hladkých svalů cév a viscerálního systému (autonomní NS)
  - exokrinních žláz (autonomní NS)
- **buňky nervového systému**
  - neuron – excitabilita, konduktivita, syntéza a uvolňování neurotransmiterů
    - axony a dendrity
    - excitabilita (akční potenciál)
      - myelinové pochvy
    - syntéza a uvolnění neurotransmiterů
    - synapse
  - podpůrné buňky – metabolická podpora, ochrana (krevně-mozková bariéra), podpora vedení (myelin)
    - glie (astrocyty, oligodendrocyty, microglie, ependymální bb.)
    - Schwannovy bb.




## Buňky NS - neuron jako funkční jednotka NS

- vysoká variabilita neuronů podle specificity, velikosti a typu
  - jeden α-motoneuron v předních rozích míšních v hrudní oblasti má axonální délku více než 1 m a inervuje několik set až tisíc svalových fibril a vytváří motorickou jednotku
  - jiné neurony mají délku pod 100 µm a končí na jednotlivých tělech jiných neuronů



## Neurony/akční potenciál/vedení nervem




## K předchozímu obrázku: funkční jednotka: neuron a neurotransmittery

- akční potenciál (tj. nervový impuls) se šíří podél axonu - mikrotubuly transportují neurotransmitery k nervovým zakončením (A)
- akční potenciál I depolarizuje synaptickou membránu a otevírá voltage-dependentní kalciové kanály (B)
- influx kalcia způsobuje fúzi vezikul s membránou (C), což umožní neurotransmiteru
  - (i) vázat se na receptor a aktivovat druhé posly, které modulují transkripcí cílových genů
  - (ii) otevřít ligandem vrátkované kanály
    - to umožňuje iontům vstoupit do těla buňky, depolarizovat membránu a iniciovat akční potenciál II


## Synapse/neurotransmittery

- elektrické synapse
- chemické synapse
  - excitační – způsobují depolarizaci
  - inhibiční – způsobují hyperpolarizaci ( $\uparrow K^+$  nebo  $Cl^-$  permeability)
- messengerové molekuly
  - neurotransmittery – syntéza, skládání a uvolňování
    - AK – Ach, glutamát, glycín, GABA
    - peptidy – substance P, endorfiny
    - monoaminy ( $1\times NH_2$ ) – serotonin, dopamin, noradrenalin, adrenalin
  - neuromodulátor
    - endokanabinoidy, substance P, endorfiny
    - nervové růstové faktory
- odstraňování neurotransmiterů
  - enzymatická degradace (např. Ach)
  - re-uptake pre-synaptickými neurony (např. Katecholaminy)
  - difuze z místa působení




## Funkční jednotka: neuron a neurotransmitery


- Akční potenciál (tj. nervový impuls) se šíří podél axonu
- Mikrotubuly transportují neurotransmitery k nervovým zakončením (A)
- Akční potenciál I depolarizuje synaptickou membránu a otevírá voltage-dependentní kalciové kanály (B)
- Influx kalcia způsobuje fúzi vezikulů s membránou (C), což umožní neurotransmitteru
  - (i) vázat se na receptor a aktivovat druhé posky, které modulují transkripci cílových genů
  - (ii) otevřít ligandem vrátěvané kanály, to umožňuje iontům vstoupit do těla buňky, depolarizovat membránu a iniciovat akční potenciál II
- Neurotransmitery
  - Synaptická transmise modulována neurotransmitery, které se uvolňují akčními potenciály sířícími se podél axonu
  - Neurotransmíter pak reaguje s postsynaptickými receptory a jsou odstranovány transportními proteínami
  - Reakce neurotransmíter-receptor zvyšuje propustnost pro jonty a umožňuje další šíření akčního potenciálu
  - Tato kombinace axonální elektrické aktivity a synaptické chemické reakce je podstatou všech neurologických funkcí
- Hlavní neurotransmitery:
  - acetylcholin, norepinefrin, (noradrenalin), epinefrin (adrenalin), 5-hydroxytryptamin (serotonin), kyselina gamma-aminomáselná (GABA), opioidní peptidy, prostaglandiny, histamin, dopamin, glutamát, NO, neuromelanin, vazookativní intestinální peptid (VIP)
  - Glutamát se považuje za hlavní excitační neurotransmitre



## Axonální transport




## Neuronální plasticita



- přirozená schopnost NS měnit se podle nových podmínek a adaptovat**
  - změny se uskutečňují v rámci existující komplexní sítě neuronů
- zkušenosti, myšlení a vzpomínky vytváří **nové či silnější spojení mezi neurony**
- dokonce i v dospělém mozku jsou tvorené nové neurony (ale regenerace je velmi omezená), které migrují do kortextu a přejímají nové role
- naopak nevyužívané neurony atrofují
- Wallerova de-/regenerace
  - distální přerušení axonu dovoluje jeho obnovení podél myelinové bočnice (většinou ne úplně dokonale, mimo původní spojení → synkinezia)
  - pokud je paxon přerušen blízko těla neurona, vede k proximální degeneraci a event. i zániku celého neurona

## Organizace NS




# Přehled poruch NS

- aferentní systém
  - poruchy jednotlivých smyslů (tedy sensorických orgánů)
  - sensorické neuropatie
  - chronická či patologická bolest
    - neuralgie, kauzalgie, fantomová bolest
- eferentní systém
  - poruchy somatického motorického (pyramidálního) systému
  - poruchy extrapyramidálního systému
  - poruchy mozečku
  - poruchy hypotalamu a vegetativního nervového systému
- poruchy vědomí
- abnormální elektrická aktivita mozku
  - epilepsie
- mentální schopnosti a osobnost
  - kognitivní poruchy
  - demence
- poruchy spánku


## Eferentní systém – motorické funkce

- kortikospinální (pyramidový) motorický systém
  - horní motoneuron (HMN)
    - pyramidové bb, primárního motorického kortexu (frontální lalok - gyrus precentralis – area 4)
    - kortikospinální (capsula interna) a kortikobulbární dráhy
    - "decussatio pyramidae" v medulla oblongata
      - ~80% se kříží a pokračuje jako tr. kortikospin. later.
      - zbytek ne a pokračuje jako tr. kortikospin. ventr.
  - dolní motoneuron (DMN)
    - ganglia motorických hl., nervi v kmezi nebo  $\alpha$ -motoneuronu (a též  $\gamma$ ) předních rohů mísňích
- extrapyramidový systém
  - frontální kortex, thalamus, bazálních ganglia, mozeček
- ostatní signalizace k DMN
  - n. ruber, retikulární formace (retikulospinální trakt), limbický systém
- spinální reflexy
  - mimovolný svalové reakce
    - např. odtažení (obranný), zkřížený extenzorový (chůze) nebo napínací (kontrola sval. tonu)
  - segmentální
  - intersegmentální
  - suprasegmentální (+ mozek)
- charakter motorické aktivity
  - jednoduché spinální reflexy
  - posturální nebo komplexní ("cizí") reflexy (např. polykání, úchop, sání)
  - stereotypické a naučené pohyby
  - volní motorika




# Etiologie poruch NS

- nespecifické = porucha vnitřního prostředí organizmu
  - hypoxie
  - teplota
  - koncentrace iontů
  - dochází k nedostatečnému substrátu/energie
    - glukóza
    - ketolátky
- specifické pro nervový systém
  - vrozené
    - genetické
  - získané
    - ischemie
    - hemoragie
    - mechanické poškození (trauma)
    - (auto)imunita
    - infekce
    - tumory/metastázy




## Motorické řídící systémy

- (1) **kortikospinální** (= pyramidální) systém v kůře mozkové generuje informace pro přední rohy mísňí
  - umožňuje provést zamýšlený, vědomý, silný a organizovaný pohyb
  - porušená funkce vede ke ztrátě schopnosti vykonat volný pohyb (např. **hemiplegia**, **para-paréza** či **plegia**), ke **spasticitě** a ke změnám reflexů
- (2) **extrapyramidový** systém podporuje rychlé, plynulé provedení pohybů formovaných kortikospinální dráhou
  - porušená funkce se projevuje změnou rychlosti provedení pohybu (**bradykinezia** nebo **dyskinezia**), změnou svalového tonu (**rigiditou** či **dystonii**) nebo jinými poruchami pohybu (např. **tremor**)
- (3) **mozeček** a jeho spoje vedou ke koordinaci svalového pohybu, iniciovaného kortikospinálním systémem a k řízení rovnováhy
  - poruchy cerebella vedou k nepravidelnému, nekoordinovanému a trhavému pohybu (**ataxii**), s charakteristickými příznaky, jako je dvsmetrie, adiadochokinéza, intenzní tremor a nebo porucha chůze a pohybů trupu





# Funkční neuroanatomie



- Neuron jako funkční jednotka NS
- Vysoká variabilita neuronů podle specificity, velikosti a typu.
- Jeden  $\alpha$ -motoneuron v předních rozích míšních v hrudní oblasti má axonální délku více než 1 m a inervuje několik set - 2000 svalových fibril a vytváří motorickou jednotku.
- Jiné neurony mají délku pod 100  $\mu\text{m}$  a končí na jednotlivých tělech jiných neuronů.



# Motorická jednotka a napínací reflex




## Svalové vřeténko ( $\alpha$ - a $\gamma$ -motoneurony)



**Příklad: patelární reflex (míšní reflexní oblouk)** Náhlé napětí šlachy vytváří senzorické akční potenciály v 1a aferenzech svalových vřetének. Ty se synapticky spojují s  $\gamma$ -motorickými vlákny a  $\alpha$  motorickými vlákny. Motorické akční potenciály vedou ke svalové kontrakci. Dochází také k inhibici flexe v koleni.



# Poruchy pohybu a svalového tonu

- paralýza (pyramidový systém)
  - vč. poruch sval. tonu (spasticita nebo ochablost)
- porucha přiměřenosti pohybů, koordinace a posturální motoriky při postižení extrapyramidového systému
  - vč. rigidity a abnormálních pohybů
- poruchy neuromuskulárního spojení (nervosvalové ploténky)
  - myasthenické syndromy
- poruchy svalů
  - muskulární atrofie
  - muskulární dystrofie



## Porucha pyramidového systému


- obrna (paralýza) - ↓ nebo zánik schopnosti volní pohybové aktivity přísl. svalových skupin
  - částečná = **paréza**
  - kompletní = **plegie**
  - terminologie!
- paralýza vždy zahrnuje změny svalového tonu, které jsou rozdílné při postižení HMN vs. DMN
  - **centrální, spastická paralýza** – léze HMN (primární motorický kortex, capsula interna, kortikospinální a bulbární trakt)
    - svalová hypertonie typu spasticity (může vést ke kontrakturám)
      - odpor proti protažení svalu, při zvýšení síly povolí (fenomén "sklapovacího nože")
      - v důsledek poklesu inhibice spinálních reflexů
    - ↑ výbavnost sval. a šlach. reflexů
      - pokles inhibice α-motoneuronů
      - zvýšená aktivita γ-motoneuronů
    - přítomnost patologických reflexů (deliberační fenomény)
      - Babinski
- **periferní, chabá paralýza** – léze DMN (motoneuron v bředních rozích místních a ganglia hl. nervů v mozk., kmeni, perif. nervy)
  - svalová hypotonie (ochablost)
  - fascikulace a fibrilace (spontánní depolarizace)
    - v důsledek poklesu klidového potenciálu a zvýšení citlivosti k ACh v denervovaném svalu
  - sval. atrofie
  - ↓ nebo chybění sval. a šlach. reflexů



## PORUCHY PYRAMIDOVÉHO SYSTÉMU (HORNÍ A DOLNÍ MOTONEURON)

## Etiologie paralýz + topika


- centrální syndromy (postižení HMN) – spastické
  - (a) kontralaterální hemiparéza/hemiplegie
    - flegické kontrakturnou horní končetiny a extenční dolní končetiny (circumdukce)
      - kortikální
      - kapsulární
      - kmenové (+ ypsilonilaterální postižení jader hl. nervů)
  - etiologie
    - fokální léze motoneuronů
      - ischemie nebo hemoragie (CMP)
      - úrazy hlavy
      - centrální demyelinizace
      - neuroinfekce
      - tumory
    - generalizované léze motoneuronů
      - amyotrofická laterální skleróza
  - paraparéza/paraplegie u spinálních syndromů (postižení HMN), zřídka při bilat. postižení mozku
    - nejč. traumatické přerušení míchy (viz dále)
- periferní paralýza (postižení DMN) → chabé mono- popř. paraparézy/plegie
  - přerušení nebo postižení perif. nervu
    - trauma
    - perif. demyelinizace
    - infekce (poliomielitida)
  - ventrální kořenové syndromy
    - herniaci intervertebrálního disku, tumor, frakura obratle, osteofity, komprese aj.
  - pletencové syndromy




# Hemiparéza/plegie - podle lokalizace

- (1) motorická kůra
  - slabost nebo ztráta pohybu na kontralaterální končetině (monoplegia) nebo její části je charakteristická pro izolovanou lézi motorického kortexu (např. metastáza tumoru)
  - často též defekt vyšších korových funkcí (afázie) a fokální epilepsie
- (2) capsula interna
  - protože kortikospinalní dráhy jsou v c.i. pevně sbalený (~1cm<sup>2</sup>), malé leze způsobují velké deficit
    - např. infarkt malé větev a. cerebri media způsobuje náhlou kontralaterální hemiplegii, která zahrnuje i tvář
- (3) most
  - pontinní leze (např. plák sclerosis multiplex) postihují zřídka jen kortikospinalní trakt, často postiženy i jádra hlavových nervů s ochrnutím VI. a VII. nervu, internukleární oftalmoplegií apod.
- (4) mícha
  - izolované postižení tr. cortikospinalis lat. (např. v krční oblasti) způsobuje ipsilaterální UMN lézi

# Primární motorický a senzorický kortex




# Capsula interna




# Centrální demyelinizace – sclerosis multiplex

- typický věk nástupu 20 – 45 let, 2x více ženy, mírné pásmo severní polokoule
- etiologie
  - genetické predispozice (MHCII geny)
  - faktory prostředí (infekce?, toxicke efekty?)
- patogeneze
  - myelin je v CNS produkován oligodendrocyty (ODC) – ztráta myelinu vede k poklesu rychlosti vedení a posléze k zániku axonu
  - autoimunitní poškození (T-lymf., makrofágy, aktivovaná mikroglie) poškozuje myelin a ODC
  - aktivní cytotoxická destrukce ODCs a myelinu (+ protilátky proti myelinu a komplement) vedou k tvorbě ostre ohraničených demyelinizovaných okrsků v CNS - plaky
  - ty jsou dále zjizveny (sclerosis)



# Demyelinizace – sclerosis multiplex



- symptomy
  - iniciálně je predilekčně ie poškozen optický nerv (přechodná porucha visu), periventrikulární bílá hmota, kmen (polykání a řeč), mozeček (chuze), kortikospinální dráha (svalová slabost), spinotalamický trakt (vibrační čítí)
  - dyscholoické projevy (únavu, střídání nálad, deprese, euforie, porucha paměti) je důsledkem postižení bílé hmoty mozk. kontextu
- průběh - periodický
  - počáteční demyelinizace jsou remyelinizovány
  - se zánikem ODC klesá možnost regenerace
  - postupně neúplná obnova funkce
  - průběh - relabující-remitentní, sekundárně progresivní nebo primárně progresivní
- Guillain-Barre syndrom**
  - post-infekční perif. polyneuropatie v důsledku perif. demyelinizace (Schwanovy bb.)

# Spastická paraparéza/plegie

- paraparéza indikuje bilaterální poškození kortikospinálního traktu
  - kompresné míchy
  - jiné míšní nemoci
  - někdy i cerebrální léze (blízko střední komisury)

**Table 20.14**  
Causes of a spastic paraparesis

#### Spinal lesions

- Spinal cord compression (see Table 20.49)
- Multiple sclerosis
- Myelitis (e.g. varicella zoster virus)
- Motor neurone disease
- Subacute combined degeneration of the cord
- Syringomyelia
- Syphilis
- Familial or sporadic paraparesis
- Vascular disease of the cord
- Non-metastatic manifestation of malignancy
- Tropical spastic paraparesis (HTLV-1)
- HIV-associated myelopathy

#### Cerebral lesions\*

- Parasagittal cortical lesions:
  - Meningioma
  - Venous sinus thrombosis
  - Hydrocephalus
  - Multiple cerebral infarction

\* All are rare causes of a paraparesis  
HTLV-1, human T-cell leukaemia virus

© Elsevier Science Ltd

# Poškození dolního motoneuronu (LMN)

- dolní motoneuron ie alfa-motoneuron předních rohů míšních (nebo jader hlavových nervů)
- aktivita těchto buněk je řízena impulzy z:
  - kortikospinálního traktu
  - extrapyramidového systému
  - mozečku
  - eferentních vláken zadních kořenů
- příčiny lézí LMN
  - postižení jader hlavových nervů a alfa motoneuronů předních rohů míšních
    - např. poliomyelitis
  - míšní oblouk-protruze disku
  - traumatické postižení periferního nervu (nebo hlavového)-
  - mononeuritis multiplex

**Table 20.17**  
Signs of a lower motor neurone lesion


- Weakness
- Wasting
- Hypotonia
- Reflex loss
- Fasciculation
- Contractures of muscle
- 'Trophic' changes in skin and nails

} long term effects

NB: Fibrillation potentials can be detected electromyographically, see page 1156.

# Míšní léze vč. senzitivní symptomatologie



- postihuje motorické funkce, spinální reflexy, afferentní sensace a vegetativní funkce v a pod místem léze
- (A) kompletní transversální léze**
  - okamžitě po přerušení míchy následuje **míšní šok**
    - ztráta sval., tonu, reflexů, percepce, nestabilita kr. tlaku (neurogenní šok), porucha termoregulační, ztráta kontroly defekace, močení a str. peristaltiky
  - později se rozvíjí spastická paralyza + hyperreflexie + porucha čítí
    - C1 - C4 - akutní respirační selhání
    - pod C5 + horní Th
      - kvadruplegie
      - porucha čítí
      - spontánní ventilace (inervace bránice)
      - porucha sympatiku (hypotenze)
      - porucha kaudálního parasympatiku (defekacní a urinární reflex)
    - dolní Th, L a S
      - paraplegie
      - porucha čítí
      - porucha kaudálního parasympatiku (defekacní a urinární reflex)
    - ale normální ovariální cyklus a průběh těhotenství (nebolelivé porodní kontrakce uteru)
    - erekce a ejakulace možná po taktilem stimulaci
- (B) laterální míšní hemisekce (Brown-Sequard syndrom)**
  - paralyza a ztráta propriocepce na ipsilaterální straně
  - ztráta čítí bolesti a termorecepce na kontralaterální straně



© Elsevier Science Ltd


# Amyotrofická laterální skleróza

- fatální neléčitelné neurodegenerativní onemocnění v důsledku progresivní ztráty HMN a DMN míchy ( $\alpha$ -MN před, rohů), kmene (zejm. n. hypoglossus) a motorického kortexu
- naopak sensorické, vegetativní a některé motorické neurony (např. okulomotorické) a také mentální schopnosti zůstávají nepoškozeny
- symptomy
  - časně – svalová slabost (zejm. drobné svaly ruky, mimické, jazyk)
  - později – progredující postižení hybnosti (komplikovaná spastická a chábá plegie), polykání (dysfagie) a řeči (dysarthrie)
- paralýza (vč. respiračních svalů) vede ke smrti během 3–5 let po nástupu příznaků
  - ten typicky mezi 40. a 70. rokem, častěji muži
- etiologie
  - ~90% případů ALS sporadických
    - negativní rodinná historie
  - ~10% familiárních
    - ve 20% se jedná o přítomnost některé z >100 různých mutací v genu pro Cu/Zn superoxididismutázu (SOD1, chrom. 21)
- patogeneze - hypotézy
  - ROS toxicita – porušení axonálního transportu ?
  - exotoxicita – aktivace glutamate-gated kanálů ?
  - autoimunita ?



## PORUCHY EXTRAPYRAMIDOVÉHO SYSTÉMU (BAZÁLNÍ GANGLIA)


### Extrapiramidový systém – bazální ganglia




- subkortikální struktury mozku, které spoluvytváří přídatný ale nezbytný motorický systém spolupracující přímo s primárním motorickým kortexem a nepřímo s mozečkem
  - přední mozek – nucleus caudatus, putamen (dohromady neostriatum), globus pallidus
  - diencephalon – nucleus subthalamicus
  - stř. mozek – substantia nigra

### Bazální ganglia/dráhy

- 1) aferentace z mozk. kůry a talamu
  - zejm. do neostriata – hl. vstupní brána BG
- 2) interní spojení mezi sebou
- 3) výstupy z BG (zejm. globus pallidus)
  - ascendentní – talamus
    - modulace aferentních informací do kůry
  - descendenti – stř. mozek a kmen
- charakter informací z BG je převážně inhibiční (zjednodušeně)
- funkce
  - kontrola kortikální aktivity při organizaci pohybů – zejm. koordinace, přesnosti, začátku pohybu, synchronizace, ...
    - zejm. naučených a stereotypních pohybů
- **poruchy BG se manifestují motorickými abnormalitami, ne paralýzou!**
  - tremor
  - nechtěné pohyby
  - změny svalového tonu (hypertonicita nebo hypotonicita)
  - pomalost a snížený rozsah pohybů




# Spoje a neurotransmitery BG



## Parkinsonova choroba

- degenerativní postižení buněk subst. nigra produkujících dopamin
  - progresivní destrukce nigrostriatální dráhy s následnou redukcí dostupnosti dopamINU ve striatu a jeho nadmerné GABA-ergné (inhibiční) aktivitou
- typicky po 50. roku věku, vzácně i časněji
- etiologie
  - idiopatická – degenerace bb. substantia nigra
  - cévní onemocnění mozků - ischemie
  - toxicické (např. po otravě CO)
  - časný nástup – genetické příčiny
    - mutace v genech pro  $\alpha$ -synuclein, parkin, DJ-1 aj.
- symptomy
  - klidový tremor
  - rigidita
  - bradykinezia (pomalé pohyby a jejich začátek)
  - ztráta posturálních reflexů (pády)
  - poruchy řeči a polykání
  - ztráta mimiky
  - osvihlické poruchy (deprese) a demence (~20% pacientů)
    - pravděpodobně chybění dopamu i v kůře a limbickém systému
  - vegetativní dysbalance (pocení, salivace, průjem)
- terapie – podpora dopaminergního systému



## Poruchy extrapyramidového systému


- (1) hypokineticko/hypertonický syndrom (synonymum akineticko/rigidní syndrom)
  - hyperfunkce inhibičních okruhů BG (GABA-ergní, zejm. striata) → inhibice kortikálních motorických funkcí
    - pomalý začátek pohybu
    - omezený rozsah a síla
    - tremor
    - svalový hypertonus typu rigidity (fenomén "ozubeného kola")
  - Parkinsonova choroba** ( $\otimes$  substantia nigra)
  - Wilsonova choroba** ( $\otimes$  putamen)
- (2) hyperkineticko/(hypotonický) syndrom
  - excesivní, nechtěná motorická aktivita při poruše inhibičního působení BG
    - chorea ( $\otimes$  striatum) - *hypotonie*
    - balismus ( $\otimes$  n. subthalamicus) - *hypotonie*
    - athetosis ( $\otimes$  striatum a gl. pallidus)
    - dystonie ( $\otimes$  putamen, gl. pallidus a talamus)
    - dyskinesie

## Etiopatogeneze PD

- familiární formy – geny – naznačují možnou etiopatogenezi
  - (1) porucha homeostázy proteinů v buňce
    - dysfunkce systému ubiquitin-proteasom (parkin = ubiquitin E3 ligáza)
    - misfolding proteinů a jejich agregace ( $\alpha$ -synuclein  $\rightarrow$  Lewyho těliska)
  - (2) mitochondriální dysfunkce (PINK1, LRRK2)
    - porucha komplexu I
      - experimentálně pomocí MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine)
      - oxidační stres (DJ-1 – antioxidační enzym)
    - účast dopaminergního metabolismu
      - tvorba ROS
    - další
      - homeostáza železa
      - kalciový metabolismus

LOCUS	CHROMOSOME LOCATION	GENE	INHERITANCE PATTERN
PARK1/PARK4	4q21-q23	<i>alpha-synuclein</i>	AD
<b>PARK2</b>	<b>6q25.2-q27</b>	<b>parkin</b>	<b>AR</b>
PARK3	2p13	unknown	AD
<b>PARK5</b>	<b>4p14</b>	<b>UCH-L1</b>	<b>AD</b>
PARK6	1p35-p36	PINK1	AR
PARK7	1p36	DJ-1	AR
PARK8	12p11.2-q13.1	LRRK2	AD
PARK10	1p32	unknown	unclear
PARK11	2q36-2q37	GIGYF2	unclear
unknown	5q23.1-q23.3	<i>Synphilin-1</i>	AD
unknown	2q22-q23	NR4A2	AD






## Legenda k předchozímu obrázku


The discovery of Mendelian inherited genes has enhanced our understanding of the pathways that mediate neurodegeneration in Parkinson's disease. One main pathway of cell toxicity arises through α-synuclein, protein misfolding and aggregation. These proteins are ubiquitinated and initially degraded by the ubiquitin–proteasome system (UPS), in which parkin has a crucial role. However, there is accumulation and failure of clearance by the UPS over time, which leads to the formation of fibrillar aggregates and Lewy bodies. Synuclein protofibrils can also be directly toxic, leading to the formation of oxidative stress that can further impair the UPS by reducing ATP levels, inhibiting the proteasome, and by oxidatively modifying parkin. This leads to accelerated accumulation of aggregates. Phosphorylation of α-synuclein-containing or tau-containing aggregates might have a role in their pathogenicity and formation, but it is not known whether leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) mediates this. Another main pathway is the mitochondrial pathway. There is accumulating evidence for impaired oxidative phosphorylation and decreased complex I activity in Parkinson's disease, which leads to reactive oxygen species (ROS) formation and oxidative stress. In parallel, there is loss of the mitochondrial membrane potential. This leads to opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP), release of cytochrome c from the intermembrane space to the cytosol, and activation of mitochondrial-dependent apoptosis resulting in caspase activation and cell death. There is evidence that recessive-inherited genes, such as phosphatase and tensin homologue (PTEN)-induced kinase 1 (PINK1), Parkinson's disease (autosomal recessive, early onset) 7 (DJ1) and HtrA serine peptidase 2 (HTRA2, also known as OMI), might all have neuroprotective effects against the development of mitochondrial dysfunction, although the exact site of their action remains unknown. Parkin has also been shown to inhibit the release of cytochrome c following ceramide-induced stress, and is itself modified by the interacting protein BCL2-associated athanogene 5 (BAG5). Dysfunction of both pathways leads to oxidative stress, which causes further dysfunction of these pathways by feedback and feedforward mechanisms, ultimately leading to irreversible cellular damage and death. I–IV, mitochondrial electron transport chain complexes I–IV; -syn(PO<sub>4</sub>)<sub>n</sub>, phospho-α-synuclein; A30P, alanine to proline substitution at -synuclein amino acid residue 30; A53T, alanine to threonine substitution at -synuclein residue 53; E<sub>1</sub>, ubiquitin activating enzyme; E<sub>2</sub>, ubiquitin conjugating enzyme; E46K, glutamic acid to lysine substitution at -synuclein residue 46; NO, nitric oxide; 3n/4n, 3 or 4 copies of α-synuclein; Tau(PO<sub>4</sub>)<sub>n</sub>, Tau(PO<sub>4</sub>)<sub>n</sub>, phospho-Tau; UCHL1, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1.

## Huntingtonova nemoc (chorea)

- prevalence 4-10/100 000 v bělošské populaci
- opožděná manifestace
  - nástup symptomů typicky mezi 35. – 50. rokem, ale závisí na genetice
  - úmrtí za 15-20 let po nástupu (~12% pac. spáchá sebevraždu)
- progresivní neurodegenerativní AD onemocnění v důsledku ztráty neuronů striata a kortextu
- etiopatogeneze
  - genetika - expanze CAG (Gln) triukleotidových repeatů v exonu 1 (celkem 67 exonů) genu kódujícího huntingtin (htt, 4p16.3)
    - htt je 350kDa protein kódovaný genem s normálním počtem CAG repeatů 6 - 35
    - u HD je repeat 36 - 121
      - pozdější manifestace CAG <60
      - časná manifestace CAG >60
      - ale u jedinců s 36-41 repeaty < 100% penetrance !!
      - délka repeatů roste s generacemi při paternální transmisí - fenomén anticipatione
    - délka repeatů roste s generacemi při paternální transmisí - fenomén anticipatione
  - misfolded htt je obsažen v inkluzních těliscích. mutantní htt ovlivňuje expresi genů kritických pro normální funkci striata a kůry
- symptomy
  - časné - nešikrovost, porucha rovnováhy, mimovolní pohyby, pokles koncentrace, deprese, podřízenost
  - pozdní - chorea, ztráta volní motoriky, porucha řeči, kognitivních funkcí a demence
- důsledek - generalizovaná atrofie mozku (o 25-30%), hlavně striata
  - porucha GABA-ergní stimulace



## HD - huntingtin



## Neurodegenerativní nemoci jako proteinopatie

- proteinopatie způsobené kumulací toxicích dávek mutovaných proteinů náchylných k agregaci
  - Alzheimerova choroba
  - Parkinsonova choroba
  - ALS
  - Huntingtonova choroba
  - další
- rezistence nebo současná porucha v odstraňujících systémech
  - ubiquitin-proteasom
  - autofagie
- důsledkem je ER stress (UPR) a tím vyvolání apoptózy

Table 20.15

Changes in the major neurotransmitter profile in Parkinson's and Huntington's diseases


Condition	Site	Neurotransmitter
Parkinson's disease	Putamen	Dopamine ↓ 90% Norepinephrine (noradrenaline) ↓ 60% 5-HT ↓ 60%
	Substantia nigra	Dopamine ↓ 90% GAD + GABA ↓↓
	Cerebral cortex	GAD + GABA ↓↓
Huntington's disease	Corpus striatum	Acetylcholine ↓↓ GABA ↓↓ Dopamine: normal GAD + GABA ↓↓

GABA,  $\gamma$ -amino butyric acid; GAD, glutamic acid decarboxylase, the enzyme responsible for synthesizing GABA; 5-HT, 5-hydroxytryptamine

© Elsevier Science Ltd


## Alzheimerova choroba = beta-amyloidopatie a Tauopatie

- beta-amyloid vzniká odštěpením z neuronálního proteinu - amyloidového prekurzorového proteinu (APP) enzymy sekretázami





- za normálních podmínek - alfa-sekretáz - odštěpuje plně solubilní peptidy
- za patologických podmínek - následné stěpení beta- a gamma-sekretázami - vznikají částice peptidů, které v mezibuněčném prostoru koaguluji, polymerují - vzniká beta-amyloid (tvoří základ plaku)

- Tau protein - součást neuronálních mikrotubulů, které zpevňuje



## Alzheimerova choroba - demence




# Alzheimerova choroba - demence

- nejprve
  - ztráta paměti (zejména krátkodobé; tj. porucha učení a zapamatování si učeného)
  - rapidně se zhoršuje zapomnělivost
  - problémy najít vhodné slovo při výkusu
  - problémy s vykonáváním běžných domácích úkolů
  - poruchy řeči a plynulého vyjadřování (nedokončování myšlenek)
  - zhoršená orientace i ve známém prostředí
  - zhoršující se schopnost úsudku, stále obtížnější rozhodování
  - problémy s abstraktním myšlením
  - ukládání věcí na jiná místa, problémy s úklidem
  - problémy při oblečení
  - změny osobnosti, nálady a chování
  - ztráta zájmu o koníčky a zaměstnání
  - ztráta iniciativy
- pak pokles tzv. kognitivních funkcí
  - myšlení
  - paměť
  - úsměv
- později bývá nejčastější příčinou demence
  - závislost nemocného na každodenní pomocí jiného člověka
  - stadia
    - lehká demence: ohřívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovářnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – soběrost a egocentrickost
    - střední: poruchy spodnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomocí při vykonávání osobní hygieny a oblečení, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavu zmatenosti
    - težká: poruchy příamu potravy, nerozpoznaní blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti související řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy využívání moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt





# Nervosvalová ploténka




# Poruchy mozečku

- nezahajuje motorickou aktivitu, ale je nezbytný pro provádění pohybů zaměřených na cíl (prostorová a časová koordinace)
- důsledku
  - vestibulocerebellární symptomatologie
    - nutná vizuální kontrola, jinak není možná orientace v prostoru
  - mozečková ataxie
    - snížená přesnost pohybů, zejm. kroků, a porucha rovnováhy
  - adiadochokineze
    - neschopnost provádět opakovány synchronní pohyby
  - dysmetrie
    - nepřiměřenost pohybu
  - mozečkový (intenční) tremor



# Poruchy nervosvalové ploténky

- chemické ovlivnění
  - kurare-typ
    - blok aktivace Ach receptorů (reverzibilní)
  - botulotoxin-typ
    - blok uvolnění Ach (irreverzibilní)
  - organofosfáty
    - blok Ach-esterázy
- myasthenia gravis**
  - typický nástup mezi 20. – 30. rokem, 2× častěji ženy
  - etiology
    - iako u jiných autoimunit přesně neznámá, ale 75% případů MG je spojeno s přítomností thymomu či hyperplazie thymu
  - patogeneze - autoimunitní
    - produkce blokujících Ab proti Ach receptorům
    - autoprotilátky rovněž stimulují degradaci AchR komplementem, což má za následek progresivní slabost svalů
  - symptomy
    - sval. slabost (ptóza, diplopie, žvýkání, řeč, respirace)
    - únavu
- Lambert-Eatonův syndrom
  - blokáda presynaptického uvolňování Ach
  - paraneoplastický (malob. ca plic)




## Poruchy funkce kosterních svalů (myopatie)

- v důsledku vrozené nebo získané poruchy metabolismu nebo struktury svalu
- manifestace
  - funkční porucha – slabost, myotonie, paralýza
  - atrofie svalu – imobilizace, denervace, katabolismus
  - myodystrofie – strukturální přestavba sval. tkáně (nahrazení vazivem a tukem)
- onemocnění
  - metabolické myopatie → sval. slabost
    - vrozená enzym. porucha metabolismu cukrů (glykogenózy), MK (sfingolipidózy) a mitochondriálního metabolismu
  - poruchy cyklu excitace-kontrakce-relaxace
    - maligní hypertermie - mutace ryanodinového receptoru ( $\uparrow$  intracel. Ca – kontrakce – hypertermie)
    - mutace kanálů pro ionty (Na, Cl, Ca, K)  $\rightarrow$  myotonie nebo paralýzy
  - poruchy kontraktilelního aparátu (aktin, tropomyosin)
  - myodystrofie (muskulární dystrofie)

## Myodystrofie

- progresivní degenerace, zánik a přestavba svalu
- typy
  - poruchy dystrofinu
    - spojuje sarkolemu s kontraktilelním aparátem (prostřednictvím syntrofinů) i ECM (lamininu) a tím poskytuje svalu mechanickou pevnost a odolnost vůči poškození
    - projevy - pseudohypertrofie svalu, slabost, kontrakturny, lordóza a skolioza páteře, kardiomyopatie, porucha ventilace,  $\uparrow$  CK v plazmě
    - Duchennova muskulární dystrofie (AR, X-chrom. - pouze muži)
      - úplné chybění dystrofinu v důsledku mutace v genu
      - postihuje také myokard
    - Beckerova muskulární dystrofie (AR)
      - částečné chybění dystrofinu nebo jiného proteinu komplexu
  - ostatní



## Myodystrofie

