

Patofyziologie vylučovacího systému – část I


Glomerulární hemodynamika a GFR

Metody stanovení GFR

Filtrační membrána a její patologické změny

Proteinurie



Onemocnění glomerulů



1


Průtok krve ledvinou a funkce ledvin

- ledvinou protéká cca 1200 ml/min, což představuje ~20-25% srdečního výdeje
 - průtok kůrou >>> dělení ledvin
- ale arteriovenózní rozdíl v saturaci hemoglobinu je velmi malý
 - při 100% saturaci Hb O₂ v arteriální krvi je saturace Hb ve venózní krvi vytékající např. ze srdce 35%, u mozku 50%, ale v ledvině celých 90%
 - velká perfuze ledviny tedy primárně slouží regulačním účelům a ne nutrici
- krevní zásobenění ledviny
 - a. renalis → aa. interlobares → aa. arcuate → aa. interlobulares → aferentní arterioly → glomerulární kapiláry → eferentní arterioly →
 - peritubulární kapilární síť (u kortikálních nefronů)
 - vasa recta (u juxtamedulárních nefronů)
- regulace
 - extracelulárního objemu
 - tonicity a osmolarity
 - acidobazické rovnováhy
 - dusíkového metabolismu
 - homeostázy kalcia a fosfátů
 - hematokritu



2


Nefron – zákl. transportní procesy



- glomerulární filtrace
 - na základě hydrostatických a osmotických tlakových gradientů (Starlingovy síly)
 - omezení velikostí látky <65kDa a dalšími kritérii
- tubulární resorpce
 - typicky symporty
 - např. Na/Glc, Na/AK, ...
 - satureovatelná kapacita (transportní maximum, T_m)
 - renální prahy pro látky (např. Glc)
- tubulární sekrece
 - aktivní (ATP)
 - sekundárně aktivní

3


Předpoklady normální kontroly homeostatických parametrů ledvinou



- dostatečný průtok krve ledvinou
 - autoregulace vs. systémové efekty
- dostatečné množství glomerulárního filtrátu
 - prvním krokem v tvorbě moči je ultrafiltrace plazmy
 - ultrafiltrát je prostý buněk a proteinů, přičemž koncentrace nízkomolekulárních látek je v něm stejná jako v plazmě
 - GFR je základním parametrem funkce ledvin
 - množství glom. filtrátu za min
 - dolní hranice normy ~100 ml/min/1.73m²
 - přirozený věkový pokles (>40 let) 0.4 - 1.2 ml/min/rok
- neporušená funkce tubulárního epitelu
 - tubulární resorpce cca 99% glom. filtrátu
- správná funkce peritubulárních kapilár
 - u korových i juxtamedulárních nefronů

4


Dva typy nefronů



5


- kortikální nefrony (cca 80%)
 - zevní 2/3 kůry
 - kratší tubuly a zejm. Henleovy klíčky (LH)
 - účast v reabsorpci solutů, ne v koncentraci moči
 - klíčky peritubulárních kapilár
 - důležité autoregulačně
 - tubulo-glomerulární zpětná vazba
- juxtamedulární nefrony
 - vnitřní 1/3 kůry
 - mají delší LH zasahující hluboko do osmoticky koncentrované dřeně
 - důležité pro produkci koncentrované moči
 - kapiláry - vasa recta (z eferentní arterioly) spolu s LH tvoří „protiproudový“ koncentrační systém
- různé choroby mohou zasáhnout různě tyto dvě populace a mít tudíž rozdílný efekt na ledvinné děje

Různá délka LH a kapilár – různá funkce




6

Proti-proudový systém ve dření



7



GLOMERULÁRNÍ FILTRAČNÍ RYCHLOST (GFR)

8

Determinanty GFR

- rychlost ultrafiltrace plazmy do Bowmanova pouzdra je určena:

— $GFR = A \times K \times P_f$

- tedy závisí na:

— A = velikost celk. filtrační plochy (~100m²)


- počet glomerulů
 - mění se s úbytkem funkčních glomerulů
- efekt mesangiálních buněk
 - mají schopnost kontrakce (a tím ↓ A)

— K = propustnost filtrační membrány


- mění se při nemocech ledvin ovlivňujících strukturu glom. filtr. membrány (viz dále)

— P_f = efektivní ultrafiltrační tlak


- závisí na rozdílu hydrostatických a onkotických tlaků mezi glom. kapilárami vnitřkem Bowmanova pouzdra (Starlingovy síly)




Mikrocirkulace – Starlingovy síly




situace obvyklá jinde v mikrocirkulaci kromě ledvinných glomerulů



Glomerulární filtrační tlak




Glomerulus - Starlingova rovnováha



- na rozdíl od běžných kapilár hydrost. tlak v celé délce glom. kapiláry poklesá minimálně (v důsledku autoregulace), takže filtrace je cca 100-krát větší oproti jiným kapiláram
- hydrostatický tlak
 - glomerulární hydrostatický tlak (P_{GC}) je vysoký a konstantní
 - ~45-55 mmHg
 - to je vyrovnáváno tlakem v Bowmanově pouzdře (P_{BC})
 - ~10-15 mmHg
 - čistý filtrační tlak tedy ~35 mmHg
- osmotický tlak (Π_{GS})
 - ~25-30 mmHg
 - díky velké filtraci tekutiny se Π_{GS} dále zvyšuje v průběhu kapiláry a dojde k vyrovnání

Srovnání různých kapilár




Pozn. k obr.: faktor vypuzující tekutinu z kapiláry je $(P_c + \pi_c)$, faktor nasávající je $(\pi_c + P_i)$.

13

Regulace krevního průtoku v ledvině

- autoregulace RBF
 - (1) **myogenní regulace**
 - SMC af. a ef. arterioly detekují tenzi a upravují rezistenci svou kontrakcí (brání přílišnému rozpětí)
 - (2) **tubuloglomerulární zpětná vazba (TGF)**
 - juxtaglomerulární aparát detekuje event. změny NaCl koncentrace a uvolňuje renin
 - aktivace lokálního RAS zajišťuje kontrakci nejdříve eferentní arterioly a tím zvýší filtrační tlak (při vyšších koncentracích AT II pak aferentní)
- další parakrinní faktory
 - prostaglandiny, adenosin a NO**
- sympatikus – systémový zájem
 - NA z adrenergických nerv. zakončení a cirkulující A z dřene nadledvin působí konstrikcí a. i e. arterioly (α_1 -rec.)
 - pokles RBF a GFR
 - NA stimuluje uvolnění reninu z granulárních JG-bb. (β_1 -rec.) a tím aktivaci systémového RAS
 - NA \uparrow reabsorpci Na⁺ v prox. tubulu
- systémový RAS




15


Průtok krve ledvinou a GFR

- u zdravého člověka je průtok krve ledvinou a GFR (díky autoregulaci) velmi konstantní
 - veškerý objem plazmy proteče normálně ledvinou za cca 20 min
 - kolísání systémového tlaku
 - v rozmezí 80–180 mmHg se udržuje poměrně stabilní RBF díky autoregulaci
 - teprve při významném poklesu selhává perfuze ledviny (\rightarrow ischemie, nekróza)
- renal blood flow (RBF) a renal plasma flow (RPF)
 - RBF \sim 1000-1200 ml/min
 - tj. \sim 20-25% of CO (kortex \gg medula)
 - vysoký průtok vzhledem k váze ledviny (\sim 350 g)
 - RPF (hematokrit 0.45) \sim 600-700 ml/min
- glom. filtrace
 - GFR \sim 20-25% RPF \rightarrow **GFR \sim 120–140 ml/min**
 - poměr GFR/RPF = filtrační frakce (\sim 120/600 = \sim 0.2)
 - denně \sim 180 l
 - 99% reabsorpce \rightarrow 1.5–1.8 l moči/den
- GFR a RPF mohou být měřeny přísl. metodami clearance
 - RPF (RBF) - PAH
 - GFR – kreatinin, inulin (experimentální) aj.

AUTOREGULATION




Autoregulace RBF vs. systémový zájem



16

(1) Myogenní regulace (Baylissův efekt)

Když se arteriální tlak zvyšuje, je rozpínána aferentní arteriola




Hladké svalové buňky cév odpovídají kontrakcí a tak se zvýší rezistence




17

(2) Tubuloglomerulární zpětná vazba



19


Mechanismus Baylissova efektu



(A) Increasing pressure causes vasoconstriction. (B) The BE is mediated by the smooth muscle layer, independent of the inner layer of endothelial cells. (C) Proposed mechanism for stretch-induced activation of stretch-activated receptors in vascular smooth muscle membranes.


Juxtaglomerulární aparát

- tubulární and vaskulární komponenta
 - (1) tubulární komponenta
 - specializovaná oblast distálního tubulu blízko aferentní a eferentní arterioly (**macula densa**)
 - buňky macula densa jsou citlivé na NaCl a kontrolují podle něj produkci reninu v **juxtaglomerulárních bb.** (JG-bb.)
 - (2) vaskulární komponenta
 - aferentní a eferentní arteriola** téhož nefronu
 - extra-glomerulární **mesangium**
- JG-bb. (**granulární bb.**) jsou specializované hladké sval. bb., které produkují a skladují renin
- bb. macula densa nemají bazální membránu, což umožňuje těsný kontakt s JG-bb.
- vaskulární a tubulární komponenty jsou bohatě inervovány **sympatikem**



20


Detailní mechanismus TGF



- macula densa cells (at the junction of ascending limb of loop of Henle and distal convoluted tubules)
 - presence of Na-K-2Cl symporter
 - when \uparrow NaCl content at macula densa cells \rightarrow \uparrow NaCl uptake \rightarrow swelling of macula densa cells \rightarrow release of ATP
 - stimulation of purinergic P2 receptors on mesangial cells and afferent arteriole smooth muscles
 - alternatively ATP may be metabolised to adenosine, which also causes vasoconstriction here
 - adenosine normally causes vasodilation in other tissues !!!
- effect of increased NaCl content
 - contraction of mesangial cells and contraction of afferent arteriole
 - reduction in effective filtration area
 - decreases GFR and RBF
 - NaCl content at macula densa also \downarrow renin release
- effect of decreased NaCl content
 - opposite

21


Vallon V Physiology 2003;18:169-174
©2003 by American Physiological Society



Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

22


Další regulátory glom. hemodynamiky



- sympatikus
 - sympatická inervace arterioli glomeruli
 - 3x hustší v aferentní arteriole
- vazoaktivní peptidy
 - receptory pro vasodilatátory zejm. v AA
 - jejich blokáda (např. COX1 inhibitory) může snížit GFR bez změny tlaku


Tři hlavní mechanismy ovlivňující uvolnění reninu

- (1) signals at the individual nephron
 - decreased NaCl load at the macula densa
 - decreased afferent arteriolar pressure (probably mediated by a cellular stretch mechanism)
- (2) signals involving the entire kidney
 - beta1-adrenergic receptor stimulation at the juxtaglomerular cells
 - at the same time, negative-feedback inhibition by AT II at the JG cells
 - other hormonal factors
- (3) local effectors
 - prostaglandins E2 and I2
 - nitric oxide
 - adenosine
 - dopamine
 - arginine vasopressin




24

Renin-angiotensin-aldosterone system



25


Systémový RAAS



- angiotensinogen v ledvině
 - původu systémového (z jater)
 - rovněž produkovaného lokálně (proximální tubulární bb.)
- renin
 - z JG-bb. uvolňován do aferentní arterioly a renálního intersticia, kde tvoří AT I z cirkulujícího angiotensinogenu a dále AT II pomocí cirkulujícího ACE

26

Hlavní efekty RAAS v ledvině




- kontrakce mesangia
- kontrakce eferentní arterioly
- reabsorpce Na v proximálním tubulu

27


Lokalizace ATII receptorů v ledvině

- 1-vazokonstrikce
- 2-omezeně vazokonstrikce a inhibice tvorby a uvolňování reninu
- 3-preferenční vazokonstrikce
- 4-kontrakce
- 5-Na⁺ reabsorpce
- 6-Na⁺ reabsorpce
- 7-vazokonstrikce
- 8-efekt neznámý



28

Signální kaskáda AT II



- AT II receptory vykazují bifazickou odpověď
 - (1) aktivace fosfolipázy C (PLC)
 - PIP2 štěpení na IP3 a DAG (mobilizace intracelulárního Ca)
 - (2) DAG aktivuje proteinkinázu C (PKC), hydrolyzuje fosfatidylcholin aktivací fosfolipázy D (PLD) a alkalizuje intracelulární prostředí


Měření GFR

- GFR je základní parametr charakterizující ledvinné funkce
 - ale objem glomerulárního filtrátu vytvořený za časovou jednotku **není přímo měřitelný**
- dostatečně přesně ji lze určit
 - (1) stanovením **clearance** některých látek splňujících určité předpoklady (viz dále)
 - endogenní – kreatinin, urea
 - exogenní
 - neznačený tracer – např. inulin,
 - radiokontrastní - iohexol
 - radioaktivní isotope – $[^{51}\text{Cr}]$ EDTA, $[^{125}\text{I}]$ iothalamate, $[^{99\text{Tc}}\text{m}]$ DTPA
 - (2) **odhadem** GFR na základě plazmatických hladin endogenních látek **pomocí rovnice**
 - kreatinin - Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI, ...
 - jiné endogenní markery (volně filtrované a kompletně degradované tubulárními buňkami)
 - β 2-mikroglobulin, cystatin C, ...




RBF je regulován v konfliktním zájmu

- při mírném poklesu systémového tlaku autoregulačně
 - snaha zachovat perfuzi ledviny, GFR a homeostázu
- při výrazném poklesu (emergentní cirkulační situace) je ledvina "odstavena" (viz B a C obrázek)
 - prerenální azotémie
 - případně s morfologickými důsledky (akutní tubulární nekróza)




Clearance

- látka musí splnit určité předpoklady
 - nízkomolekulární, volně filtrované do moče, neváží se na bílkoviny plazmy
 - nepodléhají další degradaci
 - nepodléhají tub. reabsorpci ani sekreci
 - koncentrace v plazmě a analogickém objemu glom. filtrátu je stabilní
 - detekční metoda je jednoduchá, levná a standardizovatelná (mezi pracovišti)
- v tom případě koncentrace v definitivní moči se pak změní tolikrát, kolikrát klesl objem oproti glom. filtrátu
 - $[P] \times GF = V \times [U]$
- clearance látky X = **objem plazmy úplně očištěný za jednotku času od látky X**
 - rozměr: objem/čas
 - vyžaduje sběr moči za čas
 - ideálně 24 hodin, často méně




Kreatinin

- vzniká ve svalch z kreatinu
- při průchodu ledvinou je z 90% filtrován, z 10% secernován do moči tubuly
 - podíl tubulární sekrece roste při poklesu flitrace (pokles počtu fungujících nefronů)
 - tzn. čím menší GFR, tím méně přesné stanovení GFR pomocí Ckr, ale i přesto je kreatinin nejlepším endogenním ukazatelem GFR
- možný problém s kvantitativním sběrem moči
 - nedostatečná spolupráce pacienta
- koncentrace S-kreatininu je přímo úměrná svalové hmotě organismu (a tedy nepřímo závislá na věku a pohlaví)
 - plazmatický kreatinin = 35 – 100 $\mu\text{mol/l}$, produkce 1.2mg/min
 - proto často korekce na stand. 1.73m²
 - ale ani to nemusí odstranit diskrepanci
 - 25-letý atlet x 60-letý obézní muž = stejná váha a povrch
- intraindividuální kolísání nepřesahuje 10 - 15%
 - hladiny rostou po fyzické námaze
 - při příjmu exogenního kreatininu (maso)
 - zejména smažené




33

GFR je v jednotl. nefronech heterogenní



34




TUBULÁRNÍ REABSORPCE A SEKRECE

35


Tubulární reabsorpce a sekrece

- komplexní povaha (aktivní i pasivní děje)
 - epitelové buňky ledvinných tubulů (a jejich hormonální řízení)
 - reabsorpce je transport z apikální na bazolaterální stranu
 - sekrece je transport z bazolaterální na apikální stranu
- různé části tubulů mají různé funkce - specializace tubulárních segmentů
 - reabsorpce probíhá téměř z 90% v prox. tubulu různými formami transportu
 - ~75% Na^+ (a HCO_3^-), Cl^- a H_2O
 - ~90% K^+
 - sekrece K^+ probíhá ve sběracích kanálcích, množství závisí na koncentraci Na^+ v přísl. oblasti aldosteronu
 - distální tubulus a sběrací kanálek jsou pod vlivem ADH & aldosteronu




36

Typy transportu




37

Reabsorpce Na⁺ (a HCO₃⁻)




38

Hormony regulující ledvinné funkce




39



Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

Hormony regulující ledvinné funkce




Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

40


Diuretika

zvyšují objem vylučované moči (přesněji zvyšují proporcii glomerulárního filtrátu, který je vylučován jako moč)

- typy
 - inhibitory karboanhydrázy
 - zvyšují osmotický tlak filtrátu
 - kličková diuretika
 - inhibují NaCl transport ze vzestupné části LH
 - thiazidová diuretika
 - inhibují NaCl reabsorpci v 1. segmentu DCT
 - osmotická diuretika
 - šetrící exkreci kalía
 - kombinovaná



41




Struktura a funkce glomerulární filtrační membrány
 Filtrace a reabsorpce albuminu a dalších proteinů
 Albuminurie, proteinurie a nefrotický a nefritický syndrom

FILTRAČNÍ MEMBRÁNA

42

Vlastnosti filtrační membrány




- vlastnosti
 - size-selectivity
 - limit mol. velikosti
 - naprosto volně <7kDa
 - podle množství 7-70kDa
 - ne >70kDa
 - charge-selectivity
 - negativní náboj (a to i proteiny <70kDa)

43



Struktura glom. filtrační membrány

- (1) endotel
 - fenestrace – filtr ~50-100nm Ø
 - separace zejm. kr. buněk
- (2) glom. bazální membrána (GBM)
 - síť (glyko)proteinů (kolagen IV, laminin, entactin, agrin, ...) a mukopolysacharidů tloušťky ~300nm se sumárním **negativním nábojem**
 - velikostní a separace většiny proteinů >70kDa (~4nm Ø)
 - hemoglobin (~40kDa) ano
 - myoglobin (~17kDa) ano
 - β2-mikroglobulin (12kDa) ano, ale reabsorbován
 - paraprotein (<70kDa) ano
 - neg. náboj – heparansulfáty, kys. hyaluronová a sialová
 - albumin (~67kDa) z větší části ne/omezeně ano
- (3) viscerální epitel Bowmannova pouzdra = podocyty
 - prim., sec. a tert. foot proceses (pedikly)
 - slit diaphragm (cell-cell junction)
 - významně se podílí se na velikostní (i nábojové) separaci proteinů
- (4) mesangium
 - nepřímo ovlivňuje filtrace proteinů – při kontrakci zvyšuje filtrační tlak



44

Podocyty – štěrbinová membrána



45 Johnstone DB and Holzman LB (2006) Clinical impact of research on the podocyte slit diaphragm. *Nat Clin Pract Nephrol* 2: 271–282 doi:10.1038/ncpneph0180


Protein v moči (1) - norma

- fyziologicky přítomné proteiny v moči
 - tvořené tubulárními buňkami ledvin
 - Tamm-Horsfallův protein (= uromodulin)
 - glykoprotein produkovaný bb. asc. raménka Henleovy kličky
 - funkce nejasná (imunomodulace, ochrana před krystaly a infekcí?)
 - hl. součást hyalinních válců
 - uropontin
 - IgA imunoglobulin
 - nephrocalcin
 - filtrované, ale reabsorbované a degradované v tubulu
 - albumin (viz detailněji)
 - α 2- a β 2-mikroglobulin, enzymy, apoproteiny, peptidové hormony, ...
- citlivost běžných dg. metod je nastavena tak, aby nedetekovala proteiny a fragmenty albuminu, ale odhalila klinicky závažnou proteinurii, při které se do moči dostává >0.5 g proteinů



47


Proteiny štěrbinové membrány



- (1) bazální doména - ukotvení k GBM
 - integriny, DG = dystroglycan
 - (2) cytoskelet - tvar
 - actin, myosin, synaptopodin, actinin
 - (3) junkční doména – slit diaphragm
 - nephrin, Neph1, podocin, CD2AP = CD2-associated protein, ZO-1 = zona occludens-1 protein, densin, FAT = mammalian homolog of *Drosophila* fat protocadherin
 - (4) apikální doména – neg. náboj
 - podocalyxin, podoplanin, podoendin, GLEPP-1 = glomerular epithelial protein-1, další proteiny a receptory (NHERF-2 = Na⁺/H⁺ exchanger regulatory factor-2, ...)
- 46

Human serum albumin (HSA) paradox

- HSA ~65kDa
- obsahuje ~ 185 nabitých reziduí (Asp, Glu, Lys)
 - jejich povrchová distribuce a výsledný náboj je variabilní vzhledem k mnohočetným funkcím, která albumin fyziologicky zastává
 - transport (FFA, bilirubin, Ca, Mg, hormony, léky, vitaminy, ...)
 - pufr / ABR
 - enzymová aktivita (antioxidační, esterázová)
 - onkotický tlak / TK
 - AK pool
- nakládání ledvin s albuminem
 - (1) omezená filtrace (?)
 - elektrostatická repulze albuminu nebyla vždy exp. prokázána
 - koncepce byla dominantně postavena na nepřítomnosti albuminu v moči – viz dále
 - (2) tubulární reabsorbce
 - endocytoza = degradace (→ AA)
 - (3) tubulární degradace




48

Kinetika filtrace albuminu


- RPF ~ 700ml/min → GFR ~ 120ml/min = ~ 180l/den
 - krev, která proteče ledvinami za den obsahuje ~7.2kg albuminu
 - při ~40g/l v plazmě (70g/l CB)
 - denní ztráty močí ~25-40mg (tj. ~99.9% je zadrženo)
- původní představy o kinetice albuminu byly získány na základě clearance studií, mikropunkce glomerulů, imunodekce látek aj.
 - pokroky v metodologii – celotělové kinetické studie s $[^3\text{H}]$ nebo $[^{125}\text{I}]$ albuminem naznačují, že množství vyloučeného albuminu je určeno kombinovaným efektem omezené filtrace, tubulární reabsorbce a tubulární degradace
 - filtrace albuminu asi o něco vyšší než se původně předpokládalo

- při normální GFR (~180l/d) a filtrační frakci (0.2) by mohlo být filtrováno a kompletně reabsorbováno až ~1.5kg NaCl/den
 - ~70% v prox. tubulu účinkem NHE-3 transportéru
 - SHR (spontánně hypertenzní krysy) mají 3x ↑ aktivitu
 - human EH (hypoteticky ↑ aktivita + efekt ATII)
 - odtud vztah hypertenze - albuminurie



49

Normal renal handling of albumin




(a) Albumin (represented by green spheres) normally remains within the capillaries of the glomerular tuft, and does not escape into the urinary (Bowman's) space. (b) Fenestrae within specialized endothelial cells are covered by a negatively charged glycocalyx. Podocytes attach to the outermost aspect of the GBM by foot processes, between which are proteins comprising the size barrier slit diaphragm. (c) The albumin that is physiologically filtered at the level of glomerulus into the urinary space is taken up by the megalin/cubulin receptor lining the brush border of proximal tubular cells. Albumin is internalized by vesicles, and upon lysosome action, the resultant fragments are either reabsorbed or secreted back into the tubular lumen as albumin fragments.


50

Mechanismus proximálně tubulárního re-uptake albuminu

- receptor-mediated endocytosis
 - vysoká kapacita/nízká afinita
 - stejný mechanismus je využíván i jinde (např. při absorpci komplexu vit. B12/intrinsic faktor v ileu)
 - endocytický komplex
 - megalín/cubilin – vazba albuminu
 - Imlerslund-Graesbeck disease (mutace v genu pro cubilin) - proteinurie
 - Fanconiho syndrom (mutace v genu pro megalin) - proteinurie
 - NHE3 – nutný pro acidifikaci endosomu/lysozomu
 - NHE3 KO zvířata - proteinurie
 - CIC5 – interakce s cytoskeletem
 - Dent's disease (mutace v genu pro CIC5) - proteinurie
 - H-ATPase - nutný pro acidifikaci endosomu/lysozomu





51



52


Megalin/cubilin



53

Patogeneze glomerulární proteinurie

- kongenitální
 - postižení GBM
 - např. Alportův syndrom (mutace genu pro kolagen)
 - postižení podocytů (resp. slit diaphragm)
 - mutace v genech pro nephrin, podocin, ...
- získané - postihují jakoukoliv část glomerulu
 - imunitní mechanismy - typicky **glomerulonefritidy**
 - cirkulující nebo in situ imunokomplexy (90 %)
 - antigen: bakterie (β -hemolyt. Strepto-, Stafylo-, Pneumokoky), paraziti, viry, endotoxin, součásti buněk (u SLE), léky, ...
 - záleží na velikosti IK zda zůstanou v cirkulaci (\rightarrow vaskulitidy), budou vychytány fagocytujícími bb. nebo se dostanou (díky obrovskému průtoku a fenestrování endotelu) do ledvin
 - protilátky proti GBM, antineutrofilní nebo proti buňkám glomerulů (10 %)
 - neimunitní – ischemie, hyperfiltrace, toxiny, infekce, ...
 - např. diabetes, hypertenze, amyloidóza, HIV, ...



55

Protein v moči (2) - proteinurie


- (a) funkční proteinurie
 - příčina není v poruše funkce glomerulární membrány, ale ve změněných hemodynamických poměrech v glomerulech (\uparrow hydrostat. tlak v kapilárách)
 - ortostatická, pochodová, při horečce, po větší fyzické námaze...
 - charakter neselektivní proteinurie
- (b) glomerulární proteinurie (obvykle $>1g/den$, často mnohem více)
 - prerenální - patologický nárůst "malých" proteinů, které mohou procházet do glomerulárního filtrátu
 - např. hemolýza (α - β -dimery globulinu), rhabdomyolýza (myoglobin), paraprotein (lehké Ig řetězce κ a λ (tzv. Bence Jonesova bílkovina))
 - selektivní - intaktní lamina densa (ztráta glykokalyxu z povrchu endotelií a podocytů)
 - albuminurie, zadrženy větší proteiny než albumin
 - neselektivní - větší strukturní poškození včetně lamina densa a hlavně podocytů
- (c) tubulární proteinurie (obvykle $<1g/den$)
 - snížená zpětná resorpce malých plazmatických bílkovin (nejvyšší zastoupení albumin a β 2-mikroglobulin v moči)
 - kongenitální (např. Dent's disease (CLC5), Imerslund-Graesbeck disease (cubilin), Fanconi ho syndrom (megalin) aj.)
 - získané (např. hypertenze)

54

Důležitost štěrbinové membrány


pc (1) studium familiárních forem nefrotického syndromu vedlo k identifikaci většiny genů / proteinů štěrbinové membrány podocytů

- **nephrin** (Finnish-type congenital nephrotic syndrome, NPHS1)
 - kongenit. defekt vývoje pediklů a tvorby
 - masivní a potencionálně letální proteinurie
 - nutnost parenterální výživy a peritoneální dialýzy
 - pro srovnání Alportův syndrom (mutace COL IV) vede k mírné proteinurii
 - delece heparansulfátu u myších modelů nevede k žádné proteinurii
- **podocin** (familial steroid-resistant nephrotic syndrome, NPHS2)
 - časně postnatální proteinurie
- další syndromy se signifikantní proteinurií (CD2AP, NEPH1, FAT, TRPC6, ...)
- (2) experimentálně lze navodit nefrotický syndrom polyklonálními protilátkami proti štěrbinové membráně nebo monoklonálními protilátkami proti nephrinu, podocinu, ...
- (3) klinický význam
 - glomerulopatie jsou dominantní příčinou proteinurie
 - dosavadní klasifikace glomerulopatií založena na histopatologickém obraze (= nespecifický)
 - budoucí molekulárně-biologická klasifikace nosol. jednotek
 - diagnostika, prognóza, léčba (steroidy ano/ne), benefit transplantace (příbuzenská/dárce), ...



56


Podocyty - foot-process effacement



- = "vyhlazení" podocytů - univerzální známka poškození podocytů
- koreluje s velikostí proteinurie ("slepice či vejce"?)
- variabilní etiologie poškození podocytů
 - ROS (→ DNA poškození, apoptóza, peroxidace lipidů)
 - AT II (→ apoptóza, hypertrofie, ↑ TGF-β, ↓ nefrin)
 - MMPs (→ ↓ GBM, ↓ nefrin-Neph komplex)
 - mechanický stress (→ apoptóza, hypertrofie)
 - růstové faktory (→ ↑ MMPs, GBM, ...)
 - hyperglykemie (→ ↓ neg. nabitě apikální proteiny)
- **zánik podocytů ⇒ proteinurie ⇒ glomeruloskleróza**
 - synechie mezi obnaženou GBM a parietálním epitelem Bowmannova pouzdra → sklerotizace (FSGS)
 - podocyty neregenerují

57

Mean decline in GFR depends on proteinuria



- mean decline in GFR (mL/min) over a 36-month period in groups with four different mean baseline 24-hour urine protein levels in non-diabetic patients with chronic renal failure in the MDRD study
 - compared in each of these four groups are the
 - normal blood pressure group (dashed line; 140/90 mm Hg; 102-107 mm Hg MAP)
 - intensive control group (solid line; 125/75 mm Hg; 92 mm Hg MAP)

Progressive renal and cardiovascular disease: Optimal treatment strategies Matthew R Weir

59


Důsledky glomerulopatie resp. proteinurie

- extrarenální
 - hemodynamika
 - ↓ onkotický tlak (edémy)
 - složení ECT
 - dyslipidemie
 - ztráty ost. látek vázaných na proteiny,
 - hypovitaminózy
 - nutrice
- intrarenální
 - albumin je v malé koncentraci nezbytný survival faktor pro tubulární bb.
 - přítomnost většího množství proteinů v tubulech vede k zánětu a intersticiální sklerotizaci
 - perpetuace renálního poškození!!!



58


Proteinuria results in the development of glomerulosclerosis and fibrosis



Progressive renal and cardiovascular disease: Optimal treatment strategies Matthew R Weir

60

Glomerulus - buňky




GLOMERULOPATIE

61

Klasifikace onemocnění glomerulů



63



62


Klasifikace onemocnění glomerulů

- skutečná příčina většiny onemocnění glomerulů není známa a proto neexistuje etiologická klasifikace, snad jen **klinicky** na
 - primární (postihují jen ledviny)
 - sekundární (projev systémového onemocnění)
 - autoimunitního (SLE, IgA nefropatie, m. Henoch-Schonlein, Goodpastureův syndrom aj.)
 - cévního (vaskulitidy)
 - metabolického (diabetes, amyloidóza)
 - nádorového (mnohočetný myelom)
 - genetického
- ale i to je sporné (imunopatologický proces zodpovědný za vznik většiny glomerulonefritid je často systémový)
- podle **průběhu** na
 - akutní
 - chronické
- do té doby se budou nemoci třídit podle klinicko-laboratorně-histologických charakteristik
 - **biopsie** ledvin je zásadní (→ mikroskopie světelná, imunofluorescenční, elektronová)
- pro **histologické** zařazení jednotlivých glomerulopatií je důležitý počet postižených glomerulů a to, která část glomerulu je patologicky změněna
 - fokální (postiženy jsou jenom některé glomeruly)
 - difusní (postiženo je více jak 80% glomerulů).
 - segmentální (jen některá struktura)
 - globální (všechny typy buněk)
- a také **stupeň buněčnosti**
 - neproliferativní
 - proliferativní



64

Obecná patogeneze glomerulonefritid




- tvorba imunokomplexů
 - v cirkulaci nebo in situ
- aktivace komplementu
 - tvorba opsoninů
 - chemotaxe
 - lýza buněk glomerulu
- infiltrace neutrofilů a makrofágy
 - proteázy – degradace buněk a ECM
- hojení
 - růstové faktory – proliferace buněk
 - vazivo (mesangium) – fibrotizace a sklerotizace

65

Obecná patogeneze glomerulonefritid

- glomerulus má pouze omezené spektrum reakcí na poškození
 - zánět
 - proliferace bb. glomerulu
 - infiltrace dalším bb.
 - proteolytická destrukce filtrační membrány
 - proteinurie
 - depozice ECM
 - fibrotizace
 - zjizvení
 - sklerotizace
 - pokles GFR
 - histologický obraz se odvíjí od toho, která součást glomerulu je přednostně poškozena
 - proliferací – např. mesangium
 - membranózní – ztlustělá GBM
 - sklerotizující – kapiláry a synechie




66

Klinický obraz glomerulonefritid

- nefritický syndrom
 - značné narušení filtračních schopností ledvin (zejm. endotel a GBM) = **oligurie**
 - obvykle větší účast komplementu
 - narušení regulační funkce ledvin vede k **hypertenzi**
 - propouštění červených krvinek = glomerulární **hematurie**
 - diff. dg. postrenální!
 - makroskopická (viditelné pouhým okem)
 - mikroskopická (laboratorně zjištěná)
 - v moči **menší proteinurie**, která nedosahuje velikosti ztrát bílkovin u nefrotického syndromu
 - jen tolik bílkovin, kolik je v příměsí krve
- nefrotický syndrom
 - narušení filtračních schopností ledvin (zejm. podocyty)
 - obvykle větší účast imunitních mechanismů
 - proto není tolik zvýšen tlak
 - dominuje **velká proteinurie**
 - obvykle ztráty bílkovin do moči >3g/den
 - v důsledku hypoalbuminémie / hyporoteinémie se snižuje onkotický tlak a vznikají
 - edémy
 - ztráty bílkovin kompenzují játra zvýšením proteosyntézy, což vede k
 - **dyslipidemie** (↑ cholesterol a TAG)
 - hyperkoagulačnímu stavu


67

The spectrum of glomerular diseases



68

Glomerulonephritis






nefrotický

nefritický




Vrozené choroby ledvin

- polycystická choroba ledvin (PKD)
 - autosomálně dominantní (ADPKD)
 - mutace v genu PKD1 (ch. 16) v 85%, v 15% případů PKD2
 - progresivně se rozvíjející mnohočetné cysty oboustranně v ledvinách
 - hypertenze
 - renální insuficience
 - ~50% případů ESRD
- recesivní forma závažnější



70



"The kidney shape was a cool idea. Reminds us what you sold to pay for it."