

# Patofyziologie vylučovacího systému - část II

- Akutní selhání ledvin
- Akutní tubulární nekróza
- Chronické onemocnění ledvin
- Chronická renální insuficience
- Renální osteopatie
- Chronické selhání ledvin
- Uremie
- Metody náhrady funkce ledvin

1



## Terminologie - ledvinná nedostatečnost

- synonymum **renální insuficience**
- stav, kdy ledviny jsou schopny udržovat normální složení vnitřního prostředí za bazálních, avšak ne za mimořádných podmínek (např.):
  - infekce
  - operace
  - nadměrný přívod bílkovin, vody či elektrolytů
- typicky důsledek **chronického onemocnění ledvin** (angl. chronic kidney disease, CKD)
  - CKD (stadium 1 - 5) definováno bez ohledu na etiologii výhradně na základě GFR (viz tabulka)
  - renální insuficience odpovídá stadium 3 - 4
  - renální selhání stadium 5


3

Stages of CKD				
Stage	Description	GFR ml/min/1.73m <sup>2</sup>	Symptoms and signs*	
1	Kidney damage with normal or increased GFR	>=90	BP +/-	
2	Kidney damage with mild GFR fall	60-89	BP Lab +/-	
3	Moderate fall in GFR	30-59	BP Lab + Symptoms +/-	
4	Severe fall in GFR	15-29	BP Lab +++ Symptoms +	
5	Established renal failure	<15 or dialysis	BP Lab +++ Symptoms ++	


## Terminologie - selhání ledvin

- patofyziologický stav, kdy ledviny nejsou schopny
  - a) vylučovat odpadní produkty dusíkatého metabolismu
  - b) udržovat rovnováhu vody a elektrolytů a AB rovnováhu
- ani za bazálních podmínek a to při příjmu biolog. minima bílkovin (0.5g/kg/den) a dostatečném energet. příjmu
- **azotemie** = zvýšení koncentrace nebílkovinných dusíkatých látek (kreatinin, urea)
  - doprovází selhání ledvin (diagnostický příznak), je konstantní součástí uremického syndromu, ale může být i bez něj
- **uremie** („moč v krvi“) = soubor klinických abnormalit (uremický syndrom) v důsledku selhání ledvin
- selhání ledvin se může vyvinout:
  - náhle u člověka, jehož funkce ledvin byla předtím normální = **akutní selhání** (stav 1 na obrázku)
  - je důsledek chronického renálního onemocnění, kdy docházelo k postupnému poklesu renálních funkcí = **chronické selhání** (stav 3 na obrázku)
    - synonymum stadium konečného selhání ledvin (angl. end-stage renal disease, ESRD)
- **etiology**
  - 1) prerenální
  - 2) renální
  - 3) postrenální
- u 70% pacientů s akutním renálním selháním se rozvíje **akutní tubulární nekróza**

2




## Autoregulace průtoku krve ledvinou a GFR




GFR ~120ml/min/1.73m<sup>2</sup>

### AUTOREGULATION




4

# Mechanismy zapojené v (auto)regulaci



5


# Vztah plazmatické hladiny kreatininu a GFR



6

# Kdo je postižen resp. ohrožen ASL

- u **5–20% kriticky nemocných pacientů** dojde k episodě ASL, v mnoha případech doprovázených multiorgánovým selháním (multiorgan dysfunction syndrome, MODS)
- rozpoznání rizikových pacientů
  - pooperační stavy
  - operace srdce
  - septický šok
  - i méně závažné situace u lidí s
    - **pre-existujícím onemocnění ledvin** (serový Kr >180 μmol/l)
    - **mnohočetnými komorbiditami** (zejm. onemocnění srdce a jater)
      - renovaskulární onemocnění nalézáno u 34% starých lidí se srd. selháním!
  - pacienti léčení **NSAID** a **ACEI**
- zabránění progrese prerenálního ASL do renální formy
  - zejm. akutní tubulární nekrózy
- udržení renální perfuze
  - izovolémie, srdeční výdej, normální TK
  - vyvarování se podání nefrotoxinů



## AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN (ASL)


7

8

# Etiologie a patogeneze ASL


- náhle vzniklý významný pokles glomerulární filtrace a exkrekčních funkcí obou ledvin
  - oligurie < 500 ml/den
  - anurie < 100 ml/den
  - někdy (zřídka) ale 1-2 l moči/den = non-oligurické ASL
  - v důsledku poškození tubulů
- neschopnost ledvin přiměřeně regulovat solnou a vodní rovnováhu a vylučovat metabolické odpady
  - k odhadu závažnosti plazmatické koncentrace urey a kreatininu
- etiology ASL
  - prerenální azotemie
  - renální azotemie
  - postrenální azotemie
- patogeneze
  - snížený průtok krve glomeruly
  - ztráta filtrační plochy
  - nebo zvýšení tlaku v ledvinových tubulech a v Bowmannově pouzdře

9




# Hepatorenální syndrom

- pre-renální forma ASL u pacientů s pokročilým onemocněním jaterního parenchymu bez klinických, laboratorních nebo anatomických nálezů postižení ledvin
- patogeneze
  - hypovolemie
    - kongesce v GIT v důsledku portální hypertenze
    - ascites
    - krvácení
  - snížený průtoku krve ledvinami při celkové hyperkinetickej cirkulaci (typické pro jaterní selhání)
    - pokles TK v důsledku periferní vazodilatace vedle kontrikce aferentní ledvinových cév s následnou ischemií kůry ledvin důsledkem aktivace sympatiku




# Specifické příčiny ASL – pre-renální

- pokles TK s následným snížením perfuze jinak normálních ledvin pod pásmo autoregulace
- selhání srdce jako čerpadla
  - akutní IM
  - arytmie s nízkým minutovým výdejem
  - tamponáda perikardu
- systémová hypovolemie
  - ztráta celé krve (hemoragie)
  - ztráta plazmy
  - ascites (hepatorenální syndrom)
- pokles odporu v systémové cirkulaci
  - sepse
  - nepřiměřená antihypertenzní terapie
- při vzniku **akutní tubulární onekrózy** přechází v renální



# Cirkulační abnormality u jaterní cirhózy




11

12

## Specifické příčiny ASL – renální

- postižena určitá strukturní součást ledviny (viz následující obrázek)
  - postižení ledvinných cév
    - obstrukce ledvinných cév
      - embolie do renální arterie
      - bilaterální stenosa či trombóza ren. arterie
      - trombóza renálních vén
    - změňený odpor ledvinných cév
      - ↓ postglomerulárního odporu (inhibitory ACE)
      - ↑ preglomerulární odpor (intrarenální vazokonstrukce)
        - antiflogistika, ...
      - neznaný mechanismus (reakce na RTG kontrastní látky...)
    - poškození ledvinných cév
      - vaskultidy
      - hemolytico-uremický syndrom
  - glomerulární nemoci
    - rychle progredující glomerulonefritidy
    - ak. tubulární poškození (akutní tubulární nekróza)
      - ischemie
      - toxiny
      - obstrukce válců (hemolýza, rhabdomyolyza, paraprotein)
  - ak. nemoci intersticia
    - toxo-alergické (léky!!)
    - infekční (hematogenní nebo pyelonefritida)
    - idiopatické

13




## Akutní tubulární nekróza (ATN)




15

- etiology
  - ischemická
  - toxicá
    - léky
      - antibiotika, antivirotyka, antifungicida, cytostatika
    - radiokontrastní nefropatie
    - toxiny z prostředí?
- příčiny vulnerability tubulů k ischemii a účinku toxinů
  - nižší perfuze dřeně než kůry, horší energetika
  - lokální zvýšení koncentrace toxinů při reabsorpci vody
  - dodatečné zvýšení koncentrace toxinů při jejich sekreci
  - intracelulární toxicita při jejich reabsorpci
  - změny toxicity při změně pH
  - na výsledném stavu se uplatňuje nejen nekróza ale i apoptóza


## Renální nefrotoxiccké ASL



Rick G. Schnellmann & Katrina J. Kelly





## Patogeneze ATN



16


## Reverzibilita ATN



tubulární epitelie regeneruje,  
ale svou roli hraje i  
reperfúzní poškození


17

## Tubular changes in ATN pathophysiology




- morphological changes occur in the proximal tubules, including loss of polarity, loss of the brush border, and redistribution of integrins and sodium/potassium ATPase to the apical surface. Calcium and reactive oxygen species also have roles in these morphological changes, in addition to subsequent cell death resulting from necrosis and apoptosis. Both viable and non-viable cells are shed into the tubular lumen, resulting in the formation of casts and luminal obstruction and contributing to the reduction in the GFR

## Vznik válců u ATN



18

## Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)



- způsobený nejčastěji bakteriálním toxinem při některých GIT infekcích (ale i jinak), který způsobí poškození erytrocytů
  - hemolytická anémie → zdroj hemoglobinurie → precipitace v tubulech a jejich obstrukce
  - také trombocytopenie → krvácivé projevy
  - enterohemoragická forma *E. coli*
  - shigellové dyzenterie
  - pneumokokové infekce
  - ASL
  - nejčastější příčina u dětí


19

20


## Specifické příčiny ASL – post-renální

- obstrukce vývodních cest močových
  - bilaterální
  - unilaterální u solitární ledviny nebo při současné reflexní anurii
    - i při jednostranné obstrukci v důsledku bolesti při renální kolice
- močové kameny
- benigní hypertrofie prostaty
- tumory prostaty, měchýře, střeva, ovaria...
- retroperitoneální fibróza nebo hematom
- neurogenní dysfunkce měchýře
- důsledky mimo ASL (riziko i při poměrně krátké obstrukci!)
  - vzestup tlaku nad obstrukcí
    - dilatace párovíčky a kalichů → **hydronefróza** → refluxní nefropatie → infekce → atrofie ledviny
  - post-obstruktivní profuzní diureza** ( $>4l/den$ )
  - hyperkalemická hyperchloremická renální tubulární **acidóza**

21




## Shrnutí patogenetických mechanismů ASL



23


## Shrnutí etiologie jednotl. typů ASL



22

## Změny vnitřního prostředí u ASL (+ dg.)


- rozvoj během několika dnů, ale v zásadě rychle!
- $\uparrow$  plazm. koncentrace urey a kreatininu (**azotemie**)
  - pozor – urea v plazmě reflekтуje více faktorů (GFR, katabolismus, nutriční) než kreatinin
- změny poměru Purea/Pcreat
  - normálně  $\sim 40-100:1$ 
    - urea je reabsorbována v prox. tubulu zatímco kreatinin ne
    - může být normální i u post-renálního ASL
  - u pre-renálního ASL často  $>100:1$ 
    - zvýšená reabsorpce při hypovolemii
  - u renálního často  $<40:1$ 
    - porucha tubulů a reabsorpce
- plazm. koncentrace  $K^+$  (**hyperkalemie**)
  - viz podrobněji později
  - $\uparrow$  během oligur. fáze
  - $\downarrow$  během polyur. fáze
- konz.  $Na^+$  = závisí na volémii
  - normální,  $\uparrow$  nebo  $\downarrow$  (diluční hyponatremie)
- metabol. acidóza** (vysoký AG)
- retence vody (+ metabolická cca 500ml) = **hypervolemie**



24


# Fáze a rizika spojená s ASL

- časový průběh změn diurézy
  - 1. iniciální fáze
  - 2. oliguricko-anurická fáze
    - (1 - 2 týdny)
  - diuretická fáze
    - postupný návrat diurézy + porucha tubulárních funkcí
  - 3. polyurická fáze (několik měsíců)
    - porucha tubulárních funkcí
  - 4. zotavovací fáze
- nebezpečí ak. stadia
  - hyperkalemie** ( $>7 \text{ mmol/l}$ )
    - arytmie, srdeční zástava
  - hypervolemie** (hyperhydratace)
    - isoosmolární
    - posléze diluč hyposmolární
      - hyponatremie → **edém mozku** → zvýšený intrakraniální tlak → ischemie a hypoxie mozku → subjektivní projevy (bolest hlavy, nauzea, zvracení) → porucha vědomí
    - nebezpečí objemového a tlakového **přetížení srdce**
    - kongesce až **edém plic**



25

# Analýza moči u ASL




- koncentrace Na<sup>+</sup> v moči:
  - při prerenální azotemii, akutní GN či změněném cévním odporu - tubuly fungují dobře a účinně odstraňují Na<sup>+</sup> ze sníženého množství filtrátu (Na<sup>+</sup> v moči  $< 20 \text{ mmol/l}$ )
  - při poškození tubulů a postrenální azotemii: Na<sup>+</sup> v moči  $> 40 \text{ mmol/l}$
- frakční exkrece Na<sup>+</sup>
  - FE-Na<sup>+</sup> = U-Na/S-Na, norma < 1 %
- osmotická koncentrace moči
  - při prerenální azotemii:  $> 500 \text{ mOsm/kg}$
  - při poškození tubulů:  $< 350 \text{ mOsm/kg}$

26

# Chronické onemocnění ledvin (CKD)

stadium	GFR (ml/min)	klinický stupeň	terminologický ekvivalent
1	$>90$	mírná	renální funkční rezerva
2	60 – 89		
3	30 – 59	střední	renální insuficie
4	15 – 29		
5	$<15$	konečné selhání ledvin (ESRD)	renální selhání

- progresivní, typicky roky trvající pokles funkce ledvin
  - definováno bez ohledu na příčinu podle stupně ↓ GFR
- etiology různá, takřka všechny nemoci ledvin
  - 50% - některá forma GN
  - 20% - diabetická nefropatie
  - 30% - ostatní
    - ischemická choroba ledvin
    - tubulointersticiální nefritis
    - polycystická choroba ledvin
    - myelomová ledvin
    - hereditární nefritidy
    - vaskulární nefroskleróza
    - ostatní




## CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVINNÉ

27

28


# Patogeneze CKD

- základním patogenetickým mechanizmem je snižující se počet fungujících nefronů
  - příznaky až po zániku >75% nefronů
  - v reziduálních nefronech dochází k funkčním a morfologickým změnám (zpočátku pozitivním) umožňujícím zvýšení výkonu zbytkových nefronů
    - prevážajúci dilatacii af. arterioly s intraglomerulární hypertenzi, průtok plazmy a glomerulární filtrace v jednotlivém nefronu se zvyšuje
- kompenzační hyperperfuze a hyperfiltrace** ve zbylých nefronech vede k jejich mechanické zátěži a poškození
  - aktivace růstových faktorů (PDGF, IL-1, AG-II, TGFB, TNF)
  - tubulární buňky reziduálních nefronů jsou vystaveny větší metabolické zátěži (funkční adaptace reziduálních nefronů)
  - pronikání albuminu a později dalších proteinů přes filtrační membránu a do mesangiálních oblastí
  - postupná fibrotizace a glomerulosklerotizace
- pokles GFR**, renální nedostatečnost a event. selhání
- CKD je spojeno s **vysokou kardiovaskulární úmrtností**, mnohonásobně převyšující mortalitu




# Perpetuace základního onemocnění

- zánik nefronů podmíněný **základním patologickým procesem**
- zánik nefronů způsobený **funkční a morfologickou adaptací reziduálních nefronů**
- zánik nefronů podmíněný **reno-parenchymatovní sekundární arteriální hypertenzí**
  - tedy při určitém poklesu počtu nefronů podmíněném základním onemocněním dochází k progresi CKD nezávisle na primárním patologickém procesu
- faktory určující rychlosť progrese
  - neovlivnitelné rizikové faktory
    - základní onemocnění
    - věk, pohlaví, rasa, genetická výbava jednotlivce
  - ovlivnitelné rizikové faktory
    - proteinurie
    - art. hypertenze
    - glykémie
    - hyperlipidémie
    - obesita
    - hyperurikémie
    - kouření



# Mean decline in GFR depends on proteinuria

- mean decline in GFR (mL/min) over a 36-month period in groups with four different mean baseline 24-hour urine protein levels in non-diabetic patients with chronic renal failure in the MDRD study
  - compared in each of these four groups are the
    - normal blood pressure group (dashed line; 140/90 mm Hg; 102-107 mm Hg MAP)
    - intensive control group (solid line; 125/75 mm Hg; 92 mm Hg MAP)




Progressive renal and cardiovascular disease: Optimal treatment strategies  
Matthew R Weir

30

# Časová dynamika změn při CKD a jejich závislost na GFR

- pokles GFR o cca  $\frac{1}{4}$  nevede ke změně vnitřního prostředí (**renální funkční rezerva**)
  - funkční adaptace tubulů na snížení GFR
- ve stadiu poklesu  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{2}$  fyziologické GFR (**renální insuficience**)
  - postupný mírný vzrůst plazmatické koncentrace odpadních látek
    - kreatinin, močovina
      - urea méně příkře (tub. reabsorpce a osmotická diureza)
    - kyselina močová
    - uremické toxiny ?
  - postupné selhání adaptace tubulů na snížení GFR
- ve stadiu  $<\frac{1}{3}$  iniciální GFR se jedná o **selhání ledvin** s těžkou změnou vnitřního prostředí (= **uremie**)
  - změny jako u ASL
    - azotemie
    - hypokalemie
    - hypervolemie
  - a navíc
    - anemie
    - kostní nemoc
    - hypertenze
    - polyneuropatie




32

# Funkční adaptace reziduálních

**umožňuje zachování vnitřního prostředí při značném snížení GFR**

- dochází ke **změnám intenzity tubulárních transportních procesů**, které umožňují zejména udržení vyrovnaného sodíkového, draslíkového a vodního metabolismu (snížení tubulární resorpce, resp. ve zvýšení tubulární sekrece řady látek)
  - intenzitu tubulárních transportních procesů lze klinicky zjišťovat měřením **frakčních exkrecí (FE)** sledované látky (jaká část z profiltrovaného množství látky x je vyloučena do definitivní moči)
- změna tubulární reabsorpce sodíku a vody
  - normálně reabsorpce Na až 99%, FE<sub>Na</sub> ~1%
  - při ↓ GFR se musí ↓ reabsorpce z filtrovaného objemu
    - FE<sub>Na</sub> může být i 30%
    - nicméně pro normál i exkreci Na by stačila GFR 4ml/min
  - mechanismus ??? (ANF, prostaglandiny)
- snížení tubulární reabsorpce fosfátu
  - normálně renální exkrece fosfátů cca 10-20% filtrovaného množství
  - při poklesu GFR stoupá exkrece fosfátů na 40% - 100%
    - nastačí-li → hyperfosfatémie
- zvýšená sekrece draslíku
  - FE<sub>K</sub> může být i 200%, mechanismus udržující homeostázu K+ až do nízkých hodnot GFR
    - hyperkalémie až při extrémním snížení ledvinových funkcí
- 33 — svou roli hraje i zvýšení sekrece mimoledvinnými cestami (GIT)

# Anemie u CKD



- The cause of anemia in patients with CKD is multifactorial. The most well-known cause is inadequate erythropoietin (EPO) production
  - EPO is produced in the peritubular capillary endothelial cells in the kidney relying on a feedback mechanism measuring total oxygen carrying capacity
    - subsequent production of hypoxia inducible factor (HIF)
  - EPO then binds to receptors on erythroid progenitor cells in the bone marrow (BFU-E and CFU-E). With EPO present, these erythroid progenitors differentiate into reticulocytes and red blood cells (RBCs)
  - The absence of EPO leads to pre-programmed apoptosis mediated by the Fas antigen
- There are other factors in chronic kidney disease which contribute to anemia
  - acute and chronic inflammatory conditions have a significant impact on anemia in the CKD population by pro-inflammatory cytokines decreasing EPO production and inducing apoptosis in CFUE.
  - inflammatory cytokines have also been found to induce the production of hepcidin, a recently discovered peptide generated in the liver, which interferes with RBC production by decreasing iron availability for incorporation into erythroblasts.
  - Red blood cells also have a decreased life span in patients with CKD
  - Uremic toxins have been implicated as contributing to apoptosis as the anemia will often improve after initiation of dialysis

# Porucha hormonů a metabolismu u CKD

- poruchy koncentrace hormonů způsobují ovlivnění řady dalších systémů
  - snížená tvorba
    - **1, 25-dihydroxycholecalciferolu**
      - přispívá k rozvoji renální kostní choroby (konkrétně osteomalacie)
    - **erytropoetinu**
      - neléčená anemie je významným rizikovým faktorem pro
        - kardiovaskulární postavení (hypoxie)
        - rychlejší progresi CKD
        - snížení kvality života
    - prostaglandinů
  - zvýšená tvorba
    - **angiotensinogenu**
      - přispívá ke kardiovaskulární morbiditě a mortalitě
    - **parathormonu**
      - přispívá k rozvoji renální kostní choroby (konkrétně osteodystrofie)
- metabolické abnormality u CKD/CHRI
  - poruchy metabolismu **bílkovin a aminokyselin**
    - malnutrice při proteinurii a nižším přívodu bílkovin potravou
      - nízkobílkovinná dieta ale nutná (uremické toxiny?)
    - snížení tvorby bílkovin ve svalech (rezervoár AK)
    - změny intracelulárních hladin AK ve tkáních i v plazmě
      - ↓ esenciální, ↑ neesenciální
  - poruchy metabolismu sacharidů (**inzulinová rezistence**)
    - hyperglykemie na lačno 30% nemocných
    - porucha glukózové tolerance při oGTT 60% nemocných
    - ↑ hladiny inzulinu v důsledku periferní tkáňové rezistence (postreceptorový defekt)
      - sekrece inzulinu je navíc stimulována zvýšenou sérovou koncentrací kalia (inzulin zvyšuje vstup kalia do buněk)
  - poruchy metabolismu lipidů - **hyperlipoproteinémie**
    - vyskytuje se až u 70% nemocných
    - patogeneze sekundární hyperlipoproteinémie je komplexní
      - porušené odbourávání lipoproteinů, zvýšená tvorba VLDL, LDL a TAG, ↓ HDL - **aterogenní dyslipidemie**

34




## ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ U CKD


# Terminologie

- osteoporóza**
  - převažuje resorbce kosti a zejm. organické
  - nízká kostní denzita a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s následným zvýšením fragility
  - příčiny: stáří, inaktivita, menopauza
    - ↓ pohlavní steroidy (zejm. estrogeny) → ↓ syntéza kolagenu (nemůže probíhat mineralizace)
- osteomalacie**
  - neadekvátní mineralizace osteoidu
  - příčiny: hypovitaminóza D nebo hypofosfatemie
    - nedostatek kalcia nebo fosfátu v těle
      - poměr kalcium : fosfát neumožňující mineralizaci
    - ↓ vitamin D → hypokalcémie → ↑ PTH → ↑ kalcémie ale ↓ fosfatemie
- osteodystrofie**
  - následek hyperparathyreoidismu
    - primární HPT: ↑ PTH → ↑ kalcémie ale ↓ fosfatemie
    - sekundární HPT (renální osteodystrofie): ↑ fosfatemie → ↓ kalcémie → ↑ PTH
  - v pokročilém stavu ji provází **osteitis fibrosa**

37




## Pathophysiology of secondary hyperparathyroidism in CKD



consequence of phosphate retention and reduced renal production of active vitamin D, resulting in hyperphosphatemia and hypocalcemia. With GFR <70 mL/min, renal excretion of phosphate can no longer keep pace with GIT absorption, and phosphorus retention occurs. Hyperphosphatemia inhibits the renal 1α-hydroxylase, so that production of active 1,25 dihydroxy vitamin D<sub>3</sub> by the kidney is reduced. Vitamin D deficiency then leads to hypocalcemia as a consequence of defective gastrointestinal calcium absorption and skeletal resistance to the calcemic effect of PTH. The serum-ionized calcium is the most important factor regulating PTH secretion. The effects of calcium on parathyroid cells are mediated by a membrane-bound calcium-sensing receptor (CaR). Low serum calcium leads to an increase in PTH. In contrast, active vitamin D modulates PTH production in the parathyroid by binding to the cytoplasmic vitamin D receptor (VDR). The vitamin D-VDR complex binds to the PTH promoter and inhibits the transcription of PTH mRNA. Thus, vitamin D deficiency will lead to increased production of PTH message. A chronic decrease in vitamin D levels also leads to parathyroid cell proliferation and gland hyperplasia.

39

# Hyperfosfatemie/hypokalcemie u CKD




- u CKD je abnormální metabolismus kalcia, fosforu, parathormonu a vitaminu D
- snížené vylučování fosforu ledvinami v důsledku poklesu GFR vede k **hyperfosfatemii**
  - a) přímo snižuje hladinu ionizovaného kalcia, **hypokalcemie** stimuluje produkci PTH
    - součin kalcia a fosfátu – hydroxyapatit se neztrácí → extraoseální (zejm. vaskulární) kalcifikace
  - b) CKD přímo i fosfát inhibuje 1α-hydroxylázu v buňkách proximálního tubulu ledvin a snižuje tak tvorbu kalcitriolu
  - nedostatečné vstřebávání Ca z GIT vede k prohloubení hypokalcémie, která dále zvyšuje sekreci PTH
  - na receptory VDR v příštích tělisech se váže méně kalcitriolu, což vede k oslabení inhibice transkripce genu pro PTH a k přímému zvýšení sekrece PTH
  - c) blokuje inhibiční vliv kalcitriolu na buňky příštích tělisek
  - d) má přímý stimulační vliv na buňky příštích tělisek
- rozvíjí se **sekundární hyperparathyreóza**

38

## Renální osteopatie


- = minerální a kostní nemoc u CKD (angl. mineral bone disease, CKD-MBD)
- závažná doprovodná komplikace selhávání ledvin
- hl. poruchy
  - abnormální minerál metabolismus
  - zvýšená fragilita kostí a porušená remodelace
    - frakturny, bolest, omezená pohyblivost
  - kalcifikace v cévách, chlopnících a měkkých tkáních
    - vznik arteriálních kalcifikací je aktivní proces podobný formování kosti, na kterém se podílí řada faktorů
      - osteopontin, osteoprotegerin, RANKL, RANK, FGF23 a fetuin A
- MBD obsahuje v nějaké míře všechny kostní abnormality, tj.
  - osteodystrofie (až osteitis fibrosa cystica)
  - osteomalacie
  - osteoporóza



40



# Kardiovaskulární dopady CKD a MBD

- kauzální abnormality
  - arteriální hypertenze (90% nemocných)
  - hyperlipidemie, diabetes
  - sekundární anemie (anemická hypoxie)
  - hyperhydratace (objemové přetížení)
  - kalcifikace cév (arterií) a chlopní
  - uremické toxiny
  - další
    - oxidační stres, hypofibrinolýza (= trombofilie), homocystein



- projevy
  - hypertrofie LK
  - ICHS
    - oproti non-CKD ICHS zde větší tloušťka medie, menší lumen a více kalcifikací, rovněž při uremické neuropati možnost „němé ischemie“
  - arytmie
    - důsledkem změn hydratace a koncentrace iontů, event. proběhlých perikarditid a ICHS (zejména ischemie myokardu při hypotenzi během dialýzy)
- důsledky
  - kardiorenální resp. renokardiální syndrom
    - pre-existentní srdeční onemocnění zhoršuje průběh CKD a naopak existence CKD má podstatný efekt na kardiovaskulární systém


41



## CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

43


# Pathogenesis of vascular calcification



42

## Chron. selhání ledvin = CKD stadium 5 = ESRD

- konečným stavem je **svraštělá ledvin**
- v tomto konečném stadiu s symptomatologií **uremie**
- nutná
  - velmi intenzivní konzervativní léčba
    - ted' již jen symptomatická
      - ↓ příjmu tekutin
      - ↓ příjem Na+, K+
      - ↓ příjem bílkovin
      - léčba komplikací
        - anemie, kostních, hypertenze, infekcí...
      - úprava dávkování léků!!!
  - náhrada funkce ledvin
    - dialýza
    - transplantace
  - etiologie nejčastějších příčin CKD progredujících do ESRD



44

# Symptomy urémie


- vnitřní prostředí
  - hyperkalemie, hyponatremie, hyperfosfatemie, hypokalcemie, hypermagnezemie, metabolická acidóza, hyperlipidemie, hyperurikemie, azotemie
- krevní oběh
  - hypervolemie, edémy, hypertenze, perikarditika, uremická kardiomyopatie, arytmie, ateroskleróza (ICHS)
- respirační systém
  - plicní edém, pleuritida

přičina úmrtí u většiny pacientů s CHSL
- nervový systém
  - únavu, insomniu, leatrgie, neuropatie, zmatenosť, křeče, mozk. edém, syndrom neklidných nohou, erektilní dysfunkce, koma
- gastrointestinální trakt
  - anorexie, nauzea, zvracení, gastritida, peptické vředy, krvácení do GIT, malnutrice
- krev
  - anémie, hemolýza, abnormality koagulace, imunodeficit
- kosti
  - renální osteopatie, pseudodroma, bolesti, nepohyblivost
- ostatní
  - náchylnost k infekcím, parotitis, svědění kůže, amenorea, ....

45

# Efekt hyper-/hypokalemie na srdce

- efekt závisí na absolutní velikosti odchylky (= o kolik) a rychlosti s jakou ke změně došlo (= a jak rychle)!!!!
  - tedy velký rozdíl mezi rizikem u akutního a chronického selhání ledvin
- hyperkalemie
  - zvyšuje excitabilitu posunem klid. membránového potenciálu k prahovému
    - pasivní tok K+ z buňky podél koncentračního gradientu limitovaný intracelulárními anionty, při vzestupu K+ v ECF retence v ICF a depolarizace
  - zpočátku rovněž zrychluje repolarizaci (fáze 3)
    - aktivitační substrátový efekt na Na+/K+ ATP-ázu (vysoká dostupnost K+ pro výměnu)
  - později brání (opožďuje) vysoká [K+] repolarizaci
    - malý koncentrační gradient
  - nakonec při ↑↑K+ zástava srdce
    - inhibiční efekt na Na+/K+ ATP-ázu (nemůže pumpovat proti extrémně vysoké koncentraci K+ v ICT)
    - příliš velké přiblížení k prahovému potenciálu (nebo až překročení) znemožňuje otevření Na+ kanálů




47

# Hyper- a hypokalemie



- 98% K+ v ICF
  - 35-50x více než v ECF (3.8 – 5.5 mmol/l)
  - Na+/K+ ATP-áza
- výšší permeabilita membrány pro K+ než pro ostatní kationty
  - přispěvek ke klidovému membránovému potenciálu
    - pasivní tok K+ z buňky podél koncentračního gradientu limitovaný intracelulárními anionty
  - změny kalemie v ECF jsou časem reflektovány v ICF
- poruchy bilance K+ v organizmu:
  - nadměrný příjem při funkčních ledvinách není problém
  - snižené vylučování při insuficienci ledvin
- poruchy distribuce - celá řada faktorů ovlivňuje distribuci draslíku mezi ECT a ICT prostorem:
  - zánik buněk / hemolýza
  - osmolarita
  - acidóza
- Regulace [K+] v ECF
  - (1) změny distribuce K+ (přesuny z ECF do ICF)
    - pH, inzulin, adrenalin
  - (2) exkrece ledvinami
    - aldosteron, [K+]

46




# Hyperkalémie (K+ >5.5 mmol/l)

- postiženy zejména svalové bb. (všechny)
  - příčné pruhované
  - hladké
  - myokard
- projevy
  - arytmie (EKG):
    - do 7 mmol/l
      - hrmotné T vlny
      - rozšíření QRS
      - prodloužení PR intervalu
      - oploštění P vln
    - nad 7 mmol/l
      - snižování voltáže
      - bradykardie
    - nad 8 mmol/l
      - „sinusoidální kmit“
      - idioventrikulární rytmus
      - zástava
  - parestezie, hyporeflexie, obrny a zácpa



48


## Metody náhrady funkce ledvin



### NÁHRADA FUNKCE LEDVIN - METODY


49

- mimotělní metody
  - hemodialýza
  - hemofiltrace
  - hemodiafiltrace
    - kombinace obou
- peritoneální dialýza
- transplantace





50

## Cévní přístupy



- první „umělou ledvinu“ použil Kolff v roce 1943 v Holandsku, u nás 1955
- hlavní fyzikální principy
  - difúze a ultrafiltrace přes semipermeabilní membránu
    - podél koncentračního resp. tlakového gradientu
  - protisměrný tok dialyzační tekutiny a krve v mimotělním okruhu
- standard regimen
  - three times a week, 3–4 hours per treatment schedule
- dialyzační roztok
  - urea, kreatinin, draslík a fosfát difundují do dial. roztoku (vysoká konc. v krvi, nízká v roztoku)
  - koncentrace sodíku a chloridů jsou stejné, aby se zabránilo ztrátám
    - přebytek vody jako takové odstraněn ultrafiltrace
  - bikarbonát je v dial. roztoku ve vyšší koncentraci než v krvi, aby se korigovala acidóza
  - glukóza se přidává podle aktuální glykemie pro prevenci hypoglykémie




- dočasný - pro omezený počet výkonů
  - dvojcestný katetr (v. subclavia, v. jugularis, v. femoralis)
  - rizika: krvácení, trombóza, stenóza, infekce
- trvalý - u nemocných v pravidelném dialyzačním programu
  - arteriovenózní podkožní píštěl (fistule)
    - mezi a. radialis a v. cephalica
  - syntetický štěp
    - umělé cévní protéza
    - dříve žilní štěpy

51


52

## Vedlejší efekty a komplikace HD

- **hypotenze**
  - nejčastější, až u 30% dialýz
- **křeče**
  - druhá nejčastější komplikace - častěji v DK
  - v důsledku deplece tekutin následkem nepřiměřené ultrafiltrace nebo iontové dysbalanční při nevhodném dialyz. roztoku
- **iontové poruchy**
  - vzácnější, při technické poruše přístroje (nevhodném dialyzačním roztoku)
- **disekvilibrační syndrom**
  - u akutních pacientů s vysokou predialyzační koncentrací urey a při nepřiměřeně rychlé HD
    - rychlý pokles urey v krvi provázen pomalým poklesem v likvoru
    - zvýšená osmolalita likvoru způsobí nitrolební hypertenci a edém mozku
  - svůj efekt má i metabolická acidóza
    - during HD plasma bicarbonate ( $\text{HCO}_3^-$ ) level rapidly increases, but bicarbonate cannot readily pass across the BBB, whereas carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) diffuses rapidly. The initial increased passage of carbon dioxide into the CSF and brain leads to a reduction in pH (Henderson-Hasselbach equation), and intracellular acidosis results in the breakdown of intracellular proteins to create idiosyncratic osmolytes that create an osmotic gradient for water movement into the brain.
  - ukončení dialýzy a antiedematózní terapie
- **infekce** (zejm. endokarditida a osteomyelitida)
- 53dlouhodobě (neuropatie, amyloidóza)




## Princip náhrady funkce ledvin (HD vs. PD)




54

## Hemofiltrace (HF)

- při hemofiltraci se přechod látek přes membránu děje výhradně **filtrací** (tedy konvekce, ne difuze) přes vysoce propustnou membránu – **hemofiltr**
  - do přístroje přiváděna jen krev, nepoužívá se dialyzační roztok
  - membrány o velké propustnosti odstraňují látky s většími molekulami, odstraňování látek tvořené malými molekulami je nižší než při hemodialýze
- aby očištěvání krve bylo dost účinné, musí být množství filtrované tekutiny dostatečně velké (asi 30-100 litrů při jedné proceduře nebo kontinuálně)
  - typicky použití u ASL
- objem odfiltrované tekutiny se nemocnému nahradí speciálním sterilním roztokem




## HD vs. HF




56

# Transplantace ledvin



- nutnost „získání“ náhradní ledviny
  - kadaverózní
  - od žijícího dárce
- imunologická kompatibilita
  - riziko rejekce
    - hyperakutní
    - akutní
    - chronická
  - rizika spojená s imunosupresivní terapií

57



58