

Poruchy výživy I

Hladovění/hyponutrice


Kachexie

Anorexie a bulimie



1

Potřeba energie




- je kvantitativně určená násl. parametry
 - klidový energetický výdej (angl. resting energy expenditure, REE), neboli "bazální metabolismus" (BEV):
 - 70-80%
 - fyzická aktivita (volní i mimovolní):
 - 25-35%
 - fiziologická regenerace tkání
 - termický efekt potravy
 - další
 - hojení, rekonvalescence
 - růst
 - těhotenství a laktace

Slovníček pojmu



- malnutrice** = jakákoli porucha výživy
- hladovění** (fasting, stravation)
 - vědomé nebo nucené dočasné potlačení až zcela zastavení přívodu potravy u jinak zdravého člověka resp. bez závažného celk. onemocnění
 - vypovídá hormonální a metabolickou odesvu, na kterou je člověk po určitou dobu adaptován
- podvýživa** (hyponutrice)
 - důsledek střednědobého nebo dlouhodobého deficitního přívodu makro- a mikronutrientů
 - při závažném stupni s výraznými orgánovými změnami (často irreverzibilní)
 - v extrémním případě vede k inanici/emaciaci
 - BMI < 18 (tuk < 10% u mužů, < 15% u žen)
- anorexie**
 - nechut k jídlu, ztráta apetitu
 - krátkodobě běžná u ak. inf. onemocnění
 - dlouhodobě patologická
- kachexie**
 - ztráta hmotnosti (tuk i svaly) u člověka, který se aktivně nesnaží redukovat hmotnost
 - vede k inanici/emaciaci
- sarkopenie**
 - úbytek svalové hmoty (ve stáří, při katabolismu)
- karence** (deficit)
 - selektivní nedostatek určité živiny či látky v potravě

2



Hladovění - katabolismus


- energetická rezerva (tuk) u štíhlého člověka (tj. tuk < 20%) na cca 2-3 měsíce
- biochemická charakteristika prostého hladovění
 - glukagon (+ pokles sekrece inzulínu)
 - vyčerpání zásob jaterního glykogenu za 12-24 hod
 - vzestup koncentrace adrenalingu, glukagonu, glukokortikoidů - zvýšená glukoneogeneze
 - zvýšená lipolýza se zvýšenou ketogenezí (metabolická acidóza)
 - bílkoviny se relativně šetří, pokud je normální fyzická aktivita




4

Hladovění krátkodobé vs. dlouhodobé

Metabolism of 24 h Starvation




Metabolism of Prolonged Starvation



5

Podvýživa (hyponutrice)

- snížení tělesné váhy (zás. tuk i aktivní hmota)
- má obvykle 2 složky
 - protein energetická malnutrice (PEM)
 - deficit mikronutrientů (zejm. vitamín A, železo, iod aj.)
- často se rozlišují 2 extrémní formy
 - marasmus
 - kwashiorkor
- celosvětově cca 850 mil. osob
 - zejm. Jižní Asie a subsaharská Afrika
- porucha normálního růstu u dětí
 - podváha (underweight) = <2 SD pro daný věk
 - zaostávání růstu (stunting) = <2 SD pro daný věk
 - často důsledek chron. malnutrice
 - nízká váha pro danou výšku (wasting)
 - často důsledek akutní malnutrice
- pokles váhy u dospělých
 - ztráta váhy o 40% vede ke smrti
- negativní změny v činnosti orgánů
 - zejm. tuková degenerace srdce a jater
 - srd. selhání
 - sklon k dehydrataci, hypoglykemii, hypotermii
 - letargie
 - atrofie sliznic = sekundární malabsorpce
- mechanizmus
 - závažná kombinovaná porucha sacharidového a lipidového metabolismu
 - deficit sacharidů neumožňuje ani normálně metabolizovat tuky



7

Hodnocení nutričního stavu


- detailně viz klinické obory
- klidový energetický výdej (po standardizaci na věk, pohlaví, složení těla, podmínky ~BEV, ~REE)
 - měření min. 2 hod. po posledním jídle po 30 min klidu na lůžku
 - přímá kalorimetrie (množství tepla vznikající v klidu)
 - nepřímá kalorimetrie (respirační kvocient RQ)
 - produkovaný CO₂/spotřebovaný O₂ za jednotku času
- anamnéza, fyzikální a biochemická vyšetření, antropometrie

6



Důvody podvýživy

- zevní faktory
 - socio-, politicko-, ekonomicko-, klimaticko-, geografické
 - vzdělání
 - standard zdravotní péče
- stáří
 - důležitá geriatrické problematika
- komorbidita
 - malabsorpce
 - nemoci GIT, jaterní selhání a žluč. cesty, pankreatitidy
 - urémie
 - nádorová onemocnění
- volní
 - porucha příjmu potravy (psychiatrie)



8

Marasmus a kwashiorkor


- marasmus**
 - závažný "wasting" v důsledku PEM s relativně vyváženým nedostatkem základních živin
 - symptomy
 - vzhled typu "kost a kůže", trojúhelníkovitý obličej
 - amenorrhea u dívek
 - extendované břicho (svalová hypotonie)
 - anální či rektální prolaps (ztráta perianálního tuku)
- kwashiorkor**
 - závažný "wasting" a otoky v důsledku PEM a přidružených infekcí anebo s extrémně závažným nedostatkem bílkovin v potravě
 - z Ga jazyka (Ghana): "choroba, kterou dostane dítě po odstavení kvůli narození jiného dítěte nebo tehotenství matky"
 - symptomy
 - viz výše
 - otoky (+ hypoalbuminemie)
 - hepatomegalie a steatoza jater
 - porucha kůže a vlasů (hypopigmentace)
 - anemie
 - imunosuprese
- ve srovnávacích studiích se typicky neprokazuje signifikantně nižší hladina proteinů u dětí s kwashiorkorem, rozdíl je zřejmě dán
 - současným postižením infekcemi (zejm. průjmy, paraziti (malárie) a HIV)
 - aflatoxiny??

9



Kachexie

- ztráta hmotnosti (tuková i svalová tkáň) a chuti k jídlu u člověka, který se aktivně nesnaží redukovat hmotnost
 - ztráta cca 5% premorbidní váhy během 6 měsíců
- patogeneze
- etiology
 - nádory (cancer cachexia)
 - těžká nenádorová onemocnění
 - např. sepse, uremie, HIV infekce
- prognóza a mortalita
 - horší odpověď na léčbu a její tolerance
 - imunodeficit
 - na kachexii umírá cca 20% nemocných s nádory



11

Stresové hladovění


- = kwashiorkor-like syndrom
- hladovění za stresu u dosud zdravých, dobře živených lidí
 - stres: jakékoli větší poškození organizmu, které vyvolá zánětovou odpověď
 - úraz, operace, popáleniny, multiorgánové selhání
- způsoben uniformní neuroendokrinní stresovou reakcí mozku nezávislou na vyvolávajícím faktoru a tíži odpovídající závažnosti postižení
 - aktivace aferentního nervového systému (sympatikus)
 - aktivace osy hypothalamus –hypofýza – nadledvina
 - aktivace katabolických (ADH, aldosteron, katecholaminy, glukokortikoidy, glukagon, ..) anabolických (STH, inzulin) hormonů
 - zánětové cytokiny (IL1, TNFs, IL6)
- smyslem je rychle aktivovat energetické zdroje a aminokyseliny nutné k přežití a imunitní reakci
 - syntéza protilátek, cytokinů, proteinů ak. fáze, hojení
- důsledky - projevy stresového metabolismu
 - hypermetabolismus (\uparrow REE)
 - negativní dusíková bilance
 - inzulinorezistence, hypeinzulinemie
 - pokles bílkovin (\downarrow albumin) a retence tekutiny \rightarrow otoky

10


Nádorová kachexie

- průběh a patofiziologie
 - závažnost nekoreluje s velikostí a tvarem tumoru (i když nezávažnější bývá u nádorů GIT, plic a prostaty)
 - 1) anorexie
 - dysregulace center regulace přímého potravu v n. arcuatus (POMC/CART >>> NPY)
 - cytokiny (TNF α , IL-1 β , IL-6) zvyšují serotoninergní aktivaci POMC/CART u nádoru a infekci
 - aktivace tryptofanem (serotonin) u uremie
 - 2) aktivace imunitního systému
 - spotřeba energie + cytokiny
 - 3) zvýšený klidový metabolismus (resting energy expenditure)
 - up-regulace uncoupling proteinů (UCP-3 ve svalu cca 5x vyšší než u zdravých)
 - konsimuce ATP v Coriho cyklu (většina solidních tumorů kryjí své energ. požadavku anaerobní glykolyzou, produkce laktátu vyžaduje konverzi v játrech za spotřebu ATP)
 - 4) "wasting" tkání – tuková tkáň (zejm. viscerální) a sval
 - snižená proteosyntéza a zvýšená proteolýza
 - zvýšená lipolýza (\uparrow exprese HSL \rightarrow \uparrow plasma glycerol a rovněž pokles exprese LPL)
 - porucha transkripcních faktorů adipocytů (PPAR γ , SREBP1c)
 - porucha transportu glukózy

12




Signalizace v n. ARC



13


Nádorová kachexie - detail

- Protein levels in muscle are determined by the amount of dietary intake of protein and levels of protein synthesis. Decreases in plasma insulin concentrations or insulin sensitivity of skeletal muscle can activate three main proteolytic pathways that underlie protein catabolism in skeletal muscle.
- These are the lysosomal system, which proteolyses extracellular proteins and cell-surface receptors; the cytosolic calcium-activated system, which involves calpains I and II and is involved in tissue injury, necrosis and autolysis; and the ATP-ubiquitin-dependent proteolytic pathway.
- This proteolysis leads to hepatic production of acute-phase protein (APP), which can limit the availability of certain amino acids for protein synthesis in skeletal muscle. Protein deamination also leads to nitrogen excretion, producing a negative nitrogen balance, and glucose production, which increases muscle activity.



15

Nádorová kachexie - detail



- tumours produce factors such as lipid-mobilizing factor (LMF), which induces breakdown of adipose tissue into fatty acids, and proteolysis-inducing factor (PIF), which induces protein degradation (amino acids) in skeletal muscle. Tumour necrosis factor (TNF)- also contributes to these processes.
- These are important gluconeogenic substrates that can be used in acute-phase protein (APP) synthesis by the liver. Tumours convert glucose to lactate, which is transferred to the liver, where it is converted back into glucose. This cycle uses a large amount of energy, and might contribute to cachexia.

14

Nádorová kachexie

- dodatečně v průběhu onemocnění k poklesu váhy přispívá
 - efekt léčby
 - centrálně emetický efekt chemoterapie a radioterapie
 - interference nádoru s příjemem potravy (malabsorpce)
 - infiltrace sliznic GIT
 - komprese vývodu trávících žláz
 - metastázy v játrech
 - stenóza kardie
 - reseckní výkony na GIT (např. kolektomie s násled. stoma)
 - předčasné dosažení sytosti při gastroparéze
 - změna chutových preferencí
- terapie (↓ cytokinů) - profagika/anti-anorektika
 - progestageny (megestrol, medroxy-progesterone acetát)
 - kanabinoidy (dronabinol)
 - steroidy (dexamethason)
 - anaboliské steroidy (fluoxymestron)



16

Exp. zvířecí modely nádorové kachexie

- ukazují na zásadní roli cytokinů produkovaných tumorem
 - TNF α (= kachektin)
 - exp. infuze TNF α akutně navozuje lipolýzu
 - IL-1 β
 - redukce ghrelinu, proteolýza → Trp → 5-HT, ↓ mRNA NPY
 - IL-6
 - ZAG (zinc- α 2-glycoprotein)
 - protein MHC I. třídy
 - nadprodukce v nádorových bb.
 - exp. vede k redukci tuk. tkání bez efektu na sval (ob/ob myší *in vitro* adipocyty)
 - zřejmě aktivací β 3-adrenergického receptoru a cAMP a exprese UCP
 - PIF (proteolysis-inducing factor)
- tryptofan (přestup přes BBB pomocí transportéru) je prekurzorem pro syntézu 5-HT
 - retence při uremii
 - potencionálně terapeuticky snaha o blokádu dostupnosti Trp

17



Anorexia nervosa

- = mentální anorexie
- popsána W. Gullém a E. CH. Laseguem v r. 1870
- chronické onemocnění charakterizované
 - odmítáním udržet váhu alespoň 85% očekávané hodnoty při dané výšce
 - intenzivním strachem z růstu hmotnosti i přes zjevnou podvýživu
 - porušenou percepci vlastního těla (dysmorphie)
 - amenorrhoea alepoň po 3 po sobě jsoucí cykly
 - cílevědomým snižováním vlastní tělesné hmotnosti
 - omezováním příjmu potravin (restriktivní typ)
 - využíváním excesivního fyzického výdeje energie nebo laxativ (odčistovací typ)
- prevalence
 - cca 3% populace v rozvinutých zemích (poměr mužů a žen 1:20)
 - typicky střední a vyšší ekonom. třídy
 - max. bělošská populace
- etiologie
 - genetika (neurotransmitery, leptin, orexiny, ...?)
 - psychické faktory
 - faktory sociální – móda, povolání, reklama, reakce okolí, ...

19



Poruchy příjmu potravy

- poruchy typického charakteru příjmu potravy ve vazbě na cyklickou stimulaci pocitů appetitu a sytosti nebo snahu o nadměrnou kontrolu hmotnosti, které vedou k závažným poruchám fyzického a psychického zdraví a sociální integrace
- často ve spojení s jinými psychiatrickými onemocněními
 - obsesivně-kompulzivní poruchy
 - deprese
 - anxiózní porucha
- klasifikace ("food intake disorders")
 - anorexia nervosa (AN)
 - bulimia nervosa (BN)
 - záchvatovité přejídání (binge-eating disorder, BED)
 - další nespecifikované poruchy
- etiology
 - genetika
 - psychologické faktory
 - sociální faktory
- patofisiologie (není jasná)
 - zdá se, že hladovění nebo naopak přejídáním se aktivují "rewarding" dráhy mozku jako snaha o kompenzaci úzkosti a deprese
 - jiné hypotézy (evoluční) viz dále AN
- typický nástup v pubertě, adolescenci a 18 časně dospělosti, častěji u žen



© OriginalArtist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

Anorexia nervosa

- patofisiologie – biologické faktory
 - systémy neurotransmitterů [dopaminergní (DO), serotoninergní (5-HT), noradrenergní (NA)]
 - poruchu udržuje "reward" rekce na hladovění CRF (hypotalamus) → DO (limbický systém) a NA (locus coeruleus)
 - zpočátku omezování potravy, menší porce, často přechod k vegetariánství
 - rozvoj rituálů spojených s jídlem, sebetrestání
 - mystifikace okolí (výmluvy, volné oděvy, závaží při kontrole hmotnosti, vyhýbání se soc. událostem spojených s jídlem)
 - nadměrná aktivita (pohyb, "fidgeting", výkonostní sport)
- důsledky
 - sekundární malnutrice
 - útlum funkce pohlavních orgánů (amenorrhoea)
 - mírná hypothyreóza, anemie, leukopenie, trombocytopenie
 - zpomalované vyprazdňování žaludku, dilatace tenkého střeva, zácpa



20

AN – psychiatrické a evoluční aspekty

- ze všech psychiatrických nemocí má nejvyšší mortalitu
- spojena s nekompletním rozvojem osobní identity, perfekcionismem, dysmorfií, obsedantními rysy, depresivitou
- paradox u AM
 - snaha o redukci hmotnosti je dnes naprosto běžná a rozšířená, ale jen u velmi málo lidí se rozvine AN
 - jak je možno snést do tak dlouhou dobu větší naléhavý pocit hladu (ten je u pacientů prokazatelně pocítován) – motivace???
 - (→ hladovění jako projev/demonstrace rigidity, obsese, motivace)
 - většina nemocných nemá suicidální tendence, přesto pokračují v redukci hmotnosti i přes zjevné příznaky závažného poškození zdraví a známé riziko úmrtí
- evolučně nejasná
 - porucha zákl. instinktu – jist, přežít a reprodukovat se
 - hypotéza A "dietní restrikce jako snaha vyhnout se vyloučení"
 - člověk jako společenský tvor má potřebu patřit ke skupině (**protekce** skupinou byla předpokladem přežití), v rámci ní pak zaujmout hierarchický odpovídající místo (k tomuto účelu se u člověka vyvinulo velmi komplexní chování – např. vyjednávání, mystifikace, intriky, ...)
 - potřeba socializace kromě protekce na druhou stranu vede ke **kompetici**, která je individuálně rozdílně vnímána ("fight-or-flight")
 - jedním ze způsobů řešení je vyslat jasný signál o porážce ("flight", tedy že konkrétní osoba není hrozba pro druhé)
 - teorie sociální kompetice jako důvodu deprese
 - fyzický zjev, zdraví a reprodukční fitness jsou velmi sledované parametry, takže jejich potlačení je signálem nekompetice ("nechte mě byt, já vás v nicem neohrozují")
 - hladovění byvalo běžné, u zvířat vč. člověka se vyvinuly výhodné adaptivní odpovědi
 - hibernace
 - pokles aktivity ("počkat na lepší časy")
 - **zvýšená aktivita** ("odejít jinam") – může být pro část lidí natolik uspokojující, že vede k upevnění poruchy (viz exp. model AN), schopnost tolerovat hlad a "vest lip" zvyšuje self-esteem a dokumentuje schopnost sebekontroly



21 • hypotéza B – potlačení sexuální přitažlivosti

Mentální bulimie

- charakterizována
 - episodami záхватovitého přejídání ("binge eating") v periodách kratších než 2 hod. ve velkých porcích minimálně 2x za týden po dobu 3 měsíců
 - ztrátou kontroly nad jídlem během episod
 - snahou kompenzatorně snížit následný vzestup těl. hmotnosti diuretiky, zvracením nebo zvýšenou tělesnou aktivitou
 - bez výrazné podvýživy, naprostě normální či zvýšená těl. hmotnost
- prevalence
 - cca 4% populace v rozvinutých zemích (pomér muži 1:10 ženy)
- důsledky
 - zvracení – metabolická alkalóza s hypokalemii (důležité diagnosticky!)
 - užívání projímadel a diuretik – hypochloremie s následnou srdeční arytmii a nefropatií
 - poškození tvrdých tkání zubů
 - eroze skloviny kyselinou, gingivita



23

Zvířecí model – activity-based anorexia

- dospělé normálně živené krysy jsou vystaveny hladovění (přístup k jídlu pouze 1 hod denně)
- současně je umožněna fyzická aktivita (běhací kolo)
 - domnělý způsob získání potravy??
- kontrolní skupina jsou hladovějící krysy bez fyzické aktivity
- kontrolní skupina se naučí během hodiny snít maximum a pokles váhy není tak značný
- "běhající" skupina progresivně snižuje svou váhu a dokonce odmítá přerušit aktivitu po krátkou dobu dostupnosti jídla
- zvířata zmírají na kachexii



22



24