

# HLA systém, jeho struktura a funkce

*HLA (Human Leukocyte Antigens ) =  
Hlavní histokompatibilní systém  
člověka*

## Historie

- 1930 – 1940- MHC geny nejdříve rozpoznány u myší na základě pokusů s transplantacemi tumorů u myší
- 50. léta- charakterizováno několik geneticky podmíněných antigenů zodpovědných za rejekci alogenních tumorů i normální alogenní tkáně
- 60. – 70. léta - již známy 3 lokusy HLA-A, -B, -C, MHC geny se účastní v imunitní odpovědi
- 1972- k produkci protilátek B lymfocyty nutná T- buněčná aktivita a také účast HLA molekul
- 1974- fenomén HLA restrikce ( T lymfocyty rozpoznávají cizorodý antigen pouze v komplexu s HLA molekulami I. nebo II. třídy
- 80. léta- objev antigenů lokusů HLA-DR, -DQ, -DP
  - došlo k poznání hlavní funkce MHC molekul v imunitní odpovědi
- 90. léta- objev tzv. neklasických antigenů lokusů HLA-E, -F, -G, -H, -J, -K, -X

## Struktura HLA systému

- Nejkomplexnější a nejpolymorfnější systém, každý člověk nese unikátní sestavu HLA alel, výjimka – monozygotní dvojčata
- lokalizace na krátkém raménku 6. chromozomu (4100 kb, více než 200 genů), geny uspořádány do 3 oblastí: **HLA I., II., III. třída**

### HLA I. třída zahrnuje geny:


- **-A, -B, -C** pro těžký řetězec a **molekul HLA-A, -B, -C**, jejich produkty glykoproteiny jsou exprimovány na povrchu všech jaderných buněk (transplantační, klasické)
- neklasické geny **HLA-E, -F, -G** (glykoproteiny - omezený výskyt)
- geny **MICA, MICB** (MHC Class I Chain-related) - strukturou podobné HLA molekulám I. třídy, výskyt - endoteliální bb., ne na lymfocytech
- pseudogeny a geny s neznámou funkcí

## HLA II. třída zahrnuje geny:

- -DRA, - DRB, - DQA, DQB, -DPA, -DPB pro – $\alpha$  a – $\beta$  řetězec HLA molekul – DR, -DQ, -DP, jejich produkty glykoproteiny jsou exprimovány na povrchu tzv. antigen prezentujících buněk
- geny -DM, -DO, nejsou exprimovány na buněčné membráně (endozomy, odstranění li a naložení cizorodého peptidu na HLA molekulu II. třídy)
- geny LMP2, LMP7 (Large Multifunction Protease), kódují proteiny, které štěpí cizorodé částice na menší peptidy
- geny TAP1, TAP2 (Transporters Associated with antigen Processing) zahrnutý do procesu transportu peptidů do ER a naložení peptidů na syntetizující se HLA molekulu I. třídy

## HLA III. třída zahrnuje:


- geny kódující strukturálně a funkčně odlišné proteiny než HLA I. a II. tř.
- složky komplementu C4, C2, faktor B, 21-hydroxylasa, TNF, heat shock protein Hsp 70




Klein J, Sato A. The HLA System. First of  
two parts. N Engl J Med 2000;343:702-9.





The New England  
Journal of Medicine



# GENOVÁ ORGANIZACE HLA SYSTÉMU, POLYMORFIE



# VAZBA ANTIGENNÍCH PEPTIDŮ NA MOLEKULY HLA I




## Funkce HLA systému

- Hlavní fyziologickou funkcí HLA molekul je předkládat cizorodé antigeny nebo jejich fragmenty buňkám imunitního systému, především T lymfocytům
- Tato prezentace antigenu je prvním předpokladem pro rozvoj imunitní reakce a tím obrany proti napadení mikroorganismy - primární role imunitního systému je rozpoznat a eliminovat nebezpečné cizirodě agens, tzn., že imunitní systém musí rozlišovat mezi „vlastními“ a „cizími“ antigeny.
- HLA restrikce - buněčné receptory T lymfocytů (TCR) rozpoznávají komplex sestávající se z cizorodého antigenního peptidu vázaného v peptidovém žlábků HLA molekuly.
- 2 způsoby prezentace cizorodých antigenů T lymfocytům:
  - endogenní (HLA I. tř.)
  - exogenní (HLA II. tř.)


## PŮVOD PEPTIDŮ

Odkud pocházejí cizorodé antigeny rozpoznávané T lymfocyty:

- replikace v cytosolu buňky (viry, některé bakterie)
  - Ciz. proteiny produkované buňkou - **endogenní zdroj**
  - ciz. peptid + HLA I + CD8+ (Tc lymfocyty) - zabití napadených buněk
- 
- proteiny buňkou pohlcené - **exogenní zdroj** (bakterie, paraziti)
  - vesikulární systém buňky (transportní váček)
  - ciz. peptid + HLA II + CD4+ (Th lymfocyty)
  - aktivace zánětlivé a protilátkové odpovědi
  - CD4+ Th1 - zánětlivé - aktivace makrofágů k zabití patogenu
  - CD4+ Th2 - protilátková odpověď, aktivace B buněk k produkci protilátek




# Peptidy prezentované HLA I



1. Syntéza virových proteinů na ribosomech
2. Ubiquitin – označení proteinu
3. Proteasom – rozštěpení
4. TAP1/TAP2 – transport peptidů do endoplasmatického retikula
5. Naložení na molekulu HLA I a transport na povrch buňky

# Zpracování exogenních cizorodých molekul a jejich prezentace HLA II



## EXOGENNÍ ANTIGEN


Vesikuly s kyselým prostředím  
ENDOSOMY  
LYSOSOMY

Proteolytické štěpení  
(katepsiny, endopeptidáza)

## MHC II

ENDOPLASMATICKÉ RETIKULUM  
α a β řetězec MHC II + invariantní řetězec (Ii, CD74)  
(zabraňuje obsazení vazebných míst vlastními peptidy) ⇒ CLIP (CLass II associated Invariant Chain Peptide)  
⇒ HLA-DM ⇒ odstranění Ii a záměna za antigenní fragment

# Rozpoznání antigenu – HLA restrikce



## ochrana fetálního allograftu

- polovina genetické výbavy pochází od otce.
- A, -B, nejsou exprimovány na buňkách trofoblastu → T lymfocyty jsou k plodu ignorantní.
- exprese molekul HLA-G, (-E) na trofoblastu → NK inhibice.
- Neklasické HLA-G, (-E) molekuly - hrají roli při potlačení imunitní odpovědi matky proti plodu

### HLA molekuly jsou ligandy pro receptory NK buněk

HLA molekuly aktivují nebo blokují aktivitu NK buněk přes **aktivační a inhibiční receptory** ( KIR-killer immunoglobuline-like receptor)

NK buňky rozeznávají také neklasické HLA-E a –G molekuly

### úloha HLA molekul v transplantologii

HLA molekuly jsou silné aloantigeny indukující rejekci štěpu


# Trophoblast



A. Normal HLA Tissue  
Distribution




T Cell  
Activation



B. No HLA Class I  
Molecules



NK Cell  
Activation



C. Specialized HLA Class I  
(HLA-E, -G)



No T or NK Cell  
Activation

## Exprese a distribuce HLA molekul

- produkty genů HLA I. tř. - nalezeny na všech jaderných buňkách
- HLA geny exprimovány kodominantně – oba geny (alely) každého HLA lokusu se vyjádří syntézou polypeptidového řetězce HLA produktu)
- na mladých červených krvinkách – atypický antigenní systém Bga, Bgb, Bgc ( reziduální HLA antigeny )
- plazma – solubilní HLA antigeny
- produkty genů HLA II. tř. – omezená distribuce: B lymfocyty, makrofágy, dendritické buňky, Langherhansovy buňky kůže, některé endoteliální buňky
- exprese HLA antigenů I. a II. třídy může být zvýšena během zánětu, ale také může být indukována na určitých buňkách, na kterých se normálně neexprimují (myocyty, hepatocyty ).

typ buňky, tkáně	exprese	
	HLA I	HLA II
<b>BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU</b>		
dendritické buňky	+++	+
makrofágy	+++	++
T lymfocyty	+++	+
B lymfocyty	+++	+++
<b>JINÉ JADERNÉ BUŇKY</b>		
neutrofilní granulocyty	+++	-
eosinofilní granulocyty	+++	-
epitelové buňky	+++	-
hepatocyty	+	-
nervové buňky	+	-
buňky ledvin	+	-
<b>NEJADERNÉ BUŇKY</b>		
trombocyty	++	-
erytrocyty	-	-

Tab.1.: Odlišnosti v expresi molekul HLA I. a II. třídy na různých buněčných typech  
 ( J. Krejsek a O. Kopecký, Klinická imunologie, str. 125, 2004)


# Srovnání vlastností a funkce HLA I a HLA II

Charakteristika	HLA I	HLA II
Struktura	$\alpha$ řetězec + $\beta 2m$	$\alpha$ a $\beta$ řetězce
Domény	$\alpha 1$ , $\alpha 2$ a $\alpha 3$ + $\beta 2m$	$\alpha 1$ , $\alpha 2$ a $\beta 1$ , $\beta 2$
Buněčná exprese	téměř všechny jad.buňky	APC (B buňky, dendritické buňky,makrofágy)
Peptidy vázající místo	uzavřené,váže 8-9 amk tvořené doménami $\alpha 1$ a $\alpha 2$	otevřené, váže 12-17amk tvořené doménami $\alpha 1$ a $\beta 1$
Peptidy	endogenní antigeny	exogenní antigeny
Peptidy prezentované	CD8+T buňkám	CD4+T buňkám



## Dědičnost HLA systému

- geny vázané X geny volně kombinovatelné
- HLA geny jsou vázané → děděny „en bloc“ od rodičů jako haplotyp
- někdy rekombinace ( crossing-over během meiotického dělení) v HLA oblasti → výměna genetického materiálu mezi homologickými chromozómy → vznikají rekombinantní sestavy alel
- frekvence rekombinace je závislá na vzdálenosti mezi geny
- vazebná nerovnováha ( linkage disequilibrium )
  - běžná v HLA systému
  - určité kombinace alel se vyskytují častěji, než by se očekávalo na základě jejich genové frekvence

Např. **HLA-A1 a HLA-B8** s genovými frekvencemi **0,16 a 0,1** v populaci. Očekávaná frekvence výskytu haplotypu **HLA –A1, B8** v populaci by měla být  **$0,16 \times 0,1 \times 100\% = 1,6\%$** . V některých kavkazských populacích frekvence tohoto haplotypu zdaleka přesahuje očekávanou frekvenci (**8%**). Evoluční základ vazebné nerovnováhy je spekulativní, určité kombinace HLA alel asi poskytují v některých populacích určitou selekční výhodu



Obr.4: Dědičnost HLA haplotypů



Obr.5: Vznik nerekombinančních a rekombinančních HLA haplotypů

## HLA a choroby

- 1967 – první zprávy o asociaci HLA systému s onemocněním u člověka
- 1973 – objevena asociace HLA-B27 s ankylozující spondylitidou ( m. Bechtěrev )
- následně byly studovány stovky onemocnění pro možnou asociaci onemocnění s HLA systémem, u více než 50ti onemocnění byla prokázána statisticky významná asociace

### Rysy HLA asociovaných chorob

- choroby asociované s HLA antigeny jsou většinou nemaligní chronická onemocnění
- převážně autoimunitní onemocnění
- většina chorob je multifaktoriálních ( geny+ environmentální složka)
- Spouštěčem onemocnění často environmentálním faktory (např. mikroorganismy, stres, ...)

## Některé příklady asociace HLA alel s chorobou:

Birdshot retinopathy	-A29	RR=200
Ankylosing spondylitis	-B27	81,8
Narcolepsy	-DQB1*06:02	100
Psoriasis vulgaris	-B13, Cw6	4,5      7,2
Celiac disease	- DQB1*02, *03:02 - DQA1*03:01, *05	13,3
Type I diabetes mellitus	- DQB1*02, *03:02 - DQA1*03:01, *05	10
Rheumatoid arthritis	- DR4	4

# ANKYLOSING SPONDYLITIS ( AS, M. BECHTĚREV)

asociována s HLA-B27

- zánětlivá forma artritidy, postižení ve větší míře mladí muži
- zánět napadá kloubní spojení mezi pánví a páteří , nemoc se může postupně šířit nahoru a dolů ke kyčelním a kolenním kloubům.
- různý průběh onemocnění, může končit velmi vážným deformitami
- průběh onemocnění dlouhodobý
- ostatní choroby asociované s HLA-B27 – Reiterova choroba (revmatické onem., často vyvolávají chlamydie, trojice obtíží: neinf.zánět kloubů, moč.trubice a spojivek)
  - Anterior uveitis (přední uveitida-zánět duhovky, řasnatého tělíska)



# CELIAC DISEASE

- DRB1\*03- DQA1\*05:01- DQB1\*02:01  
-DRB1\*07- DQA1\*02:01- DQB1\*02:02  
-DRB1\*04 -DQA1\*03:01-DQB1\*03:02



- geneticky podmíněné autoimunitní onemocnění
- intolerance na gluten (lepek), trávicí soustava pacienta není schopna trávit potraviny obsahující lepek
- chronický zánět sliznice tenkého střeva
- prevalence v ČR – 1 : 200-250
- pro vývoj onemocnění nutné 3 podmínky:
  1. genetické předpoklady
  2. konzumace stravy obsahující lepek
  3. spouštěč onemocnění (stres, trauma, virová infekce)
- dlouhodobé průjmy, únava, bolesti kostí, břicha, svalů, u dětí také problémy se zuby, růstem a vývojem
- jediná známá léčba – celoživotní dodržování bezlepkové diety

## HLA nomenklatura - sérologická

- **antigeny základní** – např. A9, A10, B51, B40, Cw3, DR2,
- **antigeny splitové (subtypy)** - sdílejí společné sérologicky definované epitopy
  - např. A10 → A25, 26, 34
  - B40 → B60, 61
  - Cw3 → Cw9, 10
  - DR2 → DR15, 16
  - DQ3 → DQ7, 8, 9
- **antigeny obecné** – DR51, DR52, DR53
- maximálně 2 číslicové znaky

V r. 1987 – 10th International Histocompatibility Workshop, přijata nomenklatura založená na následujících principech:

- HLA= Hlavní histokompatibilní komplex člověka
- A, B, C, DR, DQ, DP.....lokusy
- číslo ( A1, Cw3 ) = označení specificity molekuly (antigenu)

## Molekularne-geneticka definice HLA alel

- znaky dvou a vícemístné  
př. HLA-A\*02, \*31, B\*08, \*44, DRB1\*04, \*13, DQB1\*07, \*08 - úroveň „**low resolution**“


HLA-A\*01:01, \*02:02, B\*07:01, \*35:01, DRB1\*04:01, \*13:05, DQB1\*03:04, \*03:05 - úroveň „**high resolution**“

- Více jak 4 znaky:  
C\*02:02:01, \*02:02:02.....tichá mutace na úrovni DNA  
A\*24:02:01:01 7. a 8. pozice – polymorfismus v nekódující oblasti  
A\*24:02:01:02L „ low expressed“ allele  
B\*51:11N „ null“ allele
- Duben 2010 – nová nomenklatura, k oddělování jednotlivých dvojčíslí v označení alel se budou používat dvoječky.  
Např.: B\*0808N→B\*08:08N  
A\*9201→A\*02:101

# Lymfocytotoxicický test - sérologická HLA typizace

- Izolace lymfocytů (krev, uzlina, slezina)
- Terasakiho desky s předkapanými anti-HLA séry (inkubace 30 minut)
- Přidání králičího komplementu (inkubace 60 minut)
- Barvení (trypanová modř, eozin)
- Mikroskopický odečet reakcí
- Hodnocení 0, 2, 4, 6, 8





# Molekulárne-genetické metody HLA typizace



- PCR – SSP (sequence – specific priming)
- PCR – SSOP (sequence – specific oligonukleotide probes)
- SBT (sequence based typing)
- Micročipy
- NGS (next generation sequencing)

# Molekulárně-genetické metody

**PCR** – enzymatická metoda *in vitro*, která slouží k namnožení (amplifikaci) specifického úseku DNA vymezeného párem specifických primerů.  
3 kroky – **izolace DNA** (plná krev, bukání stěry, krevní skvrny, vlasové folikuly, parafínové tkáňové bloky)

- **amplifikace DNA (PCR)** - počet kopií DNA -  $2^n$   
 $n$  = počet cyklů (30 – 35)

- **detekce PCR produktu**




# 1. PCR – SSP (sekvenčně specifické primery)

- tolik primerových párů, aby mohly být amplifikovány a detekovány všechny známé alely daného lokusu
- každý pár primerů určuje jednu alelu nebo skupinu alel, rozlišení během PCR
- HLA typizace „low resolution“ pro lokusy -A, -B, -DR, -DQ vyžaduje 95 – 100 primerových párů
- v každé zkumavce tzv. interní kontrola amplifikace
- kontrola kontaminace – zkumavka obsahuje všechny reagencie pro PCR kromě templátové DNA
- detekce specifických PCR produktů elektroforeticky – rozdílná pohyblivost PCR produktů dle molekulové hmotnosti
- vizualizace – obarvení gelu fluorescenční barvou, která se inkorporuje do DNA, expozice gelu UV světlem na transiluminátoru
- fotodokumentace


## Princip SSP-PCR





úplná shoda – amplifikace proběhne



neshoda – amplifikace neproběhne








## 2. PCR – SSO (sekvenčně specifické oligonukleotidy)


- využití lokus – specifických primerů (značené biotinem)
- amplifikuje se celá oblast kódovaná jedním lokusem (exon 2,3)
- specifické alely nebo skupiny alel jsou následně určeny reverzní hybridizací s oligonukleotidovými próbami (sondami)
- denaturace amplifikované DNA
- DNA próby (sondy) immobilizovány (nitrocelulózovém stripu, mikropartikule)
- reverzní hybridizace denaturované DNA s DNA probou
- vymýtí nespecificky navázané DNA
- konjugát (streptavidin + alkalická fosfatáza), vytvoření barevného precipitátu na stripech - systém INNO LiPa
- Konjugát – streptavidin + PE - Luminex, snímání fluorescence laserem
- Vyhodnocení pomocí softwaru

# hybridizační reakce






*perfektní shoda*  
**HYBRIDIZACE**

*jednořetězcová cílová DNA*




*1 neshoda*  
**ŽÁDNÁ**  
**HYBRIDIZACE**


*jednořetězcová cílová DNA*



**DQB typizace: DQB1\*0302 x DQB1\*0401**

# PCR-SSO typizace na analyzátoru Luminex





DELL



# Imunologie leukocytů a trombocytů


## Transplantologie

- Všechny buňky lidského těla nesou na svých membránách antigenní znaky, které jsou uspořádány do systémů
- Systémy membránových znaků byly nejdříve zjištěny a prozkoumány na erytrocytech, později leukocytech a trombocytech
- Antigeny mají schopnost indukovat v organismu detekovatelnou odpověď a specificky reagovat s produkty této odpovědi, t.j. s protilátkami nebo efektorovými T buňkami.
- Protilátky se uvolňují zejména do krevní plazmy, v menším množství se vyskytují také v tělních tekutinách, hlenu a na povrchu sliznic
- Hladina protilátek v séru kolísá v závislosti na věku, pohlaví a na stupni rozvinutí imunitních reakcí
- Protilátky, patřící do rodiny imunoglobulinů, lze rozdělit dle způsobu vzniku:

1. aloimunitní protilátky - transfuze krevních složek  
- transplantace  
- záměrná imunizaci  
- těhotenství, aborty

2. autoprotilátky – proti vlastním antigenům jedince

3. alergické protilátky  
4. přirozené protilátky



- Dle různých typů H řetězce lze rozlišit 5 tříd imunoglobulinů – IgG, IgM, IgA, IgD a IgE.
- V imunologii leukocytů a trombocytů hrají důležitou roli imunoglobuliny třídy IgG, IgM a IgA.

# Imunologie leukocytů

1. antigeny společné s erytrocytárními - ABO, Rh, P, MNSs, ...
2. antigeny specifické pro leukocyty

- specifické antigeny lymfocytů **HLA antigeny**
- specifické antigeny granulocytů **HNA antigeny**
- specifické antigeny monocytů **HMA antigeny**

## HLA antigeny a anti- HLA protilátky

- anti-HLA protilátky vyvolané účinkem HLA antigenů jsou nejčastěji lymfocytotoxiny, méně často leukoaglutininy
- anti-HLA protilátky vznikají tehdy, obsahuje-li imunizační faktor HLA antigeny odlišné od osoby vystavené jeho účinku
- a-HLA protilátky jsou imunoglobuliny třídy IgG a IgM

# Klinické syndromy způsobené anti-HLA protilátkami

## Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce – FNHTR (teplota, třesavka, zimnice, bolest hlavy)

- příčinou mediátory a cytokiny z leukocytů uvolněné v průběhu zpracování a skladování TP
- někdy je příčinou přítomnost antileukocytárních (často a-HLA) protilátek v plazmě pacienta při podání TP kontaminovaných leukocyty
- Snížení výskyty FNHTR – plošná leukodeplece TP

## Potransfuzní reakce TRALI - imunní TRALI

- a-HLA nebo antigranulocytární protilátky v plazmě DK reagující proti antigenům leukocytů příjemce transfuze nebo antileukocytární protilátky v plazmě příjemce transfuze reagující proti antigenům leukocytů přítomných v TP
- aktivované leukocyty - obstrukce plicní mikrocirkulace, vzniká plicní edém
- klinické projevy do 6 hodin po podání transfuze (většinou neprodleně po zahájení transfuze)
- podpora vitálních funkcí
- i jiné příčiny – stáří skladovaného TP

## Refrakterita

- refrakterita na podání trombocytových transfuzních přípravků způsobená přítomností anti-HLA protilátek v séru pacienta reagujícími s HLA antigeny I. třídy nacházejících se na membránách trombocytů dárce
- výběr HLA kompatibilního dárce transfuzního přípravku z registru HLA otypovaných dárců nebo zkouška kompatibility v lymfocytotoxicickém testu mezi sérem příjemce a lymfocyty dárce (cross-match)


## Akutní rejekce

- odvrhnutí transplantovaného štěpu
- pravděpodobnost vzniku akutní rejekce je tím větší, čím větší odlišnosti v HLA systémech dárce a příjemce existují
- úloha non-HLA faktorů

# Detekce anti-HLA protilátek

## Lymfocytotoxicický test (LCT)

- reakce mezi protilátkou v séru pacienta a antigenem buněčné membrány typových lymfocytů (dárci krve)
- záchyt protilátek pouze proti HLA I. třídě






## Detekce anti-HLA protilátek pomocí analyzátoru Luminex

- Luminex® je metoda využívající navázané HLA glykokoproteiny na barevně značené mikročástice a vazba protilátek ze séra je prokázána průtokovou cytometrií s dvojitým laserem
- Luminex® má větší specifitu a senzitivitu než LCT, umožňuje záchyt protilátek proti HLA I., II. třídě a anti-MICA

# Detekce anti-HLA protilátek - Luminex

- Barevně značené mikročástice s navázanými HLA antigeny
- Inkubace mikročástic se sérem pacienta
- Přidání fluorescenčně značené sekundární protilátky
- Detekce pomocí laserových paprsků



# HNA antigeny (Human Neutrophil Antigens)

- Známo 7 antigenů, které jsou uspořádány do 5 HNA systémů:
- HNA-1 má 3 alely: HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c (polymorfní formy neutrofilního Fc $\gamma$  receptoru IIIb (CD16b)), HNA-1 specifický pouze pro neutrofily
- Vzácně HNA-1 null fenotyp – jedinci neexprimují Fc $\gamma$  receptor IIIb, možnost tvorby protilátek
- Funkce - Fc $\gamma$  receptor IIIb slouží jako receptor pro IgG1 a IgG3, přispívá k fagocytóze opsonizovaných mikroorganismů
- HNA-2a antigen – typická heterogenní exprese jedince (jedinec má subpopulaci neutrofilů s HNA-2a a subpopulaci bez HNA-2a)
- Vyšší exprese HNA-2a u žen než u mužů, u žen klesá s věkem
- HNA-2 null fenotyp – tvorba specifických protilátek
- Funkce – zahrnut do procesu adheze neutrofilů k endoteliálním buňkám a jejich migraci

- HNA-3a antigen exprimován na neutrofilech a lymfocytech, exprese na trombocytech je sporná
  - Protilátky a-HNA-3a schopné aglutinovat neutrofily
  - Funkce neznámá
- 
- HNA-4a antigen a HNA-4a negativní jedinci objeveni v roce 1986
  - HNA-4a genotypy nalezeny u více jak 90% bělochů
  - Exprese na neutrofilech, monocytech a NK
  - Funkce – adheze leukocytů k endoteliálním buňkám a při fagocytóze
- 
- HNA-5a – exprese na všech leukocytech
  - Funkce – adheze leukocytů

# Klinické syndromy způsobené anti-HNA protilátkami

## Aloimunitní neutropenie novorozence

- způsobená mateřskými aloprotilátkami proti HNA antigenům na neutrofilech plodu při absenci na neutrofilech mateřských
- nebo jako transplacentární přenos protilátek od matky s autoimunitní neutropenií
- Většinou jsou mateřské aloprotilátky zaměřeny proti antigenům HNA-1a, HNA-1b a HNA-2a, méně často proti HNA-1c a HNA-4a.

## Potransfuzní reakce TRALI a FNHTR

- Autoimunitní neutropenie u dětí vyvolaná antigranulocytárními autoprotilátkami nejčastěji proti HNA-1a, HNA-1b, HNA-2a, HNA-4a


# Detekce antigranulocytárních protilátek

## Granuloaglutinační test (GA)

- zachycuje granuloaglutininy
- reakce probíhá specificky mezi antigeny membrány typových granulocytů a protilátkami vyšetřovaného séra
- hodnotí se mikroskopicky shluky granulocytů, při negativní reakci zůstávají granulocyty volné.

## Granuloimunofluorescenční test (GIFT)

- detekuje antigranulocytární protilátky navázané ze séra pacienta na povrch typových granulocytů.
- k vizualizaci navázané protilátky dochází pomocí zvířecí protilátky proti lidskému imunoglobulinu značené fluorescein-isothiocyanátem (FITC)
- na typové granulocyty je navázána protilátka ze séra pacienta a na ni pak zvířecí protilátka značená FITC
- granulocyty s navázanou protilátkou fluoreskují zeleně.




# Imunologie trombocytů

Antigeny specifické pro trombocyty - **HPA antigeny**

- na trombocytech bylo dosud objeveno 8 bialelických systémů - HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-6, HPA-9 a HPA-15
- první trombocytární antigen byl určen antigen HPA-1a (97,9%)
- protilátka anti-HPA-1a nejčastější příčinou **fetomaternální aloimunitní trombocytopenie**
- antitrombocytární protilátky se dělí:
  - aloprotilátky (transfuze, transplantace, těhotenství)
  - autoprotilátky způsobující destrukci vlastních trombocytů (autoimunitní trombocytopenie, ITP)
  - léky indukovaná trombocytopenie (antiepileptika, analgetika, antibiotika)

# Platelet Membrane Glycoprotein Polymorphisms Alloimmune Thrombocytopenia



# Detekce antitrombocytárních protilátek

## DIFT (destičkový imunofluorescenční test)






- zachycuje specifické antitrombocytární protilátky ale i HLA protilátky
- k vizualizaci navázané protilátky na povrch typových trombocytů dochází pomocí anti-lidského imunoglobulinu značeného fluoresceinem

## ELISA (Enzyme Linked Imunosorbent Assay)

- enzymoimunostanovení, zachycující protilátky proti trombocytům
- vazbu antigenu s protilátkou detekujeme pomocí antiglobulinu, který je značený enzymem peroxidázou
- po proběhnutí reakce enzym-substrát a zastavení reakce hodnotíme intenzitu zbarvení na fotometru vzhledem ke kontrolám
- záchyt nespecifických protilátek

## Průtoková cytometrie (Flow cytometry)

- využívá anti-CD41/PE protilátky k označení populace trombocytů
- navázaná protilátku na trombocytech je detekována sekundární anti-lidskou protilátkou značenou jinou fluorescenční barvou (např. Fluorescein Isothiocyanatem - FITC)



# Transplantace

- Transplantace orgánová – srdce, játra, ledviny, plíce, kombinované Tx
- 2 typy dárců – kadaverózní dárce a dárce žijící
  
- Transplantace kostní dřeně, periferních kmenových buněk, pupečníkové krve
- Podle typu dárce Tx autologní, alogenní, syngenní
- Alogenní transplantace – příbuzenecká, nepříbuzenecká
- Registry dárců

# Registers of bone marrow donors in the Czech Republic

**Czech National Register of Bone Marrow Donors (ČNRDD) - Plzeň**

**Czech Register of Blood Stem Cell Donors (CSCR) -**

Praha

Conditions for entry into the register:

- age 18-40 years
- good health status, no serious diseases in the past
- willingness to overcome certain uncomfortable situations and loss of time, associated with one or several visits to a medical facility, possibly with removal of blood stem cells for the sake of another person's life.

# Požadavky na dárce orgánů

- Kadaverózní dárce orgánů je osoba s prokázanou mozkovou smrtí při zachovalém krevním oběhu, s funkčními orgány a bez přítomnosti kontraindikace dárcovství.
- Zákon č.285/2002 Sb. určuje přesná pravidla na určení mozkové smrti a souvisejících předpisů včetně požadavků na kvalifikaci odborníka potvrzující mozkovou smrt.
- V ČR platí předpokládaný souhlas s dárcovstvím, osoby nesouhlasící s dárcovstvím mají právo se přihlásit do speciálního registru osob nesouhlasících s dárcovstvím (registr NROD) .
- Pracoviště zvažující dárcovství musí ověřit, zda pacient v tomto registru není. Souhlas rodiny není zákonné nutný, ale obvykle se bez souhlasu rodiny dárcovství neuskuteční.
- Nejčastější dárci jsou s úrazy hlavy, nitrolební krvácení a další, první informaci o možném dárci podává ošetřující lékař do spádového transplantačního centra ještě před ověřením smrti mozku.
- Smrt mozku je ze zákona potvrzována komplexem vyšetření (angiografie-znázornění oběhu krve kontrastní látkou, kdy se prokáže zástava kr. oběhu mozku).

- přibližně 10% dárců představují u nás žijící dárci ledviny (rodiče, sourozenci, jiní příbuzní)
- absolutní kontraindikací pro Tx ledviny od žijícího dárce je onemocnění ledvin, maligní nádory s možností metastáz, přítomnost australského antigenu (riziko přenosu hepatitidy B), pozitivita na HIV a věk do 18 let. Další podmínkou všech Tx ze žijících dárců je vyloučení jednání pod nátlakem či za úplatu
- živý dárce – kratší doba studené ischémie, odběr a Tx jsou naplánované a probíhají prakticky ve stejnou dobu . Tato skutečnost výrazně přispívá k vynikajícím výsledkům Tx od žijících dárců i bez shody v HLA. Nutnou podmínkou je negativní cross-match (křížová zkouška) mezi dárcem a příjemcem a shoda v KS.