

Diferenciální diagnostika

Dušnosti

Bolestí na hrudi

Bolestí břicha

Bolestí hlavy

Bolestí zad

Bolestí kloubů

Diff. dg. dušnosti I

- kardiální
 - ❖ stáza v plících – srdeční vady, hypertenze, IM, endokarditida, KMP
 - ❖ zvýšený průtok plícemi – defekt sept, komplexní vady srdce
 - ❖ snížený průtok plícemi – perikarditida, perikardiální výpotek, stenóza plicnice, plicní hypertenze

Diff. dg. dušnosti II

- **plicní**
 - zvýšení endobronchiálního odporu – CHOPN, astma bronchiale, aspirace, stenózy trachey, substernální struma, choroby jícnu
 - snížení roztažitelnosti plic – plicní embolizace, PNO, pleurální výpotek, fibróza, karcinomatózní lymfangoitida, miliární TBC, autoagresivní choroby, pneumokoniozy, šoková plíce

Diff. dg. dušnosti III

- **jiného původu**
- anémie – pokles počtu ery, koncentrace Hb
- neurastenická – pocit nemožnosti úplně naplnit plíce vzduchem

Diff. dg. dušnosti – postup vyšetření I

- anamnéza – okolnosti dušnosti
- fyzikální vyšetření – suché, vlhké fenomeny, srdeční selhávání, šelesty
- laboratorní – KO, FW, biochemie, koagulace, imunologie
- EKG – ST, QS, hyLK, arytmie
- RTG – transparency, velikost srdečního stínu, výpotky, infiltrace, PNO
- sonografie – výpotky, funkční stav LK
- alergologie, mikrobiologie

Diff. dg. dušnosti – postup vyšetření II

- endoskopická vyšetření – bronchoskopie, BAL, biopsie
- analýza krevních plynů
- spirometrie – obstrukce, restrikce
- srdeční katetrizace – pravostranná, levostranná
- vyšetření izotopy – scintigrafie plic, perfuze myokardu

Kasuistika

- muž, 67 let, DM II. typu, před týdnem se vrátil z poznávací cesty po Francii, cestoval autobusem, asi 3 dny pocítuje občasnou tíhu na hrudi s těžším dechem a má pocit, že mu rychleji buší srdce
- 2x se objevil stav točení hlavy až pocitu na omdlení
- jakou další otázku nemocnému položíme?
- Jaká bude pracovní diagnóza a jaká vyšetření fyzikální a pomocná provedeme?

Vysvětlení

- autobusový zájezd – málo pohybu, málo tekutin
- diabetes mellitus – rizikový z hlediska hyperkoagulace
- opakovaná dušnost a bušení srdce – sukcesivní plicní embolizace
- fyzikální vyšetření DKK na přítomnost trombózy
- vyšetření hemokoagulace, Doppler

Diff. dg. bolestí na hrudi I

- **kardiální příčiny**
- ICHS, syndrom X, myokarditida, kongestivní KMP, perikarditida, tamponáda perikardu, dissekující aneuryzma, cor pulmonale
- **plicní příčiny**
- pleuritida, pleurodynie, periferní nádory plic, PNO, embolizace

Diff. dg. bolestí na hrudi II

- **gastrointestinální příčiny**
- hiátová hernie, ezofagitida, divertikly jícnu, perforace žaludku, cholecystitida, pankreatitida
- **pohybový aparát**
- spondylóza C páteře, artróza ramenního kloubu, Tietzův syndrom, interkostální neuralgie, plazmocytom, postižení kloubu sternoklavikulárního, fraktury žeber
- **záněty**
- před erupcí Herpes zoster, mediastinitida

Diff. dg. bolestí na hrudi, postup vyšetření I

- **anamnéza – okolnosti bolesti**
- **fyzikální vyšetření – pohmatová
bolestivost žeber, paravertebrálních
svalů, perikardiální třecí šelest,
pleurální třecí šelest, bolestivost
žlučníku**
- **FW, KO, biochemie, CK, CK-MB,
troponin, myoglobin**

Diff. dg. bolestí na hrudi, postup vyšetření II

- efekt NTG
- RTG P+S, žeber
- EKG – změny ST-T, arytmie
- ECHO srdce, sonografie žlučníku
- scintigrafie plic, štítnice
- koronarografie
- angiografie
- ortopedie, neurologie

Kasuistika

- žena 54 let, asi 3 hodiny krutá bolest jdoucí od hrudní kosti směrem k páteři, nepomáhají analgetika, zkusila i NTG od manžela – bez efektu
- v anamnéze hypotyreóza na substituci, na kontrole byla nedávno – v pořádku, před mnoha lety autohavárie, utrpěla zlomeninu žeber – zhojeno
- jaká provedeme základní vyšetření?
- jaká bude pracovní diagnóza?

Vysvětlení

- základní vyšetření k vyloučení akutního koronárního syndromu – EKG negativní, CK pozitivní, D-dimery pozitivní
- pracovní diagnóza – pro autohavárii v minulosti je nutno zvažovat dissekující aneuryzma aorty – CT hrudníku

Diff. dg. bolestí břicha I

- **epigastrium**
 - akutní gastritida, perforovaný vřed, časná fáze appendicitidy, refluxní ezofagitida, kardiospasmus, onemocnění kolon transversum
- **pravé hypochondrium**
 - žlučníková kolika, akutní cholecystitida, akutní pyelonefritida, akutní pankreatitida, hepatitida, jaterní-subfrenický absces, pleuritida

Diff. dg. bolestí břicha II

- levé hypochondrium
- infarkt sleziny, pankreatitida v kaudě, IM, pleuritida, ledvinná kolika
- okolí pupku
- dvanáctníkové vředy, pankreatitida hlavy, inkarcerovaná hernie
- pravé hypogastrium
- appendicitida, adnexitida, renální kolika, torkovaná ovariální cysta, torze varlete, M. Crohn, nádor colon

Diff. dg. bolestí břicha III

- **levé hypogastrium**
 - divertikulitida, dráždivé kolon, nádor kolon, torkovaná ovariální cysta, torze varlete, M. Crohn, ulcerózní kolitida
- **bolesti v celém břiše**
 - ileus, peritonitida, gastroenteritida, diabetické prekoma, uremie, intoxikace, tyreotoxikóza, Addisonská krize, herpes zoster, stav předcházející pneumonii, abdominální angina

Postup vyšetření I

- **anamnéza**
 - bolest - charakter, vyzařování, intenzita, předchorobí, doprovodné příznaky, teplota
- **fyzikálně**
 - poloha, palpační nález, vyšetření per rectum
- **laboratorně**
 - KO, moč+sed, biochemie, AM, koagulace, Ca

Postup vyšetření II

- **pomocná vyšetření**
- EKG, RTG hrudníku, břicha, sonografie
- **při dlouhodobém průběhu**
- rektoskopie, kolonoskopie, enteroklýza, funkční vyšetření jater a žlučových cest
 - EHIDA, vyšetření na parazity, ERCP, angiografie

Kasuistika

- muž, 35 let, přichází pro bolesti břicha vzniklé nad ránem, večer předtím byl u kamaráda ochutnávat čerstvé uzené
- bolesti břicha jsou lokalizované okolo pupku, jsou doprovázeny pocitem na zvracení, celkovou slabostí a zvýšenou teplotou
- jaké další otázky nemocnému položíme?
- jaká vyšetření fyzikální a pomocná provedeme?

Vysvětlení

- otázka na propagaci bolesti, na příjem alkoholu
 - – do epigastria – biliární kolika (20% lidí)
 - - do levého mesogastria – akutní pankreatitida
- fyzikální vyšetření – palpace, ztužení břišní stěny
- vyšetření – ultrazvuk, biochemie včetně Ca, event. CT

Diff. dg bolestí hlavy I

- **difuzní somatické bolesti**
 - hypertenze
 - meningeální dráždění – záněty, krvácení, teploty
 - intrakraniální zvýšení tlaku – nádory, edém, trombóza
 - vaskulární bolesti – cefalea vasomotorica
 - bolesti pocházející z kalvy – myelom, metastázy

Diff. dg bolestí hlavy II

- **difuzní neorganické bolesti**
- psychózy, neurózy
- **lokalizované bolesti hlavy**
- hemikranie – migréna
- lokalizace do očí a tváří – arteriitis cranialis
- oftalmologické bolesti hlavy – refrakční vady, glaukom, iridocyklitida, herpes
- lokalizace do obličeje – sinusitidy, neuralgie, bolesti zubů
- lokalizace do šíje a záhlaví – vertebrogenní, z napětí, ze staženého účesu

Postup vyšetření

- RTG lebky, PND, C pateře, srdce a plic
- laboratorně – KO, biochemie, Fe, CVK, sta, odpady Ca, Mg do moči, PL proti herpetické infekci
- EEG, neurologie, oční vyšetření – zraková ostrost, nitrooční tlak
- ORL vyšetření, stomatologické vyšetření
- CT mozku, vyšetření likvoru, angiografie
- psychiatrické vyšetření

Kasuistika

- žena 25 let, přichází pro bolesti hlavy lokalizované v čele, zhoršující se vleže a při předklonu
- v anamnéze před 2 týdny respirační infekt, ale stále pocit zaujaté hlavy
- jaké fyzikální vyšetření provedeme?
- jaké zobrazovací a laboratorní vyšetření provedeme?

Vysvětlení

- po respiračním infektu možnost retence sekretu v čelních dutinách - sinusitida
- palpace n. V., poklep na čelní dutiny, an jařmové oblouky
- RTG PND, výtěr z nosu na mikrobiologii

Diff. dg. bolestí zad

- **lokální příčiny**
- lumbago, spondylóza páteře
- osteoporóza
- interkostální neuralgie, herpes zoster
- M. Bechtěrev
- nádory pateře, meta postižení
- TBC pateře
- **sekundární bolesti**
- onemocnění ledvin a močových cest
- gynekologická onemocnění

Postup vyšetření

- fyzikální vyšetření
 - páteř, neurologie, onemocnění ledvin, gynekologie
- laboratorně
 - FW, KO, biochemie, Ig, moč+sed, moč bakt., Mantoux
- zobrazovací metody
 - RTG páteře, SI, pánve, G-D, IVU, kolonoskopie, lumbální punkce

Kasuistika

- muž, 47 let, asi měsíc se zhoršující bolesti v oblasti bederní páteře, spíše v horní polovině křížové krajiny
- bolesti „od zad“ zná, tato bolest je jiná, není závislá na poloze, objevuje se více v noci a někdy po jídle, úlevovou polohu nachází v předklonu opřený o lokty
- jaká vyšetření kromě fyzikálního provedeme?
- jaká bude pracovní diagnóza?

Vysvětlení

- bolest v oblasti L1-3 není typická po vertebrogenní původ
- bolest v návaznosti na jídlo obvykle souvisí s trávicím traktem
- úlevová poloha v předklonu je typická pro postižení pankreatu

Diff. dg bolestí kloubů

- **akutní kloubní příznaky**
- **arthritis urica, febris reumatica, parainfekční, postinfekční artritida, hnisavá artritida, reumatóidní artritida, aktivovaná artróza, Schoenlein-Henochova purpura**
- **chronické kloubní příznaky**
- **artrózy, chronická polyartritida, psoriatická artritida, dnavá artritida, Reiterův syndrom, M. Bechtěrev, artritida při kolagenózách**

Postup vyšetření

- anamnéza, fyzikální vyšetření
- laboratorně – FW, KO, moč+sed, biochemie, KM, Ca, ALP, ACP, ACP-P, PSA, RF, ASLO, imunologie – antinukleární PL – ENA, HLA B 27, kultivace gonorhey
- RTG kloubu
- scinti skeletu

Kasuistika

- žena, 55 let, obezita typu jablko, BMI 38, ve stravě preferuje slané před sladkým, od noci bolesti PDK, nejvíce palce
- fyzikálně se jeví otok a zčervenání v popisované oblasti, velmi bolestivé při palpaci, aktivní pohyb v MTF kloubu prakticky nemožný
- jakou otázku ještě položíme?
- jaké laboratorní vyšetření uděláme?

Vysvětlení

- obezita typu jablko je spojena obvykle s metabolickým syndromem u lidí s převahou příjmu energie nad výdejem
- preference slaného znamená zvýšenou konzumaci masa a masných výrobků
- zeptáme se na druhy a množství stravy přijaté předchozí den
- nejpravděpodobnější je dnavý záchvat
- hladina KM

Hodně štěstí u zkoušky

