

## KTERÝ singular

1. Ta žena, s \_\_\_\_\_ bydlí Petr, není sympatická.
2. Divadlo, vedle \_\_\_\_\_ je ta restaurace, se jmenuje Národní.
3. Musím zavolat kamarádce, \_\_\_\_\_ jsem půjčil peníze.
4. Ten kluk, od \_\_\_\_\_ mám materiály, je z naší fakulty.
5. Hotel, v \_\_\_\_\_ jsme bydleli, byl strašný!
6. Jídlo, \_\_\_\_\_ jsme si dali, bylo výborné!
7. Čekám na kamaráda, \_\_\_\_\_ musím vrátit nějaké knihy.
8. Můj dědeček, \_\_\_\_\_ bylo už 87 let, je stále v dobré kondici.
9. Pomáhali jsme kolegovi, \_\_\_\_\_ v nemocnici začal pracovat včera.
10. To je náš profesor, \_\_\_\_\_ ještě neznáš.

## MODALS

Replace the highlighted expressions with modal verbs in VY form.

1. **Je možné** naučit se cizí jazyk velmi rychle.
2. **Je nutné** cvičit každý den.
3. **Není nutné držet dietu.**
4. **Je zakázané** telefonovat v autě, když řídíte.
5. **Není zakázané** jíst, když řídíte.
6. **Je nutné**, objednat se na CT.
7. **Není možné** kouřit v knihovně.
8. **Je zakázané** mluvit hlasitě během přednášky.

## answers

### MĚL/MĚL BY

1. Neměly, měly; 2. měla bych; 3. měl/a bych; 4. měl; 5. měla by.

### JESTLI/KDYBY

1. Jestli, 2. jestli, 3. kdybychom, 4. jestli, 5. kdyby, 6. jestli, 7. jestli, 8. kdybys.

### KTERÝ (BOTH A) AND B) ARE PLURAL FORMS!)

1. kterých, 2. kterým, 3. které, 5. kterých, 6. kterým, 7. kterých, 8. kterých
1. kteří, 2. které, 3. které, 4. které, 5. kterých, 6. kterých, 7. kterým, 8. kterým, 9. kterých, 10. kterých, 11. kterými, 12. kteří.

### KTERÝ (singular) NEW EXERCISE, IT IS NOT ON THE HANDOUT

1. Kterou, 2. které, 3. které, 4. kterého, 5. kterém, 6. které, 7. kterému, 8. kterému, 9. který, 10. kterého.

### MODALS (NEW EXERCISE, IT IS NOT ON THE HANDOUT)

1. Můžete, 2. musíte, 3. nemusíte, 4. nesmíte (nemůžete, 5. můžete/smíte, 6. musíte, 7. nesmíte/nemůžete, 8. nesmíte/nemůžete.

### HEMATOLOGIE

1.

1. Krevní, 2. krve, 3. kůži, 4. krvetvorbou, 5. odběr, 6. krvácení, 7. srážlivosti.

2.

1. Pozorujete nějaké změny na kůži? 2. Kdy jste si toho všimla? / Kdy jste to pozorovala poprvé? 3. Krvácíte z dásní? 4. Měl někdo ve vaší rodině problémy s krvetvorbou? 5. Léčí se někdo v rodině s onemocnění krve? 6. Potíte se hodně?

### ENDOKRINOLOGIE

1.

1. zahřát, 2. potím, 3. žízeň, 4. padají, 5. nepřibírá, 6. suchou, 7. vyčerpaná, 8. lámou.

2.

1. Máte často žízeň? 2. Zhubnul jste? Kolik kilo?, 3. Za jak dlouho jste zhubnul? 4. Máte raději teplo nebo zimu? 5. Máte ještě jiné potíže? 6. Jste hodně unavený? (Chce se vám spát?)

### REVMATOLOGIE

3.

1. stěhovavé, 2. oteklé, 3. narovnat, 4. zapnete, 5. ztuhlé, 6. cvičíte, 7. zarudlé.

4.

1. Jak dlouho vás to bolí? 2. Otékají vám klouby i v noci? 3. Bolí vás to v klidu nebo při námaze? 4. Jsou bolesti stěhovavé? 5. Můžete narovnat ruce? 6. Léčil jste se někdy v lázních?

#### GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

1.

1. menstruační, 2. pohlavní, 3. porod, 4. porodní, 5. pánevním, 6. potrat, 7. oplodnění, 8. hormonální, 9. potrat, 10. těhotenství.

2. Kdy jste měla první menstruaci? 2. Kdy byly poslední měsíčky? 3. Máte pravidelný cyklus? 4. Kolik porodů/potratů jste měla? 5. Byl porod komplikovaný? 6. Byla jste někdy těhotná?

#### Psychiatrie

##### Část kazuistiky

Fill in the missing words. Choose from the box. Do not change the words. There are two extra words.

stav doporučení úzkost zhoršení léčebně chování sebevražda myšlenky zvýšená nálada ambulantně epizoda zrychlené příznaky
---

První příznaky nemoci začaly v prosinci roku 2014, kdy se objevilo zhoršení spánku, smutná nálada, únavnost, hypohedonie až anhedonie, na doporučení praktického lékaře vyhledala psychiatrickou ambulanci, terapie citalopramem, potíže se zmírnily, po šesti měsících, na jaře, zcela ustoupily. Na podzim následujícího roku se u pacientky objevila zvýšená energie, nezodpovědné chování ve smyslu nekontrolovaného utrácení peněz, snížená potřeba spánku, zrychlené tempo řeči. Terapie opět probíhala ambulantně, nasazen karbamazepin a haloperidol. Stav se po cca půl roce zlepšil, haloperidol vysazen, ponechán karbamazepin. Přibližně za pět měsíců nastoupila druhá depresivní epizoda se stejnými příznaky jako při první epizodě, navíc se přidaly suicidální myšlenky. Pacientka byla tentokrát hospitalizována v psychiatrické léčebně, terapie: lithium a bupropion. Její stav se zlepšil.